



جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
والتعليم المدنى
قطاع الكتب

الرياضيات

الفصل الدراسي الأول

الصف الأول الثانوى



٢٠١٨-٢٠١٧

غير مصرح بتداول هذا الكتاب
خارج وزارة التربية والتعليم



Egyptian Knowledge Bank
بنك المعرفة المصري



الرياضيات

الفصل الدراسي الأول

الصف الأول الثانوي



البيانات تطبيقات عملية في مجالات متعددة منها إناء، الظرة والتباير وتحفيظ المدد وإعداد جراراتها التي تتعقد على نوازى المستقيمات والمستويات القاطعة لها وفق تناوب يس الطول الحقيقي والطوال في الرسم.

إعداد

أ/ عمر فؤاد جابر الله

أ.د/ عفاف أبو الفتوح صالح

أ.د/ نبيل توفيق الصبع

أ.م.د/ عسام وصفي روحاںیل

أ/ سيرافيم الياس اسكندر

أ/ كمال يونس كبشه

اشراف علم

مستشار الرياضيات

اشراف تربوي

مركز تطوير المناهج



طبعة ٢٠١٧ - ٢٠١٨

غير مصرح بتداول الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم



Egypt Knowledge Bank
بنك المعرفة المصري

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يسعدنا وتحن نقدم هذا الكتاب أن نوضح الفلسفة التي تم في صوتها بناء المادة التعليمية وتوجزها فيما يلى:

- ١ التأكيد على أن الغاية الأساسية من هذا الكتاب هي مساعدة المتعلم على حل المشكلات واتخاذ القرارات في حياته اليومية، والتي تساعد على المشاركة في المجتمع.
- ٢ التأكيد على مبدأ استمرارية التعلم مدى الحياة من خلال العمل على أن يكتسب الطالب منهجة التفكير العلمي، وأن يمارسوا التعلم المترافق بالثقة والتشويق، وذلك بالاعتماد على تنمية مهارات حل المشكلات وتنمية مهارات الاستنتاج والتحليل، واستخدام أساليب التعلم الذاتي والتعلم النشط والتعلم التعاوني بروح الفريق، والمناقشة وال الحوار، وتقبل آراء الآخرين، والموضوعية في إصدار الأحكام، بالإضافة إلى التعریف ببعض الأنشطة والإنجازات الوطنية.
- ٣ تقديم رؤى شاملة متباينة للعلاقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع (STS) تعكس دور التقديم العلمي في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى التركيز على ممارسة الطلاب التصرف الوعي الفعال جهاز استخدام الأدوات التكنولوجية.
- ٤ تنمية اتجاهات إيجابية تجاه الرياضيات ودراستها وتقدير علمائها.
- ٥ تزويد الطلاب بثقافة شاملة لتحسين استخدام الموارد البيئية المتاحة.
- ٦ الاعتماد على أساسيات المعرفة وتنمية مهارات التفكير، وتنمية المهارات العلمية، وبعد عن التفاصيل والخشوه، والابتعاد عن التعليم التقليدي؛ لهذا فالاهتمام يوجه إلى إبراز المفاهيم والمفاهيم العامة وأساليب البحث وحل المشكلات ومهارات التفكير الأساسية التي تميز مادة الرياضيات عن غيرها.

وفي ضوء ما سبق روعى في هذا الكتاب ما يلى :

- * تقسيم الكتاب إلى وحدات متكاملة ومتابعة لكل منها مقدمة توضح أهدافها و دروسها ومحظوظ تنظيمها لها والمصطلحات الواردة بها باللغة العربية والإنجليزية، ومقسمة إلى دروس يوضح الهدف من تدريسيها للطالب تحت عنوان سوف تتعلم، وبين كل درس من دروس كل وحدة بالفكرة الأساسية لمحتوى الدرس وروع عن عرض المادة العلمية من السهل إلى الصعب ويتضمن مجموعة من الأنشطة التي تتناول الربط بالمواد الأخرى والحياة العملية والتي تناسب القدرات المختلفة للطلاب وتراعي الفروق الفردية بينهم وتتركز على العمل التعاوني، وتكامل مع الموضوع.
- * كما قدم في كل درس أمثلة تبدأ من السهل إلى الصعب، وتشمل مستويات تفكير متنوعة، مع تدريبات عليها تحت عنوان حاول أن تحل وينتهي كل درس ببيان «تحقق من فهمك».
- * تنتهي كل وحدة بملخص للوحدة يتناول المفاهيم والتعليمات الواردة بالوحدة.

وأخيراً .. نتمنى أن تكون قد وقفت في إنجاز هذا العمل لما فيه خير لأولادنا، ولعصرنا العزيزة،
وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَوْدَ، وَهُوَ يَهْدِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ

المحتويات

الجبر وال العلاقات والدوال

المحتوى
الأولى

- | | | |
|----|---|-------|
| ١ | حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد. | ١ - ١ |
| ٤ | مقدمة عن الأعداد المركبة. | ٢ - ١ |
| ١٥ | تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية. | ٣ - ١ |
| ١٩ | العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها. | ٤ - ١ |
| ٣١ | إشارة الدالة. | ٥ - ١ |
| ٢٢ | متباينات الدرجة الثانية في مجهول واحد. | ٦ - ١ |
| ٢٧ | ملخص الوحدة. | |

التشابه

المحتوى
الثانية

- | | | |
|----|--|-------|
| ٤٢ | تشابه المضلعات. | ١ - ٢ |
| ٤٨ | تشابه المثلثات. | ٢ - ٢ |
| ٦١ | العلاقة بين مساحتى سطحى مخلعين متشابهين. | ٢ - ٢ |
| ٧١ | تطبيقات التشابه فى الدائرة. | ٤ - ٢ |
| ٧٦ | ملخص الوحدة. | |

نظريات التنااسب في المثلث

المحتوى
الثالثة

- | | | |
|-----|--|-------|
| ٨٢ | المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة. | ١ - ٢ |
| ٩٤ | منصفا الزاوية والأجزاء المتناسبة. | ٢ - ٢ |
| ١٠٣ | تطبيقات التنااسب في الدائرة. | ٢ - ٢ |
| ١١٤ | ملخص الوحدة. | |

حساب المثلثات

المحتوى
الرابعة

- | | | |
|-----|--|-------|
| ١١٦ | الزاوية الموجة. | ١ - ٤ |
| ١٢٢ | القياس المستقى والقياس الدائري لزاوية. | ٢ - ٤ |
| ١٣١ | الدوال المثلثية. | ٢ - ٤ |
| ١٣٩ | الزاوية المتناسبة. | ٤ - ٤ |
| ١٤٩ | التمثيل البياني للدوال المثلثية. | ٥ - ٤ |
| ١٥٣ | إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها المثلثية. | ٦ - ٤ |
| ١٥٧ | ملخص الوحدة. | |

الوحدة

الجبر

الجبر والعلاقات والدوال

Algebra, Relations and Functions

أهداف الوحدة

فى نهاية الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يحـل معادلة الـدرجـة الثـانـيـة فى مـتـغـير وـاحـد جـسـراً وـبـيـانـاً.
- يـوـجـد مـخـسـع وـحـاـصـل ضـرـب جـذـرـى مـعـادـلـة مـن الـدرجـة الثـانـيـة فى مـتـغـير وـاحـد.
- يـبـحـث إـشـارـة دـالـة.
- يـوـجـد بـعـض معـامـلـات حدـودـ مـعـادـلـة مـن الـدرجـة الثـانـيـة فى مـتـغـير وـاحـد بـمـعـلـومـة أـحـدـ الجـذـرـين أو كـلـيهـما.
- يـعـرـف مـقـدـمة فى الأـهـادـدـ المـركـبـ (تعريف العـدـدـ المـركـبـ، قـوىـتـ، كـتـابـةـ العـدـدـ المـركـبـ بالـصـورـةـ الجـبـرـيـةـ، تـساـوىـ عـدـدـيـنـ مـرـكـبـيـنـ).
- يـعـرـف المـمـيز لـمـعـادـلـة الـدرجـة الثـانـيـة فى مـتـغـير وـاحـد.
- يـبـحـث نوع جـذـرـى مـعـادـلـة الـدرجـة الثـانـيـة فى مـتـغـير وـاحـد بـمـعـلـومـة مـعـامـلـاتـ حدـودـهاـ.
- يـبـحـث مـتـبـيـاتـ مـنـ الـدرجـةـ الثـانـيـةـ فىـ مـتـغـيرـ وـاحـدـ بـمـعـلـومـةـ مـعـامـلـاتـ حدـودـهاـ.

المصطلحات الأساسية

Complex Number	عدد مركب	:=	مميز المعادلة	:=	معادلة
Imaginary Number	عدد تخيلى	:=	Discriminant of the Equation	:=	جذر المعادلة
Powers of a Number	قوى العدد	:=	إشارة دالة	:=	Root of the Equation
Inequality	متباينة	:=	Sign of a function	:=	معامل الحد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

- الدرس (١ - ١): حل معادلات الدرجة الثالثة في متغير واحد.

الدرس (١ - ٢): مقدمة عن الأعداد المركبة.

الدرس (١ - ٣): تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية.


الدرس (١ - ٤): العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية و معاملات حدودها.

الدرس (١ - ٥): إشارة الدالة.

الدرس (١ - ٦): متابيات الدرجة الثالثة في مجهول واحد.

الدورة الأولى

آل حاسبة علية - ورق مربعات - حاسب آلي - برامج رسومية
- بعض الواقع الإلكتروني مثلاً



65/100

الجبر كلمة عربية استخدمها محدثون موسى الخوارزمي (القرن التاسع الميلادي) في حصر الخليفة العباسى (الذائور) في كتابه الذي ألقى، وكان عنوانه «الجبر والمقابلة»، والتي وضع فيه طرقاً أصلية لحل المعادلات، وبذلك يعتد الخوارزمي هو مؤسس علم الجبر بعد أن كان الجبر جزءاً من الحساب. وقد ترجم الكتاب إلى اللغات الأوروبية بعنوان «الجبر والمقابلة» (algebra) (algebra).

والجذر هو الذي تمثله حالات بالرموز (إشارات إلى حل معادلة الدرجة الثانية) وقد وضع الخوارزمي حلولاً هندسية لحل معادلات الدرجة الثانية التي تختلف مع طريقة إكمال المربع. واستغل كثير من العلماء العرب بحل المعادلات، ومن أشهرهم صدر الخير الذي اهتم بحل معادلات الدرجة الثالثة، وحيث يذكر الله تعالى في بردية أحسن (١٨٦٠ق.م)

بعض الحالات التي يشير حلها إلى أن المعرضين على ذلك البعض قد توصلوا إلى طريقة لإيجاد مجمع المتتابعة الحالية والمتتابعة المتباعدة.

وقد وصل علم الجير حالياً إلى درجة كبيرة من التطور والتجربة، فبعد أن كان يتعامل مع الأعذان أصبح يتعامل مع عيادات رياضية جديدة مثل: المجموعات، والمعقرفات، والمتعددات وغيرها.

والأمل معنود عليكم - أتمنا الطلاب - في استعادة
مجدنا العلمي في عصور النهضة المصرية الفرعونية
والعصور الإسلامية، والتي حمل علماؤنا فيها لواء التقدم
وامتاجل المعرفة في العالم شرقاً وغرباً.



حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد

Solving Quadratic Equations in One Variable



سوف نتعلم

سبق أن درست المعادلات الجبرية في متغير واحد، وفي هذا الدرس سوف تدرس المعادلات الجبرية من الدرجة الثانية في متغير واحد.

والآن سوف نتعرض مابعد ذلك دراسته من المعادلات الجبرية ذات المتغير الواحد.

١ تسمى المعادلة: $as^2 + bs + c = 0$ حيث $a \neq 0$. بأنها معادلة من الدرجة الأولى

في متغير واحد هو **س** (لأن أكبر قوى فيها للمتغير س هو العدد ٢).

٢ تسمى المعادلة: $as^2 + bs + c = 0$ حيث $a \neq 0$. معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد هو **س** (لأن أكبر قوى فيها للمتغير س هو العدد ٢).

وعلى ذلك فالمعادلة: $2s^2 - 3s + 5 = 0$ تسمى معادلة من الدرجة الثالثة.

(لأن أعلى أنس فيها للمتغير س هو ٣).

المعادلات وال العلاقات والدوال

المعادلات وال العلاقات والدوال

سبق أن درست حل معادلة الدرجة الثانية جبرياً كالتالي، بطر يقين:

أولاً: بتحليل المقدار $as^2 + bs + c = 0$ حيث $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

(إذا كان ذلك ممكناً في ص).

ثانياً: باستخدام القانون العام، ويكون جذراً المعادلة $as^2 + bs + c = 0$ هما:

$$s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{حيث } a \text{ معامل } s^2, b \text{ معامل } s, c \text{ الحد المطلق.}$$

والآن سوف تدرس حل معادلة الدرجة الثانية بيانياً.

المصطلحات الأساسية

Equation	معادلة
Relation	علاقة
Function	دالة
Factor	عامل
Coefficient	معامل

حل معادلة الدرجة الثانية بيانياً

Solving quadratic equation graphically

لتدكر

المقدار الثاني

$as^2 + bs + c = 0$ حيث $a, b, c \in \mathbb{R}$ ، $a \neq 0$.
تحليله كحاصل ضرب ثابتتي حدود معاملاتها أعداد صحيحة إذا و فقط إذا كان المقدار $b^2 - 4ac$ كاملاً

لحل المعادلة $s^2 + s - 6 = 0$ بيانياً تبع الآتي:

★ ترسّم الشكل البياني للدالة حيث $d(s) = s^2 + s - 6$

مثال

١ حل المعادلة: $s^2 + s - 6 = 0$ بيانياً،

ثم تتحقق من صحة الحل.


الحل

لحل المعادلة $s^2 + s - 6 = 0$ بيانياً تبع الآتي:

الأدوات والوسائل

- لة حاسبة على
- ورقة رسم بياني

★ تعين مجموعة الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات، فتكون هي مجموعة حل المعادلة.



لرسم الدالة $d(s) = s^2 + s - 6$

ننشر، جدولًا لبعض قيم s ، ثم نوجد قيم s المقابلة لها كالتالي:

s	٣	٢	١	٠	-١	-٢	-٣	-٤	-٥
$s^2 + s - 6$	٦	٠	-٤	-٦	-٤	٠	-٦	-٩	-١٢

★ تعين هذه النقاط في المستوى الإحداثي المتعامد، ونصل بينهما بمنحنى كما في الشكل المجاور.

ومن الرسم نجد الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات وهي $s = -3$ ، $s = -2$ ، $s = 0$ وبذلك تكون مجموعة حل المعادلة $s^2 + s - 6 = 0$ هي $\{-3, -2, 0\}$.

يمكنك استخدام الحل الجبرى لكي تطابقه مع الحل البيانى كالتالى:

$$\text{المعادلة: } s^2 + s - 6 = 0$$

$$\text{تحليل المقدار الثلاثي: } (s+3)(s-2) = 0$$

$$\text{إما } s+3=0 \quad \text{أو} \quad s-2=0$$

$$\text{أى } s=-3 \quad \text{أو} \quad s=2 \quad \text{مجموعة الحل هي } \{-3, -2, 0\}$$

التحقق من صحة الحل:

$$\text{عندما } s = -3: \text{الطرف الأيمن للمعادلة} = (-3)^2 + (-3) - 6 = -3 - 9 + 9 = 0$$

$$\text{عندما } s = 2: \text{الطرف الأيمن للمعادلة} = (2)^2 + (2) - 6 = 4 + 4 - 6 = 2$$

$s = -3$ تتحقق المعادلة.

$s = 2$ تتحقق المعادلة.

س = 2 تتحقق المعادلة.

للحظة ألم:

١- في التمثيل البيانى للعلاقة السابقة $s = s^2 + s - 6$

ـ العلاقة تمثل دالة؛ لأن الخط الرأس يقطع المنحنى في نقطة واحدة.

ـ المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية.

ـ المدى هو $[-\frac{1}{4}, \infty)$.

٢- للتعبير عن الدالة يستخدم الرمز $d(s)$ بدلاً من s ، ويقرأ دالة s .


تفكر نقدم: ١- هل كل دالة علاقة؟ فسر ذلك بأمثلة.

٢- هل يمكن تمثيل العلاقات والدوال بمعادلات؟ فسر ذلك.


للتكرر
إذا كان $A \times B$ أعداداً حقيقية
وكان $A \times B = 0$
فإن: $A = 0$ أو $B = 0$

اختبار الخط الرأسى

Vertical Ray test



الخط الرأسى يقطع المنحنى
في نقطتين واحدة ل فقط




الخط الرأسى يقطع المنحنى
في نقطتين أو أكثر

حاول أن تحل

- ١ مثل العلاقة $s = -4t^2 + 24$ بيانيًا، ثم أوجد من الرسم مجموعة حل المعادلة $s = -4t^2 + 24 = 0$ وإذا كانت $s = d(t)$ فيُبين أن d دالة، وحدد مجالها ومداها [ناقش معلمك].

مثال

- ٢ **الربط بالفزياء:** أطلقت قذيفة رأسياً بسرعة (ع) تساوي $24,5$ متر/ث. احسب الفترة الزمنية (ن) بالثانية التي تستغرقها القذيفة حتى تصل إلى ارتفاع ف مترًا، حيث (ف) تساوي $19,6$ مترًا، علماً بأن العلاقة بين ف، ن كالتالي: $v = u - gt$.



الحل

$$\text{بال subsitute عن: } v = 24,5 \text{ متر/ث} \Rightarrow 24,5 = 24,5 - 9,8t \Rightarrow t = 24,5 / 9,8 = 2,5 \text{ ثانية}$$

بالتبيّن

بتحليل المقدار الثلاثي.

$$v = u - gt \Rightarrow 24,5 = 24,5 - 9,8t \Rightarrow t = 0$$

$$\therefore (n - 1)(n - 2) = 0 \Rightarrow n = 1 \text{ ثانية أو } n = 2 \text{ ثانية.}$$

- تقدير وجود جوابين:** القذيفة تصل إلى ارتفاع $19,6$ مترًا بعد ثانية واحدة، ثم تستمر في الحركة لأعلى حتى تصل لأقصى ارتفاع، ثم تعود إلى نفس الارتفاع مرة أخرى بعد ٤ ثوانٍ من لحظة إطلاقها.

حاول أن تحل

- ٣ **الربط بالألعاب الرياضية:** في إحدى الألعاب الأولمبية فاز متسابق من منصة ارتفاعها $9,8$ أمتار عن سطح الماء عاليًا مبتعداً عنها، فإذا كان ارتفاع المتسابق عن سطح الماء ف مترًا بعد زمن قدره ن ثانية يتحدد بالعلاقة $v = 44,9 + 45,4n - 9,8n^2$ ، فأوجد لأقرب رقمين عشررين متى يصل المتسابق لسطح الماء؟

للساط



قم بزيارة الموقع الآتي:

تمارين (١ - ١)

أولاً، الاختيار من متعدد

- ١ المعادلة: $(s - 1)(s + 2) = 0$ من الدرجة:

٥ الرابعة

٤ الثالثة

٣ الأولى

- ٢ مجموعة حل المعادلة $s^2 - s - 2 = 0$ هي:

١ $\{-1, 2\}$

٢ $\{1, -2\}$

٣ $\{1\}$

٢ مجموعه حل المعادله $s^2 + 3s + 2 = 0$ في ح هي:

أ) $\{-2, -1\}$

ب) $\{-2, 1\}$

ج) $\{2, 1\}$


٣ مجموعه حل المعادله $s^2 - 2s - 1 = 0$ في ح هي:

أ) $\{2\}$

ب) $\{1, -1\}$

ج) $\{0\}$

د) $\{1\}$



٤ يمثل الشكل المقابل المتحقق البياني لدالة تربيعية د.

مجموعه حل المعادله $d(s) = 0$ في ح هي:

أ) $\{1\}$

ب) $\{2\}$

ج) $\{4, -2\}$

د) $\{2\}$

ثانياً، أجب عن الأسئلة الآتية:

٥ أوجد مجموعه حل كل من المعادلات الآتية في ح:

أ) $(s-4)^2 = 0$




ب) $s^2 + 2s = 0$

ج) $s^2 + 4s + 4 = 0$

د) $s^2 - 9s + 9 = 0$

٦ يبين كل شكل من الأشكال الآتية الرسم البياني لدالة من الدرجة الثانية.

أوجد مجموعه الحل للمعادله $d(s) = 0$ في كل شكل.



٧ أوجد مجموعه الحل لكلا من المعادلات الآتية في ح وحقق الناتج بيانياً:

أ) $s^2 + 3s + 4 = 0$

ب) $s^2 - 2s - 5 = 0$

ج) $(s-3)^2 = 5$

د) $6s^2 - 6 - 5s = 0$

هـ) $\frac{1}{2}s^2 - \frac{3}{2}s = 1$

بـ) $s^2 + 2s = 12$

٨ حل المعادلات الآتية في ح باستخدام القانون العام مقررياً الناتج لرقم عشري واحد.

أ) $s^2 - 6s + 7 = 0$

ب) $3s^2 - 65 = 0$

ج) $2s^2 + 4s - 4 = 0$

د) $s^2 + 6s + 8 = 0$

هـ) $2s^2 - 6s - 4 = 0$

بـ) $5s^2 - 3s - 1 = 0$

١٠ اعداد إذا كان مجموع الأعداد الصحيحة المتتالية $(1 + 2 + 3 + \dots + n)$ يعطى بالعلاقة $\text{ج} = \frac{n}{2} (1 + n)$ فكم عددًا صحيحًا متتابلاً بدءاً من العدد ١ يكون مجموعها مساوياً:




١٧١ ب

٤٦٥ ج

٧٨ ١

٤٥٣ ح

١١ بين كل شكل من الأشكال الآتية الرسم البياني لدالة من الدرجة الثانية في متغير واحد. أوجد قاعدة كل دالة من هذه الدوال.



[إجابة كريم]

$$\begin{aligned} & \therefore (س - ٣)^٢ = (س - ٣) \\ & \therefore (س - ٣)^٢ - (س - ٣) = ٠ \\ & \therefore (س - ٣)[(س - ٣) - ١] = ٠ \\ & \text{بالتالي: } س - ٣ = ٠ \text{ أو } س - ٤ = ٠ \\ & \text{مجموعه الحل = } \{٣, ٤\} \end{aligned}$$

[إجابة زياد]

$$\begin{aligned} & \therefore (س - ٣)^٢ = (س - ٣) \\ & \text{يقسم الطرقين على } (س - ٣) \text{ حيث } س \neq ٣ \\ & \therefore س - ٣ = ١ \text{ وبالتالي} \\ & \therefore س = ٤ \\ & \text{مجموعه الحل = } \{٤\} \end{aligned}$$

أي الحلتين صحيح؟ لماذا؟

١٢ تفكير ناقد قُذفت كرة رأساً إلى أعلى بسرعة (ع) تساوي ٢٩,٤ متر/ث. احسب الفترة الزمنية (ن) بالثانية التي تستغرقها الكرة حتى تصل إلى ارتفاع (ف) مترًا، حيث ف تساوى ٣٩,٢ مترًا علماً بأن العلاقة بين ف، ن تُعطى كالتالي $F = u - \frac{1}{2} g n^2$.

مقدمة عن الأعداد المركبة

Complex Numbers

٢ - ١


سوفي تتعلم



سيق أن درست نظيرنا مختلقة للأعداد، وهي نظام الأعداد الطبيعية "د" ونظام الأعداد الصحيحة "ص" ونظام الأعداد النسبية "ن" وغير النسبية "ن'" وأخيراً نظام الأعداد الحقيقة "ح" ورأينا أن أي نظام ينشأ كتوسيع للنظام الذي يسبقه لحل معادلات جديدة لم تكن قابلة للحل في النظام السابق، وإذا تأملنا المعادلة $x^4 = 1$ نجد أنها غير قابلة للحل في ح، إذ لا يوجد عدد حقيقي مربعه يساوي (-1) يتحقق المعادلة؛ لذا تحتاج لدراسة مجموعة جديدة من الأعداد تسمى مجموعة الأعداد المركبة.

المصطلحات الأساسية

- **Imaginary Number** عدّد تخيلي
- **Complex Number** عدّد مركب



بين الشكل المجاور: التمثيل البياني للدالة $ص = ص^2 + 1$ نلاحظ من الرسم أن منحنى الدالة لا يقطع محور السينات؛ وبذلك لا يكون للمعادلة $ص^4 = 1$ حلول حقيقة، لذا كان من الضروري التفكير في مجموعة جديدة للأعداد لحل هذا النوع من المعادلات.

العدد التخيلي

Imaginary number

يعرف العدد التخيلي بـ بأنه العدد الذي مربعه يساوي (-1)

لـ أن: $t^2 = -1$ وله الخاصية $\sqrt{-1} = t$ لـ كل $t \in \mathbb{C}$

وتسمى الأعداد التي على الصورة t , $-t$, $\sqrt{-t}$ **بالأعداد التخيلية**

الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية

بذلك نكتب $\sqrt{-1} = i$

$\sqrt{-5} = \sqrt{5}i$ وهكذا.....

تمرين: إذا كان a, b عددين حقيقيين سالبين، فهل من الممكن أن يكون $i(a+b) = i(a)i(b)$? فسر ذلك بمثال عددي.

الخط

ت يرمز لها بالرمز t

قوى التصيحة: Integer powers of t

العدد t يحقق قوانين الأسس التي سبق ذلك دراستها، ويمكن التعبير عن القوى المختلفة للعدد t كالتالي:

$$t^1 = t \times t \times t \times \dots \times t$$

$$t^0 = t$$

$$t^{-1} = t^{-1} \times t^{-1} \times t^{-1} \times \dots \times t^{-1}$$

$$t^{-1} = 1/t = t^0 - 1$$

ويوجه عام فإن: $t^0 = 1$ ، $t^{-1} = 1/t$ ، $t^{n+1} = t^n \times t$ ، $t^{n-1} = t^n / t$ حيث $n \in \mathbb{Z}$

مثال

أوجد كل مما يأتي في أبسط صورة:

١) t^{-3} ٢) t^0 ٣) t^{-2}

٤) t^1 ٥) t^2 ٦) t^3

الحل

١) $t^{-3} = (t^1)^{-1} \times t^{-1} = 1 \times t^{-1} = t^{-1} = -t$

٢) $t^0 = (t^1)^0 \times t^0 = 1 \times t^0 = t^0$

٣) $t^{-2} = t^{-1} \times t^{-1} = (t^1)^{-1} \times (t^1)^{-1} = t^{-1} = -t$

٤) $t^1 = (t^1)^1 \times t^1 = 1 \times t^1 = t^1$

Complex number



العدد المركب

العدد المركب هو العدد الذي يمكن كتابته على الصورة $a+bi$ حيث $a, b \in \mathbb{R}$. ويبين الشكل التالي مجموعات الأعداد التي تشكل جزءاً من نظام العدد المركب.

الأعداد المركبة

الأعداد التخيلية

الأعداد الحقيقة

الأعداد غير النية

الأعداد النية

الأعداد غير الصحيحة

الأعداد الصحيحة

الأعداد الطبيعية

الأعداد الصحيحة السالبة

الأعداد الصحيحة الموجبة (أعداد المد)

الصفر

إذا كان a, b عددين حقيقيين فإن العدد $z = a + bi$ يسمى عدداً مركباً، وتسمى a بالجزء الحقيقي للعدد المركب z ، b بالجزء التخييلي للعدد المركب z .

وإذا كانت $b = 0$ فإن العدد $z = a$ يكون حقيقياً، وإذا كانت $a = 0$ فإن العدد $z = bi$ يكون تخييلياً حيث $b \neq 0$.

مثال

٢ حل المعادلة $s^2 + 125 = 61$

الحل

$$s^2 + 125 = 61$$

إضافة -125 إلى طرفي المعادلة

$$s^2 = 145 - 61 = 84$$

قسمة طرفي المعادلة على ٩

$$s^2 = 84$$

$$s = \pm \sqrt{\frac{84}{9}}$$

أخذ الجذر التربيعي

$$s = \pm \sqrt{\frac{84}{9}} t$$

تعريف العدد المركب

حاول أن تحل

٣ حل كلاً من المعادلات الآتية

$$75 = 100 + 4s$$

$$5s + 245 = 270$$

Equality of two complex numbers

تساوي عددين مركبين

يشاوي العددان المركبان إذا وفقط إذا تساوى الجزءان الحقيقيان وتساوي الجزءان التخيiliان.

إذا كان: $a + bi = c + di$ فإن: $a = c$ ، $b = d$ والعكس صحيح

مثال

٤ أوجد قيمتي s ، t اللتين تحققان المعادلة: $2s - 4t = (s - 4t)i$ حيث $s, t \in \mathbb{R}$

الحل

مساواة الجزأين الحقيقيين أحدهما بالأخر وكذلك الجزأين التخيiliين أحدهما بالأخر

$$2s - 4t = 0 , s - 4t = 0$$

$$s = 2 , t = 1$$

решل المعادلين يتبغ أن

حاول أن تحل

٥ أوجد قيمتي s ، t اللتين تتحققان كل من المعادلات الآتية

$$(2s + 1) + 4st = 12 - 5i$$

$$2s - 2 + (3s + 1)t = 7 + 10i$$

Operations on complex numbers

العمليات على الأعداد المركبة

يمكن استخدام خواص الإبدال والجمع والتوزيع عند جمع أو ضرب الأعداد المركبة، كما توضح ذلك الأمثلة التالية:

مثال

٤ أوجد في أبسط صورة ناتج كل مما يأتي:

$$(2+3t)(2-4t) \quad (b)$$

$$(7-4t)+(2+t) \quad (1)$$

الحل

$$(7-4t)+(2+t) = \text{المقدار} \quad (1)$$

باستخدام خاصيتي الإبدال والجمع
بالتبسيط

$$(1+4t)+(2+7t) =$$

$$= 3-9t$$

$$\text{المقدار} \quad (b)$$

باستخدام خاصية التوزيع
بنك الأقواس
حيث $t^2 = -1$

$$= 2(2-4t)+3(2-4t) =$$

$$= 12-8t+9t-12t =$$

$$= 12+9t-12t =$$

$$= (12+9t)-(12-12t) = 18t \quad \text{بالتبسيط}$$

حاول أن تحل

٥ أوجد في أبسط صورة ناتج كل مما يأتي:

$$(5-6t)(2+3t) \quad (2)$$

$$(4-3t)(4+3t) \quad (b)$$

$$(12-5t)-(7-9t) \quad (1)$$

Conjugate Numbers

العدادان المترافقان

العدادان المركبان $a+b\sqrt{-1}$ ، $a-b\sqrt{-1}$ يسميان بالعدادين المترافقين فنُهَلًا $a+3t$ ، $a+3t$ عددين مترافقان، حيث:

$$(1) (4-3t)(4+3t) = (4)^2 - (3t)^2$$

$$= 16 - 16t + 9t = 4t = \text{(الناتج عدد حقيقي)}$$

$$(2) (4-3t) + (4+3t) = 8 = \text{(الناتج عدد حقيقي)}$$

تفحص ناتج

هل بالضرورة أن يكون مجموع العدادين المترافقين هو دائمًا عددًا حقيقيًا؟ فُرِّ ذلك.

هل بالضرورة أن يكون حاصل ضرب العدادين المترافقين هو دائمًا عددًا حقيقيًا؟ فُرِّ ذلك.

مثال

٥ أوجد قيمتي s ، t اللتين تتحققان المعادلة:

$$\frac{(s+t)(s-t)}{s+t} = s + t \cdot s$$

الحل

$$\frac{s-t}{s+t} = s + t \cdot s$$

$$\text{بضرب البسط والمقام في مراتق المقام } (s+t) \times (s-t)$$

$$\frac{1+s}{1-s} = s + t \cdot s$$

$$\frac{1-s}{1+s} = s + t \cdot s$$

حاول أن تحل

٦ أوجد في أبسط صورة قيمة كل مما يأتي:

$$\begin{array}{lllll} 1 & \frac{1-6t}{2t} & 2 & \frac{2t}{2-t} & 3 & \frac{2-t}{2+t} \\ & & & & & & 4 & \frac{2+t}{2-t} & 5 & \frac{2-t}{2+t} \end{array}$$

مثال

٧ **كهرباء:** أوجد شدة التيار الكهربائي الكلية المار في مقاومتين متصلتين على التوازي في دائرة كهربائية مغلقة، إذا كانت شدة التيار في المقاومة الأولى $5 - 3t$ أمبير وفي المقاومة الثانية $2 + t$ أمبير (علمًا بأن شدة التيار الكلية تساوي مجموع شدتي التيار المار في المقابمتين).

الحل

• شدة التيار الكهربائي الكلية = مجموع شدتي التيار المار في المقابمتين.

$$= (5 - 3t) + (2 + t)$$

$$= (2 + 5) + (1 - 3t)t$$

$$= 7 - 2t \text{ أمبير}$$

حاول أن تحل

٨ إذا كانت شدة التيار الكهربائي الكلية المار في مقاومتين متصلتين على التوازي في دائرة كهربائية مغلقة تساوى $6 + 4t$ أمبير، وكانت شدة التيار المار في إحداهما $\frac{17}{4-t}$ ، فأوجد شدة التيار المار في المقاومة الأخرى.

١ تفھم ناقص أوجد في أبسط صورة (١ - ت)

تمارين (١ - ٣)

١ ضع كلاما يأتي في أبسط صورة:

$$٥ \quad ت + ت =$$

$$٢ \quad ت + ت =$$

$$١ \quad ت + ت =$$

٢ بسط كلاما يأتي:

$$٤ \quad (٢ - ت) + (٦ - ت) =$$

$$١ \quad ١٢ - ٦ \times ٦ - ٧$$

٣ أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:

$$١ \quad ٢٠ + ٢٠ + (٤ - ت) - (٥ - ت) =$$

٤ ضع كلاما يأتي على صورة $A + B$

$$٣ \quad (٢ + ت) + (٤ + ت) =$$

$$١ \quad (٢ + ٢) - (١ - ت) =$$

٥ ضع كلاما يأتي على صورة $A + B$

$$٥ \quad \frac{٢}{١+٢} + \frac{٤}{١+٢} =$$

$$١ \quad \frac{٢}{١+٢} + \frac{٤}{١+٢} =$$

٦ حل كل من المعادلات الآتية:

$$١ \quad ٣س^٢ + ٨٢ = ٠ \quad ٣س^٢ = ٨٢ - ٠ \quad ٣س^٢ = ٨٢ \quad س = \sqrt{\frac{٨٢}{٣}}$$

٧ تهريب: أوجد شدة التيار الكهربائي المار في مقاومتين متصلتين على التوازي في دائرة كهربائية مغلقة

إذا كانت شدة التيار في المقاومة الأولى $٤ - ٢t$ أمبير، وفي المقاومة الثانية $\frac{٦ - ٣t}{٢ + ٢t}$ أمبير

٨ اكتشف الذات: أوجد أبسط صورة للمقدار: $(٤ + ٣t)(٤ - ٣t)$

إجابة كريم

$$(٤ + ٣t)(٤ - ٣t) = (٤ + ٣t)(٤ - ٣t) = \\ (٤ - ٣t)(٤ + ٣t) = (٤ - ٣t)(٤ + ٣t) = \\ ١٦ + ١٢t - ١٢t - ٩t^2 = ١٦ - ٩t^2 =$$

إجابة أحمد

$$(٤ + ٣t)(٤ - ٣t) = (٤ + ٣t)(٤ - ٣t) = \\ (٤ - ٣t)(٤ + ٣t) = (٤ - ٣t)(٤ + ٣t) = \\ ١٦ + ١٢t - ١٢t - ٩t^2 = ١٦ - ٩t^2 =$$

أي الحلول صحيح؟ لماذا؟

تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية

٣ - ١

Determining the Types of Roots of a Quadratic Equation

سوى تعلم



سبق أن درست حل معادلة الدرجة الثانية (المعادلة التربيعية) في متغير واحد في ح؛ وعلمت من خلال حل المعادلة أن عدد حلولها الحقيقة إما أن يكون حلين أو حلاً وحياناً مكرراً، أو لا يوجد حل للمعادلة في ح، فهل يمكنك إيجاد عدد جذور (حلول) معادلة الدرجة الثانية في ح دون حلها؟

المميز

Discriminant

$$\text{جذراً للمعادلة التربيعية } \Delta = b^2 - 4ac \quad \text{حيث } a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}$$

$$\text{هذا: } \Delta = b^2 - 4ac$$

وكلتا الجذرين يحتوي على المقدار $b^2 - 4ac$.

المصطلحات الأساسية

Root

جذر

Discriminant

المميز

مثال

١) حدد نوع جذري كل من المعادلات الآتية:

$$1) \quad 2x^2 - 7x + 1 = 0$$

$$2) \quad x^2 + 5x - 30 = 0$$

الحل

لتحديد نوع الجذرين:

$$1) \quad 1 = 1, b = 1, \Delta = 7 - 4 = 3$$

$$\text{المميز} = b^2 - 4ac$$

$$= 1^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 - 8 = -7$$

؛ المميز موجب لذلك يوجد جذران حقيقيان مختلفان.

$$2) \quad 1 = 1, b = 2, \Delta = 1 - 4 = -3$$

$$\text{المميز} = b^2 - 4ac$$

$$= 2^2 - 4 \times 1 \times 1 = 4 - 4 = 0$$

؛ المميز يساوي صفرًا، إذن الجذران حقيقيان ومتاوايان.







الأدوات والوسائل

* آلة حاسبة علمية

$$95 = 30 \times 1 - 1 = 25$$

∴ المميز سالب، إذن يوجد جذران مركبان مترافقان (غير حقيقيين).

لاحظ أن

شكل تخطيطي للدالة المرتبطة بالمعادلة	نوع الجذرين	المميز
 	جذران حقيقيان مختلفان	(ب - أ ج) < 0
 	جذر حقيقي واحد مكرر (جذران متساويان)	ب - أ ج = 0
 	جذران مركبان مترافقان (غير حقيقيين).	ب - أ ج > 0

دائل ان تدل

١ عين نوع جذري كل معادلة من المعادلات التربيعية الآتية:

$$1) 6s^2 + 19s - 15 = 0$$

$$2) s(s+5) + 2(s-7) = 0$$

$$3) s(s-2) = 0$$

مثال

٢ أثبت أن جذري المعادلة $s^2 - 2s + 2 = 0$ مركبان وغير حقيقيين، ثم استخدم القانون العام لإيجاد هذين الجذرين.

الحل

$$1) s = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4}}$$

$$\therefore \text{المميز} = b^2 - 4ac$$

∴ المميز سالب

$$\text{القانون العام: } s = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

$$s = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2}$$

$$\therefore \text{جذرا المعادلة هما: } \frac{2 + \sqrt{-4}}{2}, \frac{2 - \sqrt{-4}}{2}$$

لهمّاذا هل بالضرورة أن يكون جذراً المعادلة التربيعية في مجموعة الأعداد المركبة عددين مترافقين؟ ووضح بمثال من عندك.

حاول أن تحل

- ٢ أثبت أن جذرى المعادلة $(s - 1)^2 + 5 = 0$ مركبان، ثم استخدم القانون العام لإيجاد هذين الجذرين.

مثال

٣ إذا كان جذراً المعادلة $s^2 - 2(k - 1)s + 9 = 0$ متساوين، فأوجد قيم k الحقيقة، ثم تحقق من صحة الناتج.

الدل

التحقق: عندما $k = 4$

$$b^2 - 4ac = 0$$

تصبح المعادلة: $s^2 - 4s + 9 = 0$

$$4(k - 1)^2 - 4 = 0$$

ويكون لها جذران متساويان هما: $-3, -3$

$$4k^2 - 8k - 4 = 0$$

التحقق: عندما $k = -2$

$$k^2 - 4k - 4 = 0$$

تصبح المعادلة: $s^2 - 6s + 9 = 0$

$$(k - 4)(k + 2) = 0$$

ويكون لها جذران متساويان هما: $3, 3$

$$k = 4 \text{ أو } k = -2$$

حاول أن تحل

٤ إذا كان جذراً المعادلة $s^2 - 2ks + 6s + 9 = 0$ متساوين، فأوجد قيم k الحقيقة، ثم أوجد الجذرين.

تمارين (١ - ٣)

أولاً: اختيار من متعدد:

١ يكون جذراً المعادلة $s^2 - 4s + k = 0$ متساوين إذا كانت:

$$\begin{array}{ll} 1. k = 1 & 2. k = 4 \\ 3. k = 8 & 4. k = 16 \end{array}$$

٢ يكون جذراً المعادلة $s^2 - 2s + m = 0$ حقيقيين مختلفين إذا كانت:

$$\begin{array}{ll} 1. m = 1 & 2. m > 1 \\ 3. m < 1 & 4. m = 4 \end{array}$$

٣ يكون جذراً المعادلة $(s - 9)^2 + 12s + 1 = 0$ مركبين غير حقيقيين إذا كانت:

$$\begin{array}{ll} 1. L < 4 & 2. L > 4 \\ 3. L = 4 & 4. L = 1 \end{array}$$

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

٤ حدد عدد الجذور وأنواعها لكل معادلة من المعادلات التربيعية الآتية:

$$1. s^2 - 2s + 5 = 0$$

$$2. 3s^2 + 10s - 4 = 0$$

$$3. 6s^2 - 19s + 25 = 0$$

$$4. (s - 1)(s - 7) = 2(s - 3)(s - 4)$$

$$5. (s - 11) - s(s - 6) = 0$$

٥ أوجد حل كل من المعادلات الآتية في مجموعة الأعداد المركبة باستخدام القانون العام.

$$1 \quad s^2 - 4s + 4 = 0$$

$$2 \quad s^2 + 6s + 9 = 0$$

$$3 \quad s^2 - 1s + 1 = 0$$

$$4 \quad s^2 - 7s + 12 = 0$$

$$5 \quad s^2 - 3s + 2 = 0$$

٦ أوجد قيمة k في كل من الحالات الآتية:

أ إذا كان جذراً للمعادلة $s^2 + 4s + k = 0$ حقيقيين مختلفين.

ب إذا كان جذراً للمعادلة $s^2 - 3s + 2 + \frac{1}{k} = 0$ متساوين.

ج إذا كان جذراً للمعادلة $k s^2 - 8s + 16 = 0$ مركبين غير حقيقيين.

٧ إذا كان L, M عددين نسبين، فأثبت أن جذري المعادلة $Ls^2 + (L-M)s - M = 0$ عددان نبيان.

٨ يقدر عدد سكان جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٣ بالعلاقة:

$s = n + 1,4n + 91$ حيث (s) عدد السكان بالمليون، (n) عدد السنوات

أ كم كان عدد السكان عام ٢٠١٣

ب قدر عدد السكان عام ٢٠٢٢

ج قدر عدد السنوات التي يبلغ عدد السكان فيها ٣٣٤ مليوناً.

د اكتب مقالاً توضح فيه أسباب الزيادة المطردة في عدد السكان وكيفية علاجها.

٩ **اكتشف الخطأ** ما عدد حلول المعادلة $2s^2 - 6s + 5 = 0$ في \mathbb{C}

إجابة كريم

$$b = -4, C = (-6)^2 - 4(5) =$$

$$76 = 40 + 36 =$$

المميز موجب، في يوجد حلان حقيقيان مختلفان

إجابة أحمد

$$b = -4, C = (-6)^2 - 4 \times 2 \times 5 =$$

$$40 = 40 - 36 =$$

المميز سالب، فلا توجد حلول حقيقية

١٠ إذا كان جذراً للمعادلة $s^2 + 2(k+1)s + (k-1) = 0$ متساوين، فأوجد قيم k الحقيقة، ثم أجد الجذران.

١١ **تفكر ناقض**: حل المعادلة $3s^2 - 4s + 2 = 0$ في مجموعة الأعداد المركبة.

العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها

The Relation Between Two Roots of the Second Degree Equation and the Coefficients of its Terms

رسوف تتعلم

- كلية إعداد مصر الجذرين لمعادلة تربيعية معطلة.
- كلية إعداد حاصل ضرب الجذرين لمعادلة تربيعية بهما معرفة.
- كلية إعداد معادلة تربيعية بهما معرفة معاملة تربيعية أخرى.

فكرة ونقطة

نعلم أن جذري المعادلة $x^2 - 8x + 3 = 0$ هما $\frac{1}{2} + \frac{7}{2}$ ، $\frac{1}{2} - \frac{7}{2}$.
مجموع الجذرين $\frac{1}{2} + \frac{7}{2} = \frac{8}{2} = 4$
حاصل ضرب الجذرين $\frac{1}{2} \times \frac{7}{2} = \frac{7}{4}$

هل توجد علاقة بين مجموع جذري المعادلة ومعاملات حدودها؟
 هل توجد علاقة بين حاصل ضرب جذري المعادلة ومعاملات حدودها؟

نصل

مجموع الجذرين وحاصل ضربهما

Sum and multiply of two roots

- ### المصطلحات الأساسية
- **مجموع جذرين**
 - **حاصل ضرب جذرين**
- Sum of Two Roots
Product of Two Roots

جذراً المعادلة التربيعية $ax^2 + bx + c = 0$ هما:

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}, \quad \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

وباعتبار أن الجذر الأول = ل، الجذر الثاني = م فإن:

$$L + M = \frac{-b}{a} \quad (\text{أثبت ذلك}) \quad L M = \frac{c}{a}$$

تعميم في المعادلة التربيعية $ax^2 + bx + c = 0$ أوجد $L + M$ ، $L M$ في الحالات الآتية:

$$\text{إذا كان } a = 1 \quad \text{بـ إذا كانت } b = 1$$

الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية

مثال

١ دون حل المعادلة أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة:
 $2x^2 + 5x - 12 = 0$

الحل

$$\begin{aligned} & L + M = -\frac{b}{a} = -\frac{5}{2} = -2.5 , \quad L M = \frac{c}{a} = \frac{-12}{2} = -6 \\ & \text{مجموع الجذرين} = -\frac{5}{2} = -2.5 \\ & \text{حاصل ضرب الجذرين} = \frac{-12}{2} = -6 \end{aligned}$$

حاول أن تحل

- ١ دون حل المعادلة أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري كل من المعادلات الآتية:
- $$1) \quad 2s^2 + s - 6 = 0 \quad 2) \quad 2s^2 - 2s - 20 = 0 \quad 3) \quad (s+2)(s-3) = 0$$

مثال

- ٢ إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة $2s^2 - 3s + k = 0$ يساوى ١ فأوجد قيمة k ، ثم حل المعادلة.

الحل

$$\begin{aligned} \text{حاصل ضرب الجذرين} &= ج \cdot ب \\ 1 &= ج \cdot ب \\ 1 &= 2 \cdot 2 \Rightarrow ج = 1 \\ \text{القانون العام: } s &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot k}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8k}}{4} \\ \text{مجموعة حل المعادلة هي: } & \left(\frac{3 + \sqrt{9 - 8k}}{4}, \frac{3 - \sqrt{9 - 8k}}{4} \right) \end{aligned}$$

حاول أن تحل

- ٣ إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة $3s^2 + 10s - ج = 0$ هو $\frac{1}{3}$ فأوجد قيمة $ج$ ، ثم حل المعادلة.
- ٤ إذا كان مجموع جذري المعادلة $2s^2 + بs - 2 = 0$ هو $-\frac{7}{2}$ فأوجد قيمة $ب$ ، ثم حل المعادلة.

مثال

- ٥ إذا كان $(1-t)$ هو أحد جذور المعادلة $s^2 - 2s + 1 = 0$ حيث $t \neq 0$ فأوجد:
- ١ قيمة t
 - ٢ الجذر الآخر

الحل

$$\begin{aligned} 1) \quad t &= 1, \quad b = -2, \quad ج = 1 \\ 2) \quad 1-t & \text{ هو أحد جذري المعادلة} \\ & \text{لأن الجذرين مترافقان ومجموعهما} = 2 \\ & \therefore \text{الجذر الآخر} = 1-t \\ & \therefore 1+t = 1 \\ & \therefore t = 0 \end{aligned}$$

حاول أن تحل

- ٦ إذا كان $(2-t)$ هو أحد جذور المعادلة $s^2 - 4s + ب = 0$ حيث $t \neq 0$ فأوجد:
- ١ قيمة t
 - ٢ الجذر الآخر.

١١ تعلم

تكوين المعادلة التربيعية مني علم جذراها

Forming the quadratic equation whose roots are known

بفرض أن L, M هما جذرا المعادلة التربيعية: $x^2 + Bx + C = 0$

بنسبة طرق المعادلة على أ: $x^2 + \frac{B}{L}x + \frac{C}{L} = 0$

أى $x^2 - \left(\frac{-B}{L}\right)x + \frac{C}{L} = 0$

$\therefore L, M$ جذرا المعادلة التربيعية ، $L + M = -\frac{B}{L}$ ، $L M = \frac{C}{L}$

\therefore المعادلة التربيعية التي جذراها L, M هي: $x^2 - (L + M)x + L M = 0$

مثال

٤ كون المعادلة التربيعية التي جذراها $4, -3$

الحل

ليكن جذرا المعادلة هما L, M

$\therefore L + M = 4 + (-3) = 1$ ، $L M = 4 \times (-3) = -12$ ، \therefore صيغة المعادلة التربيعية هي: $x^2 - (L + M)x + L M = 0$

\therefore المعادلة هي: $x^2 - x - 12 = 0$

مثال

٥ كون المعادلة التربيعية التي جذراها: $\frac{1}{1-t}, \frac{1}{2-t}$

الحل

ليكن جذرا المعادلة هما L, M

$$L = \frac{1}{1-t} \times \frac{1}{2-t} = \frac{1-t}{(1-t)(2-t)} = \frac{1-t}{2-t}$$

$$M = \frac{1}{2-t} \times \frac{1}{1-t} = \frac{2-t}{(1-t)(2-t)} = \frac{2-t}{1-t}$$

$$L + M = 2-t + 1-t = 3-t$$

$$L M = 2-t \times 1-t = -t^2 + t$$

\therefore المعادلة التربيعية التي جذراها L, M : $x^2 - (L + M)x + L M = 0$

$\therefore x^2 - 3t + t = 0$


دائل أو ندل

٦ كون المعادلة التربيعية في كل مما يأتي بعلوية جذريها:

ب) $-9, -5, -2$

أ) $2, -3, -\frac{2}{5}$

تفكر نقد: الشكل المجاور يمثل مجموعة من منحنيات بعض الدوال التربيعية التي يمر كل منها بال نقطتين $(-2, -2)$ و $(0, 0)$.
أوجد قاعدة كل دالة من هذه الدوال



تكوين معادلة تربيعية بمعطى معايير معادلة تربيعية أخرى

Forming a quadratic equation from the roots of another equation

مثال

- ٦ إذا كان L, M جذري المعادلة $2s^2 - 3s - 1 = 0$ ف تكون المعادلة التربيعية التي جذراها L, M .

الحل

$$\begin{aligned} \text{المعادلة المعلومة بالتعويض عن } L = 2, M = -3, \text{ جذ} &= 1: L + M = \frac{-3}{2}, LM = -\frac{1}{2} \\ \text{المعادلة المطلوبة بالتعويض عن } L + M &= \frac{-3}{2}, LM = -\frac{1}{2} \text{ في الصيغة } L^2 + M^2 = (L + M)^2 - 2LM \\ \therefore L^2 + M^2 &= (L + M)^2 - 2LM = \left(\frac{-3}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \\ \frac{13}{4} &= \frac{9}{4} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{4} \\ \therefore L^2 + M^2 &= (LM)^2 \\ (LM)^2 &= \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

لانتظار

$$\begin{aligned} L^2 + M^2 &= (LM)^2 \\ (LM)^2 &= (L + M)^2 - 4LM \end{aligned}$$

بالتعويض في صيغة المعادلة التربيعية: $s^2 - (\text{مجموع الجذرين})s + \text{حاصل ضربهما} = 0$
 $s^2 - \frac{13}{4}s + \frac{1}{4} = 0$ بضرب طرفي المعادلة في ٤
 \therefore المعادلة التربيعية المطلوبة هي: $4s^2 - 13s + 4 = 0$

حاول أن تحل

- ٦ في المعادلة السابقة $2s^2 - 3s - 1 = 0$ كون المعادلات التربيعية التي جذرا كل منها كالتالي:
 ١) $L + M, LM$ ٢) $\frac{1}{L}, \frac{1}{M}$

تحقق من نتائجك

- ١) في كل مما يأتي كون المعادلة التربيعية التي جذراها:
 ١) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ٢) $-2, -3, -5$
 ٣) $2, 3, 5$ ٤) $2, 3, 5, 7$
 ٥) $2, 3, 5, 7, 11$
 ٦) $2, 3, 5, 7, 11, 13$
- ٢) إذا كان L, M هما جذرا المعادلة $s^2 + 3s - 5 = 0$ ف تكون المعادلة التربيعية التي جذراها L, M .

تمارين (١ - ٤)

أولاً: أكمل ما يأتى:

- ١ إذا كان $s = 3$ أحد جذري المعادلة $s^2 + ms - 27 = 0$ فإن $m = \dots$ ، الجذر الآخر = \dots
- ٢ إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة $: 4s^2 + 7s + 2k = 0$ يساوى مجموع جذري المعادلة $s^2 - (k + 4)s = 0$ فإن $k = \dots$
- ٣ المعادلة التربيعية التي كل من جذرها يزيد ١ عن كل من جذري المعادلة $s^2 - 2s + 2 = 0$ هي \dots
- ٤ المعادلة التربيعية التي كل من جذرها ينقص ١ عن كل من جذري المعادلة $s^2 - 5s + 6 = 0$ هي \dots

ثانياً: الاختيار من متعدد

- ٥ إذا كان أحد جذري المعادلة $s^2 - 3s + 4 = 0$ ضعف الآخر فإن جد تساوى

٤	٥	٦	٧
١	٢	٣	٤
- ٦ إذا كان أحد جذري المعادلة $s^2 - 3s + 2 = 0$ معكوساً اختيارياً للأخر، فإن اتساوي

٢	٣	٤	٥
١	٢	٣	٤
- ٧ إذا كان أحد جذري المعادلة $s^2 - (b - 3)s + 5 = 0$ معكوساً جمعياً للأخر، فإن ب تساوى

٥	٦	٧	٨
١	٢	٣	٤

ثالثاً: أجب عن الأسئلة الآتية

- ٨ أوجد مجموع وحاصل ضرب جذري كل معادلة فيما يأتى:

١	٢	٣	٤
$s^2 + 14s - 25 = 0$	$s^2 + 4s + 4 = 0$	$s^2 + 19s + 14 = 0$	$s^2 - 14s - 25 = 0$
- ٩ أوجد قيمة أثم أوجد الجذر الآخر للمعادلة في كل مما يأتى:
 - ١ إذا كان $s = -1$ أحد جذري المعادلة $s^2 - 2s + 1 = 0$
 - ٢ إذا كان $s = 2$ أحد جذري المعادلة $s^2 - 5s + 1 = 0$
- ١٠ أوجد قيمة أ، ب في كل من المعادلات الآتية إذا كان:
 - ١ $5, 2$ جذراً المعادلة $s^2 + As + B = 0$
 - ٢ $7, 3$ جذراً المعادلة $s^2 - Bs - 21 = 0$
 - ٣ $1, \frac{3}{2}$ جذراً المعادلة $s^2 - Cs + B = 0$
 - ٤ $2, 3$ جذراً المعادلة $s^2 + As + B = 0$

١١ ابحث نوع الجذرين لكل من المعادلات الآتية، ثم أوجد مجموعة حل كل منها:

ب) $x^2 + 2x - 35 = 0$

أ) $x^2 + 7x + 12 = 0$

ب) $x^3 - 8x^2 + 16x = 0$

أ) $x(x - 4) = 0$

١٢ أوجد قيمة جد التي تجعل جذري المعادلة جد $x^2 - 12x + 9 = 0$ متساوين.

١٣ أوجد قيمة a التي تجعل جذري المعادلة $x^2 - 3x + 2a = 0$ متساوين.

١٤ أوجد قيمة جد التي تجعل جذري المعادلة $3x^2 - 5x + a = 0$ متساوين، ثم أوجد الجذرين.

١٥ أوجد قيمة k التي تجعل أحد جذري المعادلة $x^2 + (k-1)x - 2 = 0$ هو المعكوس الجمعي للجذر الآخر.

١٦ أوجد قيمة k التي تجعل أحد جذري المعادلة $4x^2 + 7x + k^2 + 4 = 0$ هو المعكوس الضريبي للجذر الآخر.

١٧ كون معادلة الدرجة الثانية التي جذراها كالتالي :

ب) $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}$

أ) $-5, 5$

ب) $x^2 - 2x - 24 = 0$

أ) $x^2 + 11x + 27 = 0$

١٨ أوجد المعادلة التربيعية التي جذراها ضعفاً جذري المعادلة $2x^2 - 8x + 5 = 0$.

١٩ أوجد المعادلة التربيعية التي كل من جذريها يزيد بمقدار 1 عن كل من جذري المعادلة $x^2 - 7x - 6 = 0$.

٢٠ أوجد المعادلة التربيعية التي كل من جذريها يساوى مربع نصفه من جذري المعادلة $x^2 + 3x - 5 = 0$.

٢١ إذا كان ل، م جذري المعادلة $x^2 - 7x + 3 = 0$ ، فأوجد معادلة الدرجة الثانية التي جذراها:

أ) $L^2 + M^2$ ب) $L + M$ ج) $\frac{L}{M}$

مساحت قطعة أرض على شكل مستطيل بعدها ٦، ٩ من الأمتار، يراد مضاعفة مساحة هذه القطعة وذلك بزيادة طول كل بعد من أبعادها بنفس المقدار. أوجد المقدار المضاف.

تفكير ناقد أوجد مجموعة قيم جد في المعادلة التربيعية $s^2 + 14s + 41 = 0$ بحيث يكون للمعادلة:

- جذران حقيقيان مختلفان.
- جذران حقيقيان متساويان.
- جذران مركبان.

اكتشف الخطأ إذا كان $L + M = 1$ هما جذراً للمعادلة $s^2 + 5s + 3 = 0$ فاؤجد المعادلة التربيعية التي جذراها L, M

حل أميرة

$$\begin{aligned} L + M &= -5, \quad LM = 3 \\ \therefore (L + 1) + (M + 1) &= L + M + 2 \\ 2 &= 2 + 5 - 1 \\ \therefore (L + 1)(M + 1) &= LM + (L + M) + 1 \\ 1 &= 1 + 3 - 3 \\ \text{المعادلة هي: } s^2 + 3s + 1 &= 0 \end{aligned}$$

حل يوسف

$$\begin{aligned} \therefore (L + 1) + (M + 1) &= 5 \\ \therefore L + M &= 2 + 5 - 2 \\ \therefore (L + 1)(M + 1) &= LM + (L + M) + 1 \\ 2 &= 1 + 7 - 2 \\ \therefore LM &= 9 \\ \text{المعادلة هي: } s^2 + 7s + 9 &= 0 \end{aligned}$$

تفكير ناقد إذا كان الفرق بين جذري المعادلة $s^2 + ks + 2k = 0$ يساوي ضعف حاصل ضرب جذري المعادلة $s^2 + 3s + k = 0$ فاؤجد k .

إشارة الدالة

Sign of the Function

سوف نتعلم

سيق أن درست التمثيل البياني لدالة الدرجة الأولى ودالة الدرجة الثانية، وتعرفت على الشكل العام لمنحنى كل دالة. فهل يمكنك بحث إشارة كل من هذه الدوال؟ المقصود ببحث إشارة الدالة هو تحديد قيم المتغير s (مجال s) التي تكون عندها قيمة الدالة $d(s)$ على النحو الآتي:


- موجبة، أي $d(s) > 0$
- سالبة، أي $d(s) < 0$
- مساوية للصفر $d(s) = 0$



المصطلحات الأساسية

أولاً: إشارة الدالة الثابتة

إشارة الدالة الثابتة d حيث $d(s) = c$ ($c \neq 0$) هي نفس إشارة جد لكل $s \in \mathbb{R}$. والشكل التالي يوضح إشارة الدالة d .



- إشارة دالة
- دالة ثابتة
- دالة خطية (دالة الدرجة الأولى)
- دالة تربيعية (دالة الدرجة الثانية)
- Quadratic Function

الأدوات والوسائل

- ➊ عين إشارة كل من الدوال الآتية:
 - ١ $d(s) = 7$
 - ٢ $d(s) = -s$
- ➋ إشارة الدالة موجبة لـ كل $s \in \mathbb{R}$
- ➌ إشارة الدالة سالبة لـ كل $s \in \mathbb{R}$



٤ آلة حاسبة علمية

حاول أن تحل

١ عين إشارة كل من الدوال الآتية:


٢ $d(s) = \frac{2}{s}$

١ $d(s) = -\frac{2}{s}$

Second: Sign of the Linear Function

ثانية: إشارة دالة الدرجة الأولى (الدالة الخطية)

قاعدة الدالة d هي $d(s) = b s + c$ ، حيث $b \neq 0$.

والشكل الآتي الثاني يوضح إشارة الدالة d .**مثال**٢ عين إشارة الدالة d حيث $d(s) = s - 2$ مع توضيح ذلك بيانياً.**الحل**

قاعدة الدالة:

رسم الدالة:


فإن $s = 2$ ، فإن $d(s) = 0$

عندما $s = 0$ ، فإن $d(s) = -2$

من الرسم نجد أن:

ـ الدالة موجبة عندما $s < 2$

ـ الدالة $d(s) = 0$ عندما $s = 2$


ـ الدالة سالبة عندما $s > 2$ **حاول أن تحل**٢ عين إشارة الدالة $d(s) = -2s - 4$ مع توضيح ذلك بيانياً.

ثالثاً، إشارة الدالة التربيعية

لتعيين إشارة الدالة التربيعية d ، حيث $d(s) = As^2 + Bs + C$

نوجد مميز المعادلة $As^2 + Bs + C = 0$ فإذا كان:

أولاً: $B^2 - 4AC < 0$ فإنه يوجد للمعادلة جذران حقيقيان L ، M ، وبفرض أن $L < M$ تكون إشارة الدالة كما في الأشكال الآتية:



مثال

- ٢ مثل بيانياً d ، حيث $d(s) = s^2 - 2s - 3$ ثم عين إشارة الدالة d .

الحل

بتحليل المعادلة: $s^2 - 2s - 3 = 0$

$$(s - 3)(s + 1) = 0$$

فيكون جذراً المعادلة: $s_1 = 3$ ، $s_2 = -1$

من الرسم نجد أن:


$\Rightarrow d(s) < 0$ عندما $s \in [-1, 3]$

$\Rightarrow d(s) > 0$ عندما $s \in [3, \infty)$


$\Rightarrow d(s) = 0$ عندما $s \in \{-1, 3\}$

حاول أن تحل *

- ٣ مثل بيانياً d ، حيث $d(s) = s^2 - s - 6$ ثم عين إشارة الدالة d .



مثال: إذا كان: $b^2 - 4ac > 0$ فإنه لا توجد جذور حقيقية، وتكون إشارة الدالة د مثل إشارة معامل س، والأشكال التالية توضح ذلك.


**مثال**

(٤) مثل بيانياً د حيث $d(x) = x^2 - 4x + 5$ ثم عين إشارة الدالة د.

الحل

$$\text{المعير } (b^2 - 4ac) = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 16 - 20 = -4 < 0$$


لذلك فإن المعادلة $x^2 - 4x + 5 = 0$ ليس لها جذور حقيقة
إشارة الدالة موجبة لـ كل س $\in \mathbb{R}$ (لأن معامل س > 0)

**حاول أن تحل**


(٤) مثل بيانياً د، حيث $d(x) = -x^2 - 2x - 4$ ثم عين إشارة الدالة د.

مثال: إذا كان: $b^2 - 4ac = 0$ فإنه يوجد للمعادلة جذران متساويان، ويكون كل منهما يساوى ل، وتكون إشارة الدالة د كالتالي:
ـ كـ مثل إشارة أ عندما س ≠ ل
ـ كـ مثل إشارة د عندما س = ل

والأشكال الآتية توضح ذلك.



مثال



- ٥ مثل بياناً د حيث $d(s) = 4s^2 - 4s + 1$ ثم عين إشارة الدالة د.

الحل

$$\text{المميز} (b^2 - 4ac) = (-4)^2 - 4 \times 4 \times 1 = 16 - 16 = 0$$

لذلك فإن المعادلة $4s^2 - 4s + 1 = 0$ لها جذراً متساوياً.

$$\text{بالتحليل: } (2s - 1)^2 = 0$$

$$\text{بوضع: } 2s - 1 = 0 \Rightarrow s = \frac{1}{2}$$

$$d(s) > 0 \text{ عندما } s \neq \frac{1}{2}, \quad d(s) = 0 \text{ عندما } s = \frac{1}{2}$$

حاول أن تحل

- ٦ مثل بياناً د، حيث $d(s) = -4s^2 - 4s - 9$ ثم عين إشارة الدالة د.

مثال

- ٦ أثبت أنه لجميع قيم س \exists ع يكون جذراً للمعادلة $2s^2 - ks - k = 0$ صفر حقيقين مختلفين

الحل

$$\text{المميز} (b^2 - 4ac) = (-k)^2 - 4 \times 2 \times (-k) = k^2 + 8k = k(k + 8)$$

يكون جذراً للمعادلة حقيقين مختلفين إذا كان المميز موجباً

$$\text{ليبحث إشارة المقدار } \begin{cases} \text{ع} < 0 \\ \text{ع} > 0 \end{cases}$$

فيكون مميز المعادلة $k^2 + 8k < 0$ هو:

$$k(k + 8) < 0 \Rightarrow -8 < k < 0$$

لذلك فإن المعادلة $2s^2 - ks - k = 0$ ليس لها جذور حقيقة

\therefore إشارة المقدار $\begin{cases} \text{ع} < 0 \\ \text{ع} > 0 \end{cases}$

فيكون مميز المعادلة $2s^2 - ks - k = 0$ صفر

\therefore جذراً للمعادلة $2s^2 - ks - k = 0$

موجبة لـ كل س \exists ع
موجب لـ كل س \exists ع
حقيقيان مختلفان لـ كل س \exists ع

تحقق من فهمك

- ١ عين إشارة كل دالة من الدوال الآتية:

٢ $d(s) = s^2 - 4$

٣ $d(s) = 4s - s^2$

٤ $d(s) = 2s - 3$

٥ $d(s) = 2s^2 - 2s + s^3$

٦ $d(s) = 4 + 4s + s^2$



٧ $d(s) = 1 - s^2$



تمارين (١ - ٥)



أولاً، أكمل ما ياتي:

١ الدالة d ، حيث $d(s) = -s$ إشاراتها في الفترة٢ الدالة d ، حيث $d(s) = s^2 + s$ إشاراتها في الفترة٣ الدالة d ، حيث $d(s) = s^2 - 6s + 9$ موجبة في الفترة٤ الدالة d ، حيث $d(s) = s - 2$ موجبة في الفترة٥ الدالة d ، حيث $d(s) = 3 - s$ سالبة في الفترة٦ الدالة d ، حيث $d(s) = -(s-1)(s+2)$ موجبة في الفترة٧ الدالة d ، حيث $d(s) = s^2 + 4s - 5$ سالبة في الفترة٨ الشكل المرسوم يمثل دالة من الدرجة الأولى في s :١ $d(s)$ موجبة في الفترة٢ $d(s)$ سالبة في الفترة٩ الشكل المرسوم يمثل دالة من الدرجة الثانية في s :١ $d(s) = 0$ عندما $s \in$ ٢ $d(s) < 0$ عندما $s \in$ ٣ $d(s) > 0$ عندما $s \in$

ثانياً، أجب عن الأسئلة الآتية:

١٠ في التمارين من ١ إلى ٥ عين إشارة كل من الدوال الآتية:

١ $d(s) = 4$
٢ $d(s) = 2s$ ٣ $d(s) = -3s$
٤ $d(s) = 2s^2 + 4$ ٥ $d(s) = 3 - 2s$
٦ $d(s) = s^2 - 4$ ٧ $d(s) = 4s^2$
٨ $d(s) = s^2 - 4$

$$\text{ط} \cdot d(s) = s - 1 - s$$

$$\text{ك} \cdot d(s) = (2s - 3)^2$$

$$\text{م} \cdot d(s) = s^2 - 8s + 16$$

$$\text{ج} \cdot d(s) = (s - 2)(s + 2)$$

$$\text{ل} \cdot d(s) = s^2 - s - 2$$

$$\text{ن} \cdot d(s) = -4s^2 + 10s + 45$$

١١ ارسم منحني الدالة $d(s) = s^2 - 9$ في الفترة $[3, 4]$ ، ومن الرسم عين إشارة $d(s)$.

١٢ ارسم منحني الدالة $d(s) = -s^2 + 4s + 4$ في الفترة $[0, 5]$ ، ومن الرسم عين إشارة $d(s)$.

١٣ **اكتشف الخطأ:** إذا كانت $d(s) = s + 1$ ، $r(s) = 1 - s^2$ فعين الفترة التي تكون فيها الدالتان موجيتين معاً.

حل أمثلة

$$s = 1 - \frac{1}{r(s)}$$

$d(s)$ موجبة في الفترة $[0, 1]$.

$$s = 1 \pm \sqrt{1 - r(s)}$$

$r(s)$ موجبة في الفترة $[1, 1]$.

لذلك فإن الدالتين تكونان موجيتين معاً في الفترة

$$[1, 1] = [1, 1] \cap [0, 1] = [1, 1]$$

حل بوروف

$$s = 1 - \frac{1}{r(s)}$$

$d(s)$ موجبة في الفترة $[0, 1]$.

$$s = 1 \pm \sqrt{1 - r(s)}$$

$r(s)$ موجبة في الفترة $[1, 1]$.

لذلك فإن الدالتين تكونان موجيتين معاً في الفترة

$$[1, 1] = [1, 1] \cap [0, 1] = [1, 1]$$

أي الإجابتين يكون صحيحاً مثل كلاً من الدالتين بياناً وتأكد من صحة الإجابة.

١٤ **مناجم الذهب:** في الفترة من عام ١٩٩٠ إلى ٢٠١٠ كان إنتاج أحد مناجم الذهب مقدراً بالآلاف أوقية بتحدد

بالدالة $d: d(n) = 12n^2 - 480n + 480$ حيث n عدد السنوات، $d(n)$ إنتاج الذهب

أولاً: ابحث إشارة دالة الإنتاج d .

ثانياً: أوجد إنتاج منجم الذهب مقدراً بالآلاف أوقية في كل من العامين ٢٠٠٥، ١٩٩٠

ثالثاً: في أي عام كان إنتاج المنجم مساوياً ٢٠١٦ ألف أوقية؟

متباينات الدرجة الثانية في مجهول واحد

7-1

Quadratic Inequalities

Digitized by srujanika@gmail.com

Quadratic Inequalities

المتباينات التي تسمى:

- ٤ حل المبادئ التربوية في متغير واحد



سيق أن درست متباعدة الدرجة الأولى في مجهول واحد، وعلمت أن حل المتباعدة معناد إيجاد جميع قيم المجهول التي تتحقق هذه المتباعدة، وتكتب على صورة فترات، فهل يمكنك حل متباعدة الدرجة الثانية في مجهول واحد؟

三

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2022.08.16.501000>; this version posted August 16, 2022. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under a [aCC-BY-ND 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

هي متابعة تربيعية كما هو موضح بالشكل الثاني

• < 4 - مس

يتم د(س) = س٢ - س٠ هي الدالة التربيعية المرتبطة بهذه المترابطة.

— 1 —

五

من الشكل المقابل نجد أن:

مجموّعة حل المتابنة


س - س - ۴ - < . فی ع

٢- مجموعة حل المتباينة

س۴-س۵> فی ع
هنا [۲، ۱]

الادوات و الموسائل

Page 50



حل المتمايزة التربيعية

The logo consists of the word "pico" in a lowercase, sans-serif font, enclosed within a green rounded rectangular frame. To the right of the frame, there is a vertical green bar with a diagonal white line running from the top-left to the bottom-right corner.

三

١ حل المتباينة: من -6 إلى -1 .

الحل

لحل هذه المتباينة تتبع الخطوات التالية:

خطوة (١): تكتب الدالة التربيعية المرتبطة بالمتباينة وذلك كالتالي:

$$d(s) = s^2 - 5s - 6$$


خطوة (٢): ندرس إشارة الدالة d حيث $d(s) = s^2 - 5s - 6$,

ونوضحها على خط الأعداد بوضع $d(s) = 0$:

$$s^2 - 5s - 6 = 0$$

$$\therefore (s - 6)(s + 1) = 0$$

$$s = 6 \quad \text{أو} \quad s = -1$$



خطوة (٣): تحدد الفترات التي تتحقق المتباينة $s^2 - 5s - 6 < 0$.



فيكون مجموعة حل المتباينة هي: $[-1, 6)$

حاول أولاً تحل

١ حل كلاً من المتباينات الآتية:

ب) $s^2 + s + 12 < 0$

أ) $s^2 + 3s - 8 < 0$

مثال

٢ حل المتباينة: $(s + 3)^2 \geq 10 - 3(s + 3)$.

الحل

$$\therefore (s + 3)^2 \geq 10 - 3(s + 3)$$

$$\therefore s^2 + 6s + 9 \geq 10 - 3s - 9$$

$$\therefore s^2 + 9s + 8 \geq 0$$

$$\therefore s^2 + 9s + 8 = 0$$


$$\therefore (s + 1)(s + 8) = 0$$

المعادلة المرتبطة بالمتباينة هي:

بالتحليل إلى عوامل:

مجموعة حل المعادلة: $\{-8, -1\}$

* ويوضح خط الأعداد التالي إشارة الدالة $d(s) = s^2 + 9s + 8$.



وعلى ذلك فإن: مجموعة حل المتباينة هي: $[-\infty, -8) \cup (1, \infty)$

حاول أن تحل

٢ حل المتباينات الآتية:

$$1. 5s^2 + 12s \leq 44$$

تدقيق من ف Hessam

١ ما الفرق بين معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد ومتباينة الدرجة الثانية في متغير واحد؟

٢ ما علاقة بحث إشارة الدالة التربيعية بحل متباينات الدرجة الثانية في متغير واحد؟

٣ اكتشف الذطاً: أوجد مجموعة حل المتباينة $(s+1)^2 > 4(s-1)^2$


حل نور

$$\begin{aligned} & (s+1)^2 > 4(s-1)^2 \\ & s^2 + 2s + 1 > 4(s^2 - 2s + 1) \\ & s^2 + 2s + 1 > 4s^2 - 8s + 4 \end{aligned}$$

المعادلة المرتبطة بالمتباينة هي:

$$0 = 3s^2 - 10s + 3$$

مجموعه الحل هي $\left(\frac{1}{3}, 1 \right)$



* بحث إشارة الدالة د حيث

$$d(s) = 15s^2 - 18s + 3$$

نجد أن:

مجموعه حل المتباينة هي ح $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup (1, \infty)$

حل يوسف

$$\begin{aligned} & (s+1)^2 > 4(s-1)^2 \\ & s^2 + 2s + 1 > 4(s^2 - 2s + 1) \quad \text{وذلك بأخذ الجذر} \\ & \text{التربيعي للطرفين} \end{aligned}$$

$$0 > -3s^2 + 6s + 1 + 2$$

$$0 > 3s^2 - 6s - 1$$

المعادلة المرتبطة بالمتباينة هي:

$$0 = 3s^2 - 6s - 1$$

مجموعه الحل هي (1)



* بحث إشارة الدالة د حيث

$$d(s) = -3s^2 + 3$$

مجموعه حل المتباينة هي $[0, +\infty)$

٤ تفكير ناقد: أوجد مجموعة حل المتباينة $(s+3)^2 > 40 - 4(s+2)^2$

تمارين (١ - ٦)

أوجد مجموعة الحل للمعادلات التربيعية الآتية:

$$\textcircled{1} \quad 9x^2 > 1$$

$$\textcircled{2} \quad x^2 - 1 < 0$$

$$\textcircled{3} \quad 4x^2 - x > 0$$

$$\textcircled{4} \quad x^2 + 5 > 1$$

$$\textcircled{5} \quad (x - 2)(x - 5) > 0$$

$$\textcircled{6} \quad x(x + 2) \geq 3$$

$$\textcircled{7} \quad (x - 2)^2 \geq 5$$

$$\textcircled{8} \quad 5 - 4x \leq x^2$$

$$\textcircled{9} \quad x^2 \leq 6x - 9$$

$$\textcircled{10} \quad 3x^2 \geq 11x + 4$$

$$\textcircled{11} \quad x^2 - 4x + 4 \leq 0$$

$$\textcircled{12} \quad 7 + x^2 - 4x > 0$$

ملخص الوحدة

١ حل المعادلة: $(a^2 - b^2) = 0$ حيث $a^2 = b^2$, $a = \pm b$.

الطريقة
تحليل إلى العوامل
إكمال المربع
استخدام القانون العام
التثيل البياني

٢ بحث نوع جذري المعادلة التربيعية

يسمى المقدار $(b^2 - 4ac)$ يسمى المعايير التربيعية الذي يبين نوع جذور المعايير وعدد حلولها كالتالي:

• $b^2 - 4ac < 0$: يوجد جذران حقيقيان مختلفان.

• $b^2 - 4ac = 0$: يوجد جذر حقيقي واحد مكرر (جذران متساويان).

• $b^2 - 4ac > 0$: يوجد جذران مركبيان غير حقيقيين.

٣ الأعداد المركبة

العدد المركب هو الذي يمكن كتابته على الصورة $a + bi$, حيث a, b عدادان حقيقيان، b هو الجزء التخييلي، والجدول التالي يبين قوى ت للأسس الصحيحة الموجبة:

a^1	a^2	a^3	a^4
a	$-a$	$-a$	a

تساوي عددين مركبين: إذا كان $a + bi = c + di$ فإن $a = c$, $b = d$ والعكس صحيح

خواص العمليات: يمكن استخدام خواص الإبدال والتجميع والتوزيع عند جمع أو ضرب الأعداد المركبة، وعند جمع أو طرح الأعداد المركبة تجمع الأجزاء الحقيقة معًا وتجمع الأجزاء التخيلية معًا.

العدنان المترافقان: يسمى العددان $a + bi$, $c + di$ بالعدنان المترافقين

حيث ناتج جمعهما عدد حقيقي، وحاصل ضربهما عدد حقيقي أيضًا.

ملخص الوحدة

٤ مجموع وحاصل ضرب جذري المعادلة التربيعية:

إذا كان جذراً المعادلة $As^2 + Bs + C = 0$ هما L و M فإن $L + M = -\frac{B}{A}$ ، $LM = \frac{C}{A}$

٥ تكوين المعادلة التربيعية من علم جذراها:

إذا كانت L ، M جذري المعادلة التربيعية، فإن المعادلة التربيعية تكون على الصورة الآتية:

$$(S - L)(S - M) = 0 \quad \star$$


$$\text{إذا كان } L + M = -\frac{B}{A} , LM = \frac{C}{A} \text{ فإن المعادلة هي } S^2 - (L + M)S + LM = 0 \quad \star$$

٦ بحث إشارة الدالة

١ إشارة الدالة الثابتة D ، حيث $D(S) = JD$ ، ($J \neq 0$) هي نفس إشارة جد لكل $S \in \mathbb{R}$.


٢ قاعدة الدالة الخطية D هي $D(S) = BS + JD$ ، $B \neq 0$.

ف تكون $S = -\frac{JD}{B}$ عندما $D(S) = 0$ والشكل التالي يمثل إشارة الدالة D :



٣ لتعيين إشارة الدالة D ، حيث $D(S) = AS^2 + BS + JD$ ، فإننا نوجد المميز

٤ إذا كان: $B^2 - 4JD > 0$ فإن إشارة الدالة D تتحدد حسب الشكل التالي:



٥ إذا كان: $B^2 - 4JD = 0$ فإنه يوجد للمعادلة جذراً متساوياً L ، وتكون إشارة الدالة D كالآتي: ممثل إشارة S عندما $S \neq L$ ، $D(S) = 0$ عندما $S = L$

٦ إذا كان: $B^2 - 4JD < 0$ فإنه لا يوجد جذور حقيقية، وتكون إشارة الدالة D ممثل إشارة معامل S .

ملخص الوحدة

٧ حل ممتiyات الدرجة الثانية في مجهول واحد:

لحل الممتيات التربيعية نتبع الخطوات الآتية :

١ - نكتب الدالة التربيعية المرتبطة بالممتيات $s = d(s)$ في الصورة العامة.

٢ - ندرس اشارة الدالة d المرتبطة بالممتيات وتوضيحاً على خط الأعداد.

٣ - تحديد مجموعة حل الممتيات حسب الفترات التي تحققها.

معلومات إضافية @



قم بزيارة الموقع الآتي:



التشابه

Similarity

أهداف الوحدة

في نهاية الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على:

- يُعرف ويستخرج الخطبة التي تنص على: (المثلثان المتشابهان يمكن أن ينفصما إلى ...).
- يُعرف ويبرهن النظرية التي تنص على: (النسبة بين مساحتي مثلثين متشابهين تساوي ...).
- يُعرف ويستخرج التبرير المشهور الذي ينص على: (إذا تناصف المسطحان الخارجيان للوترين في دائرة في نقطة فإن ...) وعکه ونتائج عليه.
- يُعرف ويبرهن النظرية التي تنص على: (إذا تناصف أطوال الأضلاع المتساوية في مثلثين فإنهما متشابهان).
- يُعرف ويبرهن النظرية التي تنص على: (إذا طابت زاوية من مثلث زاوية من مثلث آخر، وتناولت أطوال الأضلاع التي تحولها هاتان الزاويتين، كان المثلثان متشابهين).
- يُعرف ويبرهن النظرية التي تنص على: (النسبة بين مساحتي مسطحين متشابهين تساوي ...).

المصطلحات الأساسية

Tangent	مماس	Corresponding Sides	أضلاع متساوية	نسبة
Diameter	قطر	Congruent Angles	زوايا متطابقة	تناسب
Common External Tangent	مماس خارجي مشترك	Regular Polygons	مقطع منتظم	قياس زاوية
Common Internal Tangent	مماس داخلي مشترك	Quadrilateral	شكل رباعي	طول
Concentric Circles	دوائر متجلدة المرتر	Pentagon	شكل خماسي	مساحة
Similarity Ratio	نسبة التشابه (معامل التشابه)	Postulate/Axiom	پدیده	ضرب تبادلى
		Perimeter	محيط	طرف
		Area of polygon	مساحة مضلع	وسط
		Chord	وتر	مضلعات متشابهة
		Secant	قاطع	مثلثات متشابهة

دروس الوحدة

- الدرس (٢ - ١): تشابه المضلوعات.
- الدرس (٢ - ٢): تشابه المثلثات.
- الدرس (٢ - ٣): العلاقة بين مساحتى مطحى مضلوعين متشابهين.
- الدرس (٢ - ٤): تطبيقات التشابه في الدائرة.

الأدوات المستخدمة

حاسب آلي - جهاز عرض بيانات - برامج رسومية - ورق مربعات - مرآة مسطحة - أدوات قياس - آلة حاسبة.



لديه تاريخية

عند البناء على قطعة من الأرض نحتاج إلى عمل رسم تحظيلي للمبنى، ومن البديهي أنه لا يمكن عمل هذا الرسم الهندسي على قطعة من الورق تطابق قطعة الأرض، وإنما ننجا إلى عمل صورة مصغرة تشبه الصورة الطبيعية للمبنى، وذلك باتخاذ مقاييس رسم مناسب للحصول على هذا التصغير، وقياسات زوايا على الرسم، بحيث تساوى قياسات زواياها في الواقع.

إذا تأملت الشكل الموضح في بداية الصفحة تلاحظ أن الطبيعة مليئة بأشكال تحوى على أبعاد تكرر نفسها بمقاييس مختلفة، ومن أمثلة ذلك أوراق الشجر، ورأس زهرة القرنيط، وتعرجات ساحل البحر. ملاحظة هذه الأنماط المتكررة أدى إلى ظهور هندسة جديدة منذ قرابة 40 عاماً، والتي تهتم بدراسة الأشكال ذاتية التesselation والتي تتكرر بغير انتظام، وقد أطلق عليها اسم هندسة الفناقيت أو هندسة الكسوريات fractals والتي سوف تدرسها في مراحل تعليمية تالية.


مخطط تظليلات الوحدة



تشابه المضلعات

Similarity of Polygons

سوق تعلم



فكرة و نافذ

يوضح الشكل المقابل المثلث $A-B-C$ جدّاً
وصورته $A'-B'-C'$ بتحويل هندسي
قارن بين قياسات الزوايا المتناظرة:
 $\angle A = \angle A'$ ، $\angle B = \angle B'$ ، $\angle C = \angle C'$
ماذا تنتهي؟

أوجد النسبة بين أطوال الأضلاع المتناظرة $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}$
ماذا تلاحظ؟

عندما يكون للمضلعات الشكل نفسه، وإن اختلفت في أطوال أضلاعها، فإنها تسمى مضلعاً متشابهاً.

Similar polygons

المضلعين المتشابهين

تعريف: يتشابه مضلعين لهما نفس العدد من الأضلاع إذا كانت الزوايا المتناظرة متطابقة وأطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة.

اللحوظات:

١- في الشكل التوضيحي **فكرو نقاش** نجد:
الزوايا المتناظرة متطابقة: $\angle A = \angle A'$ ، $\angle B = \angle B'$

$\angle C = \angle C'$ ، $\angle D = \angle D'$

٢- الأضلاع المتناظرة متناسبة: $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{DA}{D'A'} = \frac{1}{2}$

ولذلك يمكننا القول أن الشكل $A-B-C-D$ جدّاً يتشابه الشكل $A'-B'-C'-D'$.

٣- نستخدم الرمز (~) للتعبير عن تشابه مضلعين، ويراعى ترتيب كتابة رؤوسهما المتناظرة حتى يسهل كتابة النسب بين الأضلاع المتناظرة.

المصطلحات الأساسية

مقداريات متناسبة

Similar Polygons

Similar Triangles

أضلاع متناظرة

Corresponding Sides

Congruent Angles

Regular Polygon

Quadrilateral

Pentagon

Hexagon

Ratio of Similarity (Similarity Ratio)

الأدوات والوسائل

حاسب آلي


جهاز حرض باليات

براضع رسومية


ورق مربعات

أدوات قياس

آلة حاسمة



- إذا كان المثلث $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ، $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$
- أ** $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF} = \frac{ج}{م} = \frac{L}{س}$ = ك (نسبة التشابه)، ك ≠ 0 .
ويكون معامل تشابه المثلث $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ متساوياً مع معامل تشابه المثلث $\triangle DEF \sim \triangle ABC$.
- ب** $\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = \frac{L}{س} = ك$

مثال

- ١ في الشكل المقابل: المثلث $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

- أ** أوجد معامل تشابه المثلث $\triangle ABC$ للمثلث $\triangle DEF$.
ب أوجد قيم s ، c .

الحل

: المثلث $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

فيكون: $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$ = معامل التشابه،


$$\frac{6}{4} = \frac{10}{s} = \frac{8}{c}$$

أ معامل التشابه = $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$





ب $\frac{10}{s} = \frac{3}{2} \rightarrow s = 10 \cdot \frac{2}{3} = \frac{20}{3} \text{ سم} \rightarrow s = 6.67 \text{ سم}$

حاول أن تحل

- ١ بين أياماً من أزواج المثلثات التالية تكون متشابهة، واكتب المثلثات المتشابهة بترتيب الرقائق المتاظرة وحدد نسبة التشابه.



هل جميع المربعات متشابهة؟
هل جميع متوازيات الأضلاع متشابهة؟ فسر إجابتك.

المضلع $M \equiv$ المضلع M المضلع $M \sim$ المضلع M 

هل جميع المستطيلات متشابهة؟


اللحوظات

١- لكي يتبايني مضلعين يجب أن يتوافر الشرطان معاً، ولا يمكن توافر أحدهما دون الآخر.

٢- المضلعين المتطابقان يكونان متشابهين، وذلك توافر شرطاً الشابه (المضلع M , ~ المضلع M)، ويكون معامل الشابه لهما عندئذ مساوياً (واحد) ولكن ليس من الضروري أن يكون المضلعين المتشابهان متطابقين (المضلع $M \equiv$ المضلع M)، كما في الشكل المقابل.

٣- المضلعين الشابهان ثالث متشابهان
فإذا كان المضلع M , ~ المضلع M ,
المضلع M , ~ المضلع M ,
فإن: المضلع M , ~ المضلع M .

٤- كل المضلعين المستقلة التي لها نفس العدد من الأضلاع تكون متشابهة. لماذا؟

مثال

٢- في الشكل المقابل: $\triangle ABC \sim \triangle DED$ ،

$$DE = 8\text{ سم} , \quad ED = 9\text{ سم} , \quad DC = 10\text{ سم}$$

إذا كان محاط $\triangle ABC = 36\text{ سم}$.

أوجد أطوال أضلاع $\triangle ABC$

الحل

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DED$

$$\therefore \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{ED} = \frac{CA}{DC} = \frac{AB + BC + CA}{DE + ED + DC} = \frac{\text{محاط } \triangle ABC}{\text{محاط } \triangle DED}$$

$$\text{ويكون: } \frac{AB}{8} = \frac{BC}{9} = \frac{CA}{10} = \frac{36}{27} = \frac{4}{3}$$


$$\therefore AB = 8 \times \frac{4}{3} = \frac{32}{3}\text{ سم} , \quad BC = 9 \times \frac{4}{3} = 12\text{ سم} , \quad CA = 10 \times \frac{4}{3} = \frac{40}{3}\text{ سم}$$

(خواص النسب)

للحظ آن:

إذا كان المضلع M - المضلع m . **فإن** $\frac{\text{محیط المضلع } M}{\text{محیط المضلع } m} = \text{نسبة التشابه (معامل التشابه)}$

حاول أن تحل



٢ في الشكل المقابل:

المضلع $A B C D$ - المضلع من ص ع ل

- ١ احسب $\triangle S L U$ ، طول $A L$
- ٢ إذا كان محیط المضلع $A B C D = 19,5$ سم
أوجد محیط المضلع من ص ع ل.

Similarity ratio of two polygons






معامل التشابه لمضلعين :

ليكن k معامل تشابه المضلع M ، للمضلع m .**إذا كان:** $k < 1$ **فإن** المضلع M ، هو تکبیر للمضلع m . $k > 1$ **فإن** المضلع M ، هو تصغير للمضلع m . $k = 1$ **فإن** المضلع M ، يطابق المضلع m .

وبصيغة عامة يمكن استخدام معامل التشابه في حساب أبعاد الأشكال المتشابهة.

تمارين ٢ - ١

١) بين أيّاً من أزواج المضلعات التالية تكون متشابهة، واكتب المضلعات المتشابهة بترتيب الرؤوس المتناظرة، وحدد معامل التشابه (الأطوال مقدرة بالستيفرات).



٢) إذا كان المضلع $A B C D \sim S T U V$ ، أكمل:

$$\frac{A B}{B D} = \frac{S T}{T V} \quad (1)$$



$$\frac{\text{محيط المضلع}}{\text{محيط المضلع}} = \frac{A B}{S T} \quad (2)$$

$$\frac{S T + T U + U V + V S}{S U} = \frac{A B + B C + C D + D A}{A B} \quad (3)$$




٣) المضلع $A B C D \sim S T U V$. فإذا كان: $A B = ٣٢$ سم، $B C = ٤٠$ سم، $S T = ٣$ م - ١، $T U = ١٠$ م. أوجد قيمة $U V$ العددية.

٤) مستطيل بعدها ١٠ سم، ٦ سم. أوجد محيط ومساحة مستطيل آخر متشابه له إذا كان:
أ) معامل التشابه ٣
ب) معامل التشابه ٠،٤

- ٥ في كل من الأشكال التالية المضلع مـ، المضلع مـ، المضلع مـ،
أوجد معامل تشابه كل من المضلع مـ، المضلع مـ، للمضلع مـ




- ٦ المضلعات الثلاثة التالية متشابهة. أوجد القيمة العددية للرمز المستخدم في القياس.



- ٧ مستطيلان متشابهان يُعدا الأول ٨ سم، ١٢ سم، ومحبطة الثاني ٤٠٠ سم، أوجد طول المستطيل الثاني ومساحته.

بيان



- ٨ هندسة معمارية: يوضح الشكل المقابل مختلفاً
لأحدى الوحدات السكنية بمقاييس رسم ١٥٠ : ١ أوجد:

- ١) أبعاد حجرة الاستقبال.
- ٢) أبعاد حجرة النوم.
- ٣) مساحة حجرة المعيشة.
- ٤) مساحة الوحدة السكنية.


تشابه المثلثات

Similarity of Triangles

سوف تتعلم

• حالات تشابه المثلثات.

• خصائص المثلثات المتشابهة.



طلب أحد ملوك الفراعنة إلى الرياضي طاليس (٦٠٠ ق.م) أن يوجد ارتفاع الهرم الأكبر، ولم تكن هناك أجهزة أو آلات أو طريقة لإيجاد ارتفاع الهرم مباشرة.


ثبت طاليس عصا رأسياً

وبدأ يقياس ظل العصا ويقارنه بطول العصا نفسها إلى أن جاء وقت وجد فيه أن طول ظل العصا يساوي الطول الحقيقي للعصا نفسها. فقام بقياس طول ظل الهرم، وكان هو ارتفاع الهرم نفسه.

إذا طلب منك قياس ارتفاع سارية العلم باستخدام عصا وشريط مدرج فهل تتضرر حتى يصبح طول ظل العصا مساوياً لطول العصا نفسها أو يمكنك قياس ارتفاع سارية العلم في أي وقت من يوم مشمس؟ فسر إجابتك.

المصطلحات الأساسية

Possulate / Axiom بنية



عمل لتعاون

١- ارسم $\triangle ABC$ الذي فيه:

$\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $AB = 4\text{ سم}$

٢- ارسم $\triangle DHE$ الذي فيه:

$\angle D = 60^\circ$, $\angle E = 70^\circ$, $DH = 5\text{ سم}$

الأدوات والوسائل

• حاسب آلي

• جهاز عرض بيانات

• برنامج رسوم

• ورق مربعات

• مرآة متعددة

• أدوات قياس

• آلة حاسبة

٣- أوجد بالقياس لأقرب مليمتر أطوال كل من: \overline{AJ} , \overline{BG} , \overline{DQ} , \overline{HE} .

٤- استخدم الآلة الحاسبة لإيجاد النسب $\frac{AJ}{BG}$, $\frac{DQ}{HE}$, $\frac{HE}{BG}$.


هل النسب متساوية؟ ماذا تستنتج عن هذين المثلثين؟

قارن نتائجك مع نتائج المجموعات الأخرى واكتب ملاحظاتك.

postulate (or axiom)

إذا طبقت زاويتان في مثلث نظائرهما في مثلث آخر كان المثلثان متشابهين.


مقدمة



في الشكل المقابل:
إذا كان $A \cong G$ و $B \cong H$
فإن $\triangle ABC \sim \triangle GHI$

حاول أن تحل

- ١) بين أيّاً من أزواج المثلثات التالية تكون متشابهة. اكتب المثلثات المتشابهة بترتيب الرؤوس المتناظرة




للحظان

- ١- المثلثان المتساويا الأضلاع متشابهان. (كما في ٤)
- ٢- متشابه المثلثان متساويا الساقين إذا ساوي قياس إحدى زاويتي القاعدة في أحدهما قياس إحدى زاويتين القاعدة في المثلث الآخر. (كما في ٣) أو إذا ساوي قياساً زاويتي رأسيهما.
- ٣- متشابه المثلثان القائمه الزاوية إذا ساوي قياس إحدى الزاويتين الحاديتين في أحدهما قياس إحدى الزاويتين الحاديتين في المثلث الآخر. (كما في ٦)

- ١ في المثلث $\triangle ABC$ ، $AC \parallel BG$ حيث $CH = BG$ ،
 $CH = 2\text{ سم} = AH$ ، $AC = 4\text{ سم}$ ، $CG = 2\text{ سم}$

- أ) أثبت أن $\triangle ACH \sim \triangle ABC$
 ب) أوجد طول كل من: AC ، BG

الحل



أ) $\because CH \parallel BG$ ، AC قاطع لهما

$$\therefore \triangle ACH \equiv \triangle ABC$$

في المثلثين AHC و ABC ، $\angle A$ جـ

$$\therefore \triangle AHC \equiv \triangle ABC$$

$$\therefore \triangle AHC \equiv \triangle BGC$$

$$\therefore \triangle AHC \sim \triangle BGC$$

ب) $\because \triangle AHC \sim \triangle BGC$

$$\therefore \frac{AC}{BG} = \frac{CH}{CG}$$
 و يكون

$$\frac{AC}{BG} = \frac{2}{1} = \frac{2}{1,2 + 2}$$

$$\therefore 2 = \frac{2}{1,2 + 2}$$



$$\therefore 2 = \frac{2}{3}$$

$$\therefore 2 = 2,6$$

$$\therefore AC = 2,6 \text{ سم}$$


حاول أن تحل

- ٢ في كل من الأشكال التالية، أثبت أن $\triangle ABC \sim \triangle AED$ ثم أوجد قيمة s .




نتائج هامة

إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمين الحاملين لهما فإن المثلث الناتج يشابه المثلث الأصلي.



إذا كان $هـ // بـ جـ$ ويقطع $أـ بـ$ ، $أـ جـ$ في $هـ$ ، على الترتيب كما في الأشكال الثلاثة السابقة:
فإن: $\triangle أـ هـ \sim \triangle أـ بـ جـ$

مثال




٢ في الشكل المقابل: $أـ بـ جـ$ مثلث، $هـ // أـ بـ$ ، رسم $هـ // بـ جـ$
ويقطع $أـ جـ$ في $هـ$ و $هـ // أـ جـ$ ويقطع $بـ جـ$ في $هـ$.
برهن أن: $\triangle أـ هـ \sim \triangle بـ جـ$

الحل

$$\begin{aligned} & \because هـ // بـ جـ \\ (1) \quad & \therefore \triangle أـ هـ \sim \triangle أـ بـ جـ \\ (2) \quad & \because هـ // أـ جـ \\ & \therefore \triangle هـ بـ جـ \sim \triangle أـ بـ جـ \\ \text{من (1), (2) يتبع أن: } & \triangle أـ هـ \sim \triangle هـ بـ جـ \end{aligned}$$

حاول أن تحل



٣ في الشكل المقابل: $أـ بـ جـ$ مثلث، $هـ // أـ بـ$ ، رسم $هـ // بـ جـ$ ويقطع
 $أـ جـ$ في $هـ$ ، رسم $سـ$ يقطع $هـ$ ، $بـ جـ$ في $سـ$ ، ص على الترتيب.

٤ اذكر ثلاثة ازواج من المثلثات المتشابهة.

$$\text{٥ أثبت أن: } \frac{أـ هـ}{بـ هـ} = \frac{أـ جـ}{بـ جـ} = \frac{هـ جـ}{هـ بـ}$$

إذا رسم من رأس القائمة في المثلث القائم الزاوية عمود على الوتر انقسم المثلث إلى مثلثين متشابهين، وكلاهما يشابه المثلث الأصلى.

نتيجة

في الشكل المقابل: $أـ بـ جـ$ مثلث قائم الزاوية في $أـ$ ، $أـ جـ \perp بـ جـ$
 $\triangle أـ هـ \sim \triangle جـ هـ$ فيما


$\angle (أـ هـ) = \angle (جـ هـ) = 90^\circ$ ، $هـ$ متركة في المثلثين.

$\therefore \triangle أـ هـ \sim \triangle جـ هـ$ (سلسلة الشابة) (١)

وبالمثل $\triangle جـ هـ \sim \triangle جـ بـ$ (٢)

\therefore المثلثان المتشابهان ثالث متشابهان


$\therefore \triangle جـ هـ \sim \triangle جـ بـ$



مثال

٢) اب ج مثلث قائم الزاوية في أ، أو $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ أثبت أن دا وسط متساب بين د ب، و ج

الحل



المعلميات: في $\triangle ABC$ (د) = ٩٠°، أو $\overline{CD} \perp \overline{AB}$

المطلوب: إثبات أن (د) = د ب د ج

البرهان: في $\triangle ACD$

\therefore (د) = ٩٠°، أو $\overline{CD} \perp \overline{AB}$



(نتيجة)

$\therefore \triangle ADB \sim \triangle ACD$

ويبكون: $\frac{دا}{ج} = \frac{دب}{دج}$ أي أن (د) = د ب د ج

حاول أن تحل

٣) في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة س العددية:



مثال


٤) في الشكل المقابل اب ج مثلث قائم الزاوية في أ.

أو $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ أثبت أن:

أ) $(اب)' = ب ج \times ب د$

ب) $(اج)' = ج ب \times ج د$

الحل



في $\triangle ABC$:

\therefore (د) = ٩٠°، أو $\overline{CD} \perp \overline{AB}$

$\therefore \triangle ABD \sim \triangle CBD$ (نتيجة)

$\therefore \frac{اب}{ج} = \frac{ب د}{ج د}$ ويبكون: $(اب)' = ب ج \times ب د$

(نتيجة) $\therefore \triangle ACD \sim \triangle CBD$

ويبكون: $(اج)' = ج ب \times ج د$


$\therefore \frac{اج}{ج د} = \frac{ج ب}{ج د}$



تعد الناتج التي تم إثباتها في مثالى ٣، ٤ برهان
لنظرية التم似 التي سبق لك دراستها في المرحلة الاعدادية

حاول أن تحل

٥ أوجد قيمة س، من العددية في أبسط صورة (الأبعاد مقدرة بالستيمترات)




Indirect measurement

في بعض الحالات يصعب قياس مسافة أو ارتفاع معين مباشرة، وفي هذه الحالة يمكنك استخدام تشابه المثلثات لإيجاد هذا القياس بطريقة غير مباشرة.

إحدى الطرق تستخدم خاصية انعكاس الضوء في المرآة المستوية، كما في المثال التالي.

مثال



٥ فیفیغا: أراد يوسف أن يعرف ارتفاع إحدى الأشجار فوضع مرأة على مسافة ٦ أمتار من قاعدة الشجرة، ثم تحرك إلى الخلف حتى استطاع أن يرى قمة الشجرة في وسط المرأة - عند هذه النقطة كان يوسف قد تحرك بعيداً عن المرأة مسافة ١,٢ متر وكانت عيناه على ارتفاع ١,٥ متر فوق سطح الأرض. فإذا كانت قدماء المرأة وقاعدة الشجرة على استقامة واحدة أوجد ارتفاع الشجرة على أنّ $\text{قياس زاوية السقوط} = \text{قياس زاوية الانعكاس}$

الدل

يفرض أن ارتفاع الشجرة س مترا، قياس زاوية السقوط $= \theta$

$$\therefore \text{قياس زاوية الانعكاس} = \theta$$

في المثلثين ABD و CBD


$$\therefore \angle B = \angle D = \angle C = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ADB = \angle DCB = 90^\circ - \theta$$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle DCB \quad \text{ويبecون} \frac{AB}{DC} = \frac{BD}{BC}$$




$$\therefore \frac{s}{1.5} = \frac{6}{1.2} \quad \text{ويكون} \quad s = 7.5 \text{ متر}$$

أي أن ارتفاع الشجرة يساوي 7,٥ متر.



حاول أن تحل

٦ أوجد المسافة س في كل من الحالات الآتية:



نظريّة

إذا تأبنت أطوال الأضلاع المتناظرة في مثلثين فإنهم متشابهان.

المعطيات: المثلثان $\triangle ABC$ و $\triangle DEF$ وفيهما $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$

المطلوب: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

البرهان: عين من $\triangle ABC$ حيث $AS \parallel DF$.

ارسم $SC \parallel BF$ ويقطع AD في C .

$\therefore SC \parallel BF$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle ACS$

ويكون $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{SC} = \frac{CA}{CS}$

$\therefore AS = DF$

$\therefore \frac{AB}{DF} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{CE}$

$\therefore \frac{AB}{DF} = \frac{BC}{EF}$

من (١)، (٢) ينبع أن: $SC = EF$ و $CA = CE$


ويكون $\triangle ACS \equiv \triangle CEF$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF$

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF$

(برهانا)

(وهو المطلوب)




((نتيجة ١))

(١)

(معطيات) (٢)

مثال



٦ في الشكل المقابل: ب، ص، جد على استقامة واحدة. أثبت أن:

- ١ $\triangle ABD \sim \triangle SBC$
- ٢ \overline{BD} ينصف $\triangle ABC$

الحل

١ في المثلثين $\triangle ABC$ ، $\triangle SBC$ نجد أن:


$$\frac{AB}{SB} = \frac{12}{6} = \frac{4}{2}, \quad \frac{BC}{SC} = \frac{18}{6} = \frac{3}{1}, \quad \frac{AC}{SC} = \frac{9}{3} = \frac{3}{1}$$

أي أن الأضلاع المتناظرة متناسبة
 $\therefore \triangle ABD \sim \triangle SBC$

- ٢ $\therefore \triangle ABD \sim \triangle SBC$
 أي أن: \overline{BD} ينصف $\triangle ABC$

٧ في الشكل المقابل: $\overline{AD} \parallel \overline{BG}$ = (هـ) حيث $\frac{AD}{BG} = \frac{AH}{BH} = \frac{1}{2}$ أثبت أن $\overline{AG} \parallel \overline{BG}$

الحل



(من خواص النسب) (١)

(من خواص النسب) (٢)

$$\frac{AD}{BG} = \frac{1}{2}, \quad \frac{AD}{BG} = \frac{AH}{BH}$$

$$\therefore \frac{AH}{BH} = \frac{1}{2}, \quad \frac{AH}{BH} = \frac{AD}{BG}$$

من (١)، (٢) يتبع أن $\frac{AD}{BG} = \frac{AH}{BH} = \frac{1}{2}$

أي أن $\triangle ADG \sim \triangle BGD$

$\therefore \triangle ADG \sim \triangle BGD$

وهذا في وضع تمازج بالنسبة للقاطع \overline{BG}

$\therefore \overline{AG} \parallel \overline{BG}$


حاول أن تحل

٨ أب جد شكل رباعي، هـ $\equiv \overline{BG}$ حيث:

$$\frac{AB}{BG} = \frac{GD}{BG}, \quad \text{وـ} \quad \frac{AB}{BG} = \frac{GD}{BG}$$



أثبت أن:

$$\frac{AB}{BG} = \frac{AD}{GD}$$



نظريه ٢

إذا طابقت زاوية من مثلث زاوية من مثلث آخر، وتناسب أطوال الأضلاع التي تحنويها هاتان الزوايا، كان المثلثان متشابهين.



(١) (النتيجة)

$\triangle ABC \sim \triangle A'CS$

المعطيات: $\angle A = \angle A'$, $\frac{AC}{A'C} = \frac{AB}{A'B}$

المطلوب: $\triangle ABC \sim \triangle A'CS$ هو

البرهان: خذ س $\parallel A'B$ حيث $A'S = A'C$

وارسم $S C \parallel B A$

ويقطع $A'C$ في ص

$\therefore SC \parallel BA$

ويكون $\frac{AC}{A'C} = \frac{SC}{BA}$

$\therefore \frac{AC}{A'C} = \frac{AB}{A'B}$ (معطى) ، $A'S = A'C$ (صل)

ويكون $AC = SC$

$\therefore \triangle A'CS \equiv \triangle A'CS$ (ضلعان وزاوية محصورة)

(٢)

ويكون $\triangle A'CS \sim \triangle A'CS$ هو

من (١)، (٢) ينتج أن $\triangle ABC \sim \triangle A'CS$ وهو المطلوب


مثال

٨) $\triangle ABC$ مثلث، $AB = 8\text{ سم}$ ، $AC = 10\text{ سم}$ ، $BC = 12\text{ سم}$ ، $\angle A = 45^\circ$ ، $\angle B = 60^\circ$
حيث $BC = 6\text{ سم}$.

أ) برهن أن $\triangle ABC \sim \triangle DBC$ حيث $\angle A = \angle D$ واستنتج طول DC .

ب) برهن أن الشكل ABC هو رباعي دائري.

الحل




من (١)، (٢) $\triangle ABC \sim \triangle DBC$ (نظريه)

من التشابه $\frac{DC}{DB} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$ ، $DC = \frac{5}{4}DB$

- ٦ من الشابه أيها $\triangle ABC \sim \triangle AED$.
 $\therefore \angle A = \angle A$ و $\angle D = \angle C$ و $\angle E = \angle B$
 $\therefore \triangle ABC$ خارجة عن الشكل الرباعي $AEDC$.
 الشكل $AEDC$ رباعي دائري.

دأول أن تحل

- ٧ في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس مفسراً إجابتك.



مثال

- ٨ $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ حيث $(\frac{AB}{PQ})^2 = \frac{BC}{QR} \times \frac{AC}{PR}$ أثبت أن: $\triangle ABC \sim \triangle PQR$

الحل



المثلثان $\triangle ABC$ و $\triangle PQR$ فيهما زوج مشترك

$$\therefore (\frac{AB}{PQ})^2 = \frac{BC}{QR} \times \frac{AC}{PR}$$

$$\therefore \frac{AB}{PQ} = \sqrt{\frac{BC}{QR} \times \frac{AC}{PR}}$$

من (١)، (٢) يتحقق أن $\triangle ABC \sim \triangle PQR$

دأول أن تحل

- ٩ $\triangle ABC$ و $\triangle PQR$ متباينان، س متصرف \overline{PQ} ، ص متصرف \overline{QR} و أثبت أن:

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{AC}{PR} \times \frac{BC}{QR}$$

$$\triangle ABC \sim \triangle PQR$$


لتحقق من فهمك

- في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة س.




تمارين ٢ - ٢

١ اذكر أي الحالات يكون فيها المثلثان متشابهين، وفي حالة الشابهة اذكر سبب الشابهة.




٢ أوجد قيمة الرمز المستخدم في التياس:



٣ في الشكل المقابل: $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ حيث

أولاً: أكمل: $\angle A = \angle P$, $\angle B = \angle Q$, $\angle C = \angle R$



ثانياً: إذا كان s , c , u , l , m , n هى أطوال القطع المستقيمة بالستيمات والمعنية بالشكل، فاكمل النسبات التالية:


$$\frac{s}{u} = \frac{c}{l} = \frac{l}{m} \quad (1) \quad \frac{s}{u} = \frac{c}{l} = \frac{l}{n} \quad (2) \quad \frac{s}{u} = \frac{c}{m} = \frac{l}{n} \quad (3) \quad \frac{s}{u} = \frac{c}{n} = \frac{l}{m} \quad (4)$$

٤ $\triangle ABC$ وتران في دائرة، $\overline{AB} \parallel \overline{PQ}$ (ا) حيث P خارج الدائرة، $AB = 4\text{سم}$, $PQ = 7\text{سم}$, $PB = 6\text{سم}$. أثبت أن $\triangle ABC \sim \triangle PQB$ ثم أوجد طول QC .

٥ $\triangle ABC$ و $\triangle PQR$ هما مثلثان متشابهان. رسم $\overline{AS} \perp \overline{PQ}$ ليقطعه في S , ورسم $\overline{TR} \perp \overline{BC}$ ليقطعه في R . أثبت أن $BS \times CR = PS \times TR$.

٦ في المثلث $\triangle ABC$ ، $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 75^\circ$. أثبت أن $(AB)^2 = AC \times BC$.

- ٧ اب ج مثلث قائم الزاوية في ا، رسم $\overline{AO} \perp \overline{Bc}$ يقطعه في د. إذا كان $\frac{Bc}{Dc} = \frac{1}{2}$ ، او $Bc = 2\text{cm}$
أوجد عوامل كل من Bc ، اب، آج.




٨ في الشكل المقابل: اب ج مثلث قائم الزاوية في ا،

$\overline{AO} \perp \overline{Bc}$ ، و $\overline{AO} \perp \overline{Ab}$ ، د و $\perp \overline{Ag}$

أثبت أن:

١ $\triangle Adh \sim \triangle Gdo$

٢ مساحة المستطيل $Ahdo = Ad \times Hd = Ad \times Od$



٩ في الشكل المقابل: اب ج مثلث منطوج الزاوية في ا،

اب = اج رسم $\overline{AO} \perp \overline{Ab}$ ويقطع \overline{Bc} في د.

أثبت أن: $2(Ab)^2 = Bd \times Bc$

١٠ تعبير المجموعتان ا، ب عن أطوال أضلاع مثلثات مختلفة بالستيمترات.

اكتب أمام كل مثلث من المجموعة ارمز المثلث الذي يشابهه من المجموعة ب
مجموعة (ا) مجموعة (ب)

٥	٤	٣	٢,٥	١
١٤	١٣,٥	٨		ب
٥٥	٣٥	٢٥		ج
١١	١١	١١		د
٦	٤	٣,٥		هـ
٣٠	٧	٨		و
٤٢	٥٤	٣٢		ز

٦	٦	٦	١
١١	٧	٥	٢
١٠	٨	٥	٣
٦٢	٨	٧	٤
٢٨	٣٧	١٦	٥



١١ في الشكل المقابل: اب ج مثلث فيه $Ab = 6\text{cm}$ ، $Bc = 9\text{cm}$ ،

$Ag = 7,5\text{cm}$ ، د نقطة خارجة عن المثلث اب ج

حيث $Db = 4\text{cm}$ ، $Dc = 5\text{cm}$. أثبت أن:

١ $\triangle AbG \sim \triangle Gdc$

٢ Bc ينصف Ag




١٢ من الشكل المقابل أكمل:

١ اب ج ~ \triangle

ومعامل الشابة =


١٢ في الشكل المقابل: $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ، $\angle A = 60^\circ$ ، $\angle Q = 70^\circ$.
أ) $\angle R = 50^\circ$
ب) $\angle R = 70^\circ$



١٣ $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ مثلثان متشابهان، حيث $\angle A = 60^\circ$ ، $\angle B = 70^\circ$ ، $\angle C = 50^\circ$.
هل منتصف \overline{PQ} ، صر على الترتيب، رسم $\angle Q = 70^\circ$ ، $\angle R = 50^\circ$
أثبت أن $\triangle ABC \sim \triangle PQR$.

١٤ $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ مثلث، $\angle B = 60^\circ$ حيث $(\angle A)' = 60^\circ$ ، $\angle C = 45^\circ$ ، $\angle P = 45^\circ$ ، $\angle Q = 90^\circ$.
أ) $\angle R = 60^\circ$
ب) $\angle R = 90^\circ$

١٥ $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ مثلث، $\angle B = 60^\circ$ حيث $(\angle A)' = 60^\circ$ ، $\angle C = 45^\circ$ ، $\angle P = 45^\circ$ ، $\angle Q = 90^\circ$.
أ) $\angle R = 60^\circ$
ب) $\angle R = 90^\circ$



١٦ بين المخطط المقابل موقع محطة خدمة وتمويل سيارات يراد إقامتها على الطريق السريع عند تقاطع طريق جانبي يؤدى إلى المدينة ج، وعمودياً على الطريق السريع بين المدينتين أ، ب.

- أ) كم ينبغي أن تبعد المحطة عن المدينة ج؟
ب) ما البعد بين المدينتين ب، ج؟

نقطة


استخدام برنامج خرائط (Google Earth) لحساب أقصر بعد بين عواصم محافظات جمهورية مصر العربية

العلاقة بين مساحتي سطхи مضلعين متشابهين

The Relation Between the Area of two Similar Polygons

سوف نتعلم

- * العلاقة بين مساحتين متساويتين متشابهتين ومعامل (نسبة) التشابه.
- * العلاقة بين مساحتين سطحيتين متساويتين متشابهتين ومعامل (نسبة) التشابه.



فكرة و لاقتنان

على ورق مربعات رسم كل من المثلثين $\triangle ABC$ ، $\triangle DEF$ ، $\triangle GHI$.

١- بين لماذا يكون:

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ - $\triangle ABC$ - أوجد معامل التشابه عندئذ.

٢- احسب النسبة بين مساحة المثلث $\triangle DEF$ إلى مساحة المثلث الأصلي $\triangle ABC$.

٣- عين نقطة أخرى مثلث $\triangle GHI$ ، ثم ارسم $\triangle GHI \sim \triangle ABC$ ويقطع \overline{BC} في H لتحقق على المثلث $\triangle GHI$ ، هل $\triangle GHI \sim \triangle ABC$ ؟

٤- أكمل الجدول التالي:

المصطلحات الأساسية

- | | |
|-------------------|---------------|
| Perimeter | محيط |
| Area | مساحة |
| Area of a Polygon | مساحة متعدد |
| Compounding Sides | أضلاع متراكمة |

المثلثات	معامل التشابه	مساحة المثلث الأول	إلى مساحة المثلث الثاني	النسبة بين مساحة المثلث الأول
$\triangle ABC \sim \triangle DEF$	$\frac{1}{2}$	٦	٣٦	$\frac{1}{4} = \frac{6}{36}$
$\triangle GHI \sim \triangle ABC$				
$\triangle GHI \sim \triangle DEF$				

٥- ماذا تعني النسب التي حصلت عليها مقارنة بمعامل التشابه (نسبة التشابه)؟

أولاً، النسبة بين مساحتين سطحيتين متساويتين متشابهتين:



النسبة بين مساحتين سطحيتين متساويتين متشابهتين تساوي مربع النسبة

لنظرية

بين طولين أي ضلعين متناظرين فيها.

الأدوات والوسائل

- * حاسب آلي
- * جهاز عرض بيانات
- * برامج رسومية
- * ورق مربعات
- * آلة حاسبة



المعطيات: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ وهو

$$\text{المطلوب: } \frac{\text{مر}(\triangle \text{أب ج})}{\text{مر}(\triangle \text{هـو})} = \frac{(\text{أب})}{(\text{هـو})} = \frac{(\text{ب ج})}{(\text{هـو})} = \frac{(\text{جـا})}{(\text{هـو})}$$

البرهان: ارسم $\overline{آس}$ \perp $\overline{\text{ب ج}}$ حيث $\overline{\text{آس}} \cap \overline{\text{ب ج}} = (\text{س، هـ})$
 $\overline{\text{آس}} \perp \text{هـ} \text{ حيث } \overline{\text{آس}} \cap \text{هـ} = (\text{ص})$

$\therefore \triangle \text{أب ج} \sim \triangle \text{هـو}$

$$(1) \quad \therefore \frac{\text{مر}(\triangle \text{ب ج})}{\text{مر}(\triangle \text{هـ})} = \frac{(\text{ب ج})}{(\text{هـ})}, \quad \frac{\text{أب}}{\text{هـ}} = \frac{(\text{ب ج})}{(\text{هـ})} = \frac{(\text{جـا})}{(\text{هـ})}$$

في المثلثين $\triangle \text{أب ج}$ ، $\triangle \text{هـو}$: $\frac{(\text{ب ج})}{(\text{هـ})} = \frac{(\text{جـا})}{(\text{هـ})}$

$$\text{فـ}(\angle \text{س}) = \text{فـ}(\angle \text{ص}) = 90^\circ, \quad \text{فـ}(\angle \text{ب ج}) = \text{فـ}(\angle \text{هـ})$$

(ملمة الشابه)

$\therefore \triangle \text{أب ج} \sim \triangle \text{هـو}$

$$(2) \quad \text{ويكون: } \frac{\text{أب}}{\text{هـ}} = \frac{\text{آس}}{\text{ص}}$$

$$\frac{\text{مر}(\triangle \text{أب ج})}{\text{مر}(\triangle \text{هـو})} = \frac{(\text{أب})}{(\text{هـ})} \times \frac{(\text{ب ج})}{(\text{هـ})} = \frac{(\text{آس})}{(\text{ص})} \times \frac{(\text{ب ج})}{(\text{ص})} = \frac{(\text{آس})}{(\text{ص})}$$

باتتعويض من (1)، (2) ينبع أن:

$$\frac{\text{مر}(\triangle \text{أب ج})}{\text{مر}(\triangle \text{هـو})} = \frac{(\text{أب})}{(\text{هـ})} = \frac{(\text{آس})}{(\text{ص})} = \frac{(\text{ب ج})}{(\text{ص})} = \frac{(\text{جـا})}{(\text{ص})} \text{ وهو المطلوب.}$$


للحظة إنـ: $\frac{\text{مر}(\triangle \text{أب ج})}{\text{مر}(\triangle \text{هـو})} = \frac{(\text{أب})}{(\text{هـ})} = \frac{(\text{آس})}{(\text{ص})}$

فيكون $\frac{\text{مر}(\triangle \text{أب ج})}{\text{مر}(\triangle \text{هـو})} = \frac{(\text{آس})}{(\text{ص})}$

أى أن النسبة بين مساحتي سطحى مثابتين متساوين تساوى مربع النسبة بين ارتفاعين متاظرين فيها.

تفكر ناقدـ:


١- إذا كان $\triangle \text{أب ج} \sim \triangle \text{هـو}$ ، م منتصف $\overline{\text{ب ج}}$ ، م منتصف $\overline{\text{هـو}}$.



$$\text{هل } \frac{\text{مر}(\triangle \text{أب ج})}{\text{مر}(\triangle \text{هـو})} = \frac{(\text{أب})}{(\text{هـ})}?$$

فرـ إجابتـكـ واكتبـ استـاجـكـ.

٢- إذا كان $\triangle \text{أب ج} \sim \triangle \text{هـو}$ ،




آنـ م منتصف $\overline{\text{أب}}$ وـ N منتصف $\overline{\text{هـو}}$ فيـ نـ .

ـ م منتصف $\overline{\text{ب ج}}$ وـ N منتصف $\overline{\text{هـو}}$ فيـ نـ .

$$\text{هل } \frac{\text{مر}(\triangle \text{أب ج})}{\text{مر}(\triangle \text{هـو})} = \frac{(\text{أب})}{(\text{هـ})}?$$

فرـ إجابتـكـ واكتبـ استـاجـكـ.

مثال



١ في الشكل المقابل: $\triangle ABC \sim \triangle AED$

حيث $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{3}$, $ED \parallel BC$ ويقطع \overline{BC} في هـ

إذا كانت مساحة $\triangle ABC = 784$ سم². أوجد:

أ) مساحة $\triangle AED$

ب) مساحة شبه المترافق $\triangle AED$

الحل

في $\triangle AED$: $\therefore \overline{ED} \parallel \overline{BC}$

(نتيجة) $\therefore \triangle AED \sim \triangle ABC$

(نظرية) $\therefore \frac{\text{م.}(\triangle AED)}{\text{م.}(\triangle ABC)} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2$

ويكون $\frac{\text{م.}(\triangle AED)}{784} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

\therefore مساحة شبه المترافق $\triangle AED$ = مساحة $\triangle ABC$ - مساحة $\triangle AED$

\therefore مساحة شبه المترافق $\triangle AED$ = $784 - 144 = 640$ سم².


داول أو تحل

٢ في الشكل المقابل:

\overline{ED} منتصف \overline{AB}

$\text{م.}(\triangle ABC) = 48$ سم²

أوجد: $\text{م.}(\triangle EDB)$



مثال

٣ النسبة بين مساحتي مثلثين متشابهين هي $9:4$. فإذا كان محاط المثلث الأكبر ٩٠ سم، أوجد محاط المثلث الأصغر.

الحل

يفرض أن $\triangle ABC \sim \triangle EDB$ و

$\therefore \frac{\text{م.}(\triangle ABC)}{\text{م.}(\triangle EDB)} = \left(\frac{AB}{ED}\right)^2 = \frac{9}{4}$ ويكون $\frac{AB}{ED} = \frac{3}{2}$

$\therefore \text{محاط } \triangle ABC = \frac{AB}{ED} \times \text{محاط } \triangle EDB = \frac{3}{2} \times \text{محاط } \triangle EDB$

\therefore محاط $\triangle EDB = \frac{\text{محاط } \triangle ABC}{\frac{3}{2}} = \frac{90}{3} = 60$ سم

حاول أن تحل

٢) ΔABC هو مثلثان متشابهان، $M(\Delta ABC) = \frac{1}{2}$

١) إذا كان محيط المثلث الأصغر 345 سم . أوجد محيط المثلث الأكبر.

٢) إذا كان $BC = 28\text{ سم}$ أوجد طول AB .



مثال

٢) إذا كان كل 1 سم على الخريطة يمثل 10 كيلومترًا .
أوجد المساحة الحقيقية التي يمثلها المثلث ABC الأقرب
كيلو متر مربع إذا كان $M(\Delta ABC) = 6,4\text{ سم}^2$

الحل

$$\text{مقياس الرسم} = \text{معامل التشابه} = \frac{1}{10,000}$$

$$\frac{\text{مساحة } \Delta ABC}{\text{المساحة الحقيقية}} = \text{مربع معامل التشابه}$$

$$\frac{6,4}{\text{المساحة الحقيقة}} = \left(\frac{1}{10,000} \right)^2$$

$$\text{المساحة الحقيقة} = 6,4 \times 10,000 \times 10,000 \text{ سم}^2 \\ \approx 640 \text{ كم}^2$$


حاول أن تحل

١) في الخريطة المبينة أعلاه احسب مساحة المثلث BCD وبالستيمترات المربعة واستخدامها في
تقدير المساحة الحقيقية التي يمثلها الأقرب كيلو مربع.

٢) باستخدام إحدى خرائط جمهورية مصر العربية احسب مساحة شبه جزيرة سيناء لأقرب مائة كيلو
متر مربع - قارن إجابتك مع زملائك.

ثانية النسبة بين مساحتي سطхи مضلعين متشابهين

عمل تعاوني




اعمل مع زميل لك لبحث إمكانية تقسيم المضلعين المتشابهين
إلى نفس العدد من المثلثات التي يشابه كل منها نظيره.

١- ارسم مضلعين متشابهين كما في شكل (١)، شكل (٢).


٢- في شكل (١) ارسم آلة. ماذا تلاحظ؟

٣- في شكل (٢) إرسم $\triangle ABC$. ماذًا تلاحظ هل تجد تفسيرًا لذلك؟



من شبيه المثلثين


(نتيجة)



حقيقة: المثلثان المتشابهان يمكن أن ينتميا إلى نفس العدد من المثلثات التي يشابه كل منها نظيره.

ملاحظة: الحقيقة السابقة صحيحة مهما كان عدد الأضلاع في المثلثين المتشابهين، (المثلثان المتشابهان لهما نفس العدد من الأضلاع) فإذا كان عدد أضلاع المثلثان n خلغا فإن عدد المثلثات التي يمكن أن ينتمي إليها المثلثان (عن طريق أقطاره المشتركة في نفس الرأس) $= n - 2$ مثلثا.

النسبة بين مساحتى سطحى متشابهين متساوين تساوى مربع النسبة بين طولى أي ضلعين متاظرين فيما بينهما.



المعطيات: المثلثان $\triangle ABC \sim \triangle AED$

$$\text{المطلوب: } \frac{\text{مساحة } \triangle ABC}{\text{مساحة } \triangle AED} = \left(\frac{AB}{AE} \right)^2$$

البرهان: من ١، ا/ نرسم $\angle AED$ ، $\angle AED = \angle ABC$

٢/ المثلثان $\triangle ABC \sim \triangle AED$

فهـما ينتميان إلى نفس العدد من المثلثات، كل يشابه نظيره (**حقيقة**). ويكون:

$$\frac{\text{مساحة } \triangle ABC}{\text{مساحة } \triangle AED} = \left(\frac{AB}{AE} \right)^2, \quad \frac{\text{مساحة } \triangle ABC}{\text{مساحة } \triangle AED} = \left(\frac{AC}{AD} \right)^2, \quad \frac{\text{مساحة } \triangle ABC}{\text{مساحة } \triangle AED} = \left(\frac{BC}{ED} \right)^2$$

$$\therefore \frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AD} = \frac{BC}{ED} = \frac{AB}{AE}$$

(من شبيه المثلثين)

$$\frac{\text{مر}(\Delta \text{أب ج})}{\text{مر}(\Delta \text{أب ج}) + \text{مر}(\Delta \text{أج ه})} = \frac{\text{مر}(\Delta \text{أج ه})}{\text{مر}(\Delta \text{أج ه}) + \text{مر}(\Delta \text{أب ج})} = \frac{1}{2}$$

ومن خواص التناوب

$$\frac{\text{مر}(\Delta \text{أب ج}) + \text{مر}(\Delta \text{أج ه})}{\text{مر}(\Delta \text{أب ج}) + \text{مر}(\Delta \text{أج ه}) + \text{مر}(\Delta \text{أب ج}) + \text{مر}(\Delta \text{أج ه})} = \frac{1}{2}$$

$$\text{ويكون } \frac{\text{مر}(\text{المثلث أب ج ه})}{\text{مر}(\text{المثلث أب ج ه}) + \text{مر}(\text{المثلث أب ج ه})} = \frac{1}{2} \text{ وهو المطلوب}$$

دائل أنا تحل

١ إذا كان المثلث أب ج ه ~ المثلث أب ج ه، $\frac{1}{2}$ فاكتبه ما يساويه كل من:

$$\frac{\text{محيط المثلث أب ج ه}}{\text{محيط المثلث أب ج ه}} = \frac{\text{محيط المثلث أب ج ه}}{\text{محيط المثلث أب ج ه}}$$

٢ إذا كان المثلثان أب ج ه ~ أب ج ه متشابهان والسبة بين مساحتي سطحهما ٤٥٪

$$\text{فاكتبه ما يساويه كل من: } \frac{1}{2}, \frac{\text{محيط المثلث أب ج ه}}{\text{محيط المثلث أب ج ه}}$$

٣ إذا كانت النسبة بين محيطي مثلثين متشابهين ١:٤، مساحة المثلث الأول ٢٥ سم٢، أوجد مساحة المثلث الثاني.

٤ إذا كان طولاً مثلاطرين متتاليتين في مثلثين متشابهين هما ١٦ سم، و ١٢ سم، وكانت مساحة المثلث الأصغر = ١٢٥ سم٢، فإذا أوجد مساحة المثلث الأكبر.

مثال

٥ أب ج ه، س ص ع ل مثلاطرين متتاليتين فيما بينهما، $\frac{1}{2} = \frac{4}{16}$ ، س ص = $\frac{1}{4}$ أب، ج ه = ١٦ سم، أب: أولاً: (س) ثانياً: طول ع ل ثالثاً: $\text{مر}(\text{المثلث أب ج ه}) : \text{مر}(\text{المثلث س ص ع ل})$

الحل

ـ المثلث أب ج ه ~ المثلث س ص ع ل

ـ $\text{مر}(\Delta \text{أب ج}) = \text{مر}(\Delta \text{س ص ع})$ فيكون $\frac{\text{مر}(\Delta \text{أب ج})}{\text{مر}(\Delta \text{أب ج}) + \text{مر}(\Delta \text{س ص ع})} = \frac{4}{12}$ (المطلوب أولاً)

ـ س ص = $\frac{1}{4}$ أب $\therefore \frac{1}{4} \text{ أب} = \frac{1}{4} \text{ س ص}$ (من خواص التناوب)

ـ من تشابه المثلثين نجد أيضاً $\frac{أب}{س ص} = \frac{ج ه}{ع ل}$

$\therefore \frac{1}{4} \text{ أب} = \frac{16}{ع ل}$ فيكون ع ل = $\frac{16 \times 4}{1} = 64$ سم (المطلوب ثالثاً)

$\text{مر}(\text{المثلث أب ج ه}) : \text{مر}(\text{المثلث س ص ع ل}) = (\text{أب}) : (\text{س ص})$

$$= 16 : 4 = 4 : 1$$

(المطلوب ثالثاً)

لادظهان

$$\text{أب} = 64$$

$$\text{س ص} = 16$$

$$ك ≠ 0$$

九

٥. إذا كان مجموع مساحتي سطحيهما 225 سم^2 فأوجد مساحة كل منهما.

150

٣ : مثابه عذلين محمل بين النية

٤- النسبة بين طول ضلعين متاخرين، فهما = ٣ : ٤

يفرض أن مساحة المضلع الأول = ٩ سم٢ ، مساحة المضلع الثاني = ١٦ سم٢

$$\therefore 16 \text{ من } 220 = \frac{220}{17+4} \text{ ويكون س } =$$

$$\therefore \text{مساحة المثلث الأول} = 9 \times 9 = 81 \text{ سم}^2$$

$$\therefore \text{مساحة المثلث الثاني} = 9 \times 16 = 144 \text{ سم}^2$$

دائل ان تحل

- الربط مع الزراعة** مزرعتان على شكل مصلعين متشابهين، النسبة بين طولي مصلعين متراظرين فيما بينهما، فإذا كان الفرق بين مساحتيهما ٢٢ فدانًا، فأوجد مساحة كل منها.

三

- ٦) أب جد، س ص ع ل مصلعلان متشابهان. تقاطع قطري الأول في م وتقاطع قطري الثاني في ن
أثبت أن $M(M\text{-المصلعل س ص ع ل}) = M(\text{جد}) = (\text{ن ع})$

七

١٠. المعلم أب جد - المعلم من صي عل

اپ جو ~ Δ سے صع

جـ ٢ صـ ٦


م ب ج - د ن ص ع

المعلم أب جع - المعلم بـ جع

$$\text{م} = \frac{\text{المعلم} \Delta \text{ ج} \Delta}{\text{ج} \Delta}$$

مقدمة

مـ (المصلـم أبـ جـي): مـ (المصلـم سـ ضـ عـ لـ) = (مـ جـيـ) : (نـ عـ)




حکوم آن تدل

٦) اب جدی، س ص ع ل مضمون متشابهان فإذا كانت م متصرف بـ جـ، ن متصرف صـ ع فثبتت أنـ
مـ(المطلع اب جـ) : مـ(المطلع س صـ ع لـ) = (مـ وـ) : (نـ لـ)

RED

٧) أب ج مثلث قائم الزاوية في ب، فإذا كانت أب، بـ جـ، أـ ضلـاعـ مـتـاـفـلـةـ لـلـلـاـثـةـ مـضـلـعـاتـ مـتـاـشـاهـةـ
مـشـأـةـ عـلـىـ أـضـلـاعـ الـمـلـثـ أـبـ جـ وـ هـىـ عـلـىـ التـرـتـيبـ: المـضـلـعـ سـ، المـضـلـعـ صـ، المـضـلـعـ عـ.
فـأـقـيـمـ أـنـ مـرـ(المـضـلـعـ سـ) = مـرـ(المـضـلـعـ صـ) = مـرـ(المـضـلـعـ عـ)



$$\begin{aligned}
 & \text{الناتج} = \frac{\text{م}(\text{المضلع})}{\text{م}(\text{المضلع})} = \frac{\text{م}(\text{المضلع})}{\text{م}(\text{المضلع})} \\
 & \text{الناتج} = \frac{\text{م}(\text{المضلع})}{\text{م}(\text{المضلع})} = \frac{\text{م}(\text{المضلع})}{\text{م}(\text{المضلع})} \\
 & \text{الناتج} = \frac{\text{م}(\text{المضلع})}{\text{م}(\text{المضلع})} + \frac{\text{م}(\text{المضلع})}{\text{م}(\text{المضلع})} = \frac{\text{م}(\text{المضلع})}{\text{م}(\text{المضلع})} + \frac{\text{م}(\text{المضلع})}{\text{م}(\text{المضلع})}
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \gamma(\alpha\beta) = \gamma(\beta) + \gamma(\alpha) \quad \gamma_{\alpha\beta} = (\beta\alpha)$$


من (١) و (٢) ينتج أن $\frac{\text{مـ (المعلم سـ)}}{\text{مـ (المعلم عـ)}} = \frac{\text{مـ (المعلم صـ)}}{\text{مـ (المعلم عـ)}}$

ويكون $\mu(\text{المصلح س}) + \mu(\text{المصلح ح}) = \mu(\text{المصلح ع})$

حائل آن تحل

٧) أب جد مثلث قائم الزاوية في أ، فيه أب = ٩ سم، بـ جـ = ١٣ سم، حيث أـ بـ جـ، أـ جـ أضلاع متاظرة
لثلاثة مصلعات متشابهة لـ مـ نـ منشأة على أضلاع المثلث أـ بـ جـ من الخارج على الترتيب.
فإذا كانت مساحة سطح المصلعل تساوى ١٠٠ سم^٢ أوجد مساحة سطح كل من المصلعات مـ نـ.

نحوه من مكتبة



في الشكل المقابل: أ ب ج د متوازي أضلاع.

هـ آب حیث $\frac{A}{H}$ = $\frac{2}{7}$ ، و هـ $\frac{1}{7}$ جذب = (و)

۱) أثبت أن $\triangle DGE \sim \triangle HAE$


٤) أوجد ملأ حوى

تمارين ٢ - ٣

151

١. إذا كان Δ أب جـ ~ Δ س ص ع، وكان أب = ٣ س ص فـ فإن $\frac{\Delta \text{ س ص}}{\Delta \text{ أب جـ}} =$
 ٢. إذا كان Δ أب جـ ~ Δ ي هـ و، Δ (أب جـ) = ٩ Δ (ي هـ) وكان ي هـ = ٤ س فـ فإن
 $\frac{\Delta \text{ ب}}{\Delta \text{ س}} =$

٤) ادرس كلامي من الأشكال التالية، حيث لك ثابت تذاب، ثم أكمل:



- $$\begin{aligned} \text{م. } (\triangle ABC) &= 900 \text{ سم}^2 \\ \text{م. } (\triangle ABD) &= 180 \text{ سم}^2 \quad \text{فإن:} \\ \text{م. } (\triangle ABE) &= \text{--- سم} \quad \text{فإن: م. } (\triangle AED) = \text{--- سم} \end{aligned}$$

A diagram showing two triangles, ABC and A'B'C'. Triangle ABC has vertices A at the top right, B at the bottom left, and C at the bottom right. Triangle A'B'C' has vertices A' at the top left, B' at the bottom left, and C' at the top right. Several angles are labeled with letters x, y, z, and w. Angle A is labeled 'x', angle B is labeled 'y', angle C is labeled 'z', angle A' is labeled 'w', and angle C' is labeled 'x'. There are also other unlabeled angles indicated by arcs.

٢) اب جد مثلث، $\triangle ABC$ ایچ ایت او = $2 \cdot b \cdot h$ ، هه $\triangle ABC$ ایچ ایت و h // ب جد
اذا کانت مساحة $\triangle ABC$ او $= 60\text{ سم}^2$ ؛ أوجد مساحة ثلثة المنحرف او ب جد هه

٤) اب ج مثلث قائم الزاوية في ب، رشت المثلث المتساوية الأضلاع اب س، ب ج ص، اجد ع
أثبت أن: $\text{م}(\Delta \text{ا ب س}) + \text{م}(\Delta \text{ب ج ص}) = \text{م}(\Delta \text{اج ع})$

٥) اب ج مثلث فيه $\frac{أب}{ج} = \frac{٤}{٣}$ ، رسم الدائرة المارة برؤوسه. من نقطة ب رسم الماس لهذه الدائرة فنصل
 $\vec{اج}$ في ه أثبت أن: $\frac{مـ(\Delta أـج)}{مـ(\Delta أـج)} = \frac{٧}{٦}$

٦) اب جد و متوازی أضلاع س = أب ، س = آب حيث ب س = ٢ أب ، ص = جب ، ص = جـ حيث ب ص = ٢ ب جـ ، رسم متوازی الأضلاع ب س ص مع ص أثبت أن: $\frac{م (اب جد)}{م (س ب ص ع)} = \frac{1}{2}$

٧) أب جـ مثلث قائم الزاوية في بـ، بـ تـ أـجـ يقطعة في دـ، رسم على أـبـ، بـجـ المربعان
أـسـسـ بـ، بـمـنـ جـ خـارـجـ الثـلـثـ أـبـ جـ

أ) ثابت أن المثلث و أـسـسـ بـ ~ المثلث و بـمـنـ جـ

ب) إذا كان أـبـ = 6ـسـ، أـجـ = 10ـسـ، أـوجـدـ النـيـةـ بـيـنـ مـسـاحـتـيـ سـطـحـيـ المـضـلـعـيـنـ

٨) أـبـ جـ مثلـثـ، أـبـ، بـجـ، أـجـ أـضـلاـعـ مـتـاـظـلـةـ لـلـلـلـاـثـةـ مـضـلـعـاتـ مـتـاـشـابـهـ مـرـسـوـمـةـ خـارـجـ المـلـثـلـ، وـهـيـ
المـضـلـعـاتـ بـيـنـ سـ، صـ، عـ عـلـىـ التـرـيـبـ.

فـإـذـاـ كـانـتـ مـسـاحـةـ المـضـلـعـ سـ = 40ـسـ، وـمـسـاحـةـ المـضـلـعـ صـ = 85ـسـ، وـمـسـاحـةـ المـضـلـعـ عـ = 125ـسـ.

ثـابـتـ أـنـ الثـلـثـ أـبـ جـ قـائـمـ الزـاوـيـةـ.

٩) أـبـ جـ مـرـبـعـ قـيـسـتـ أـبـ، بـجـ، جـدـ، دـأـ بالـنـقـاطـ سـ، صـ، عـ، لـ عـلـىـ التـرـيـبـ بـنـسـنـةـ ٢:١
أـثـابـتـ أـنـ:

$$\frac{\text{مـرـبـعـ سـ}}{\text{مـرـبـعـ أـبـ جـ}} = \frac{\text{مـسـاحـةـ سـ}}{\text{مـسـاحـةـ أـبـ جـ}} = \frac{8}{2}$$

أ) الشـكـلـ سـ صـ عـ لـ مـرـبـعـ

١٠) حـالـةـ أـلـعـابـ مـسـطـلـلـةـ الشـكـلـ أـبعـادـهـ 8ـمـترـ، 12ـمـترـ، تمـ تـغـطـيـةـ أـرـضـيـهاـ بـالـخـبـ، فـكـلـفـتـ ٣٢٠٠ـجـنيـهـ.
أـحـبـ (يـاستـخـدـامـ الشـاهـيـهـ) تـكـالـيفـ تـغـطـيـةـ أـرـضـيـةـ صـالـةـ مـسـطـلـلـةـ أـكـبـرـ بـنـقـسـ نـوـعـ الخـبـ وـيـنـسـ
الـأـسـعـارـ، إـذـاـ كـانـ أـبعـادـهـ 21ـ، 14ـ، 21ـمـترـ.

تطبيقات التشابه في الدائرة


Applications of Similarity in the circle

رسوف لتعلم


- العلاقة بين وترتين متقاطعن في دائرة.
- العلاقة بين قطعتين لدائرة من نقطة خارجها.
- العلاقة بين طول عاس وطول جراري قاطع لدائرة مرسومين من نقطة خارجها.
- نتيجة وصل متكلمات وتطبيقات عملية باستخدام تشابه المثلثات في الدائرة.



في كل من الأشكال الآتية مثلثان متباينان. اكتب المثلثان بترتيب تعلق زواياهما واستنتج تاب الأضلاع المتناظرة.



شكل (٣)



شكل (٢)



شكل (١)

ـ في شكل (١): هل توجد علاقة بين $\angle HAB$ ، $\angle HCB$ ، $\angle HCA$ ، $\angle HDB$ ؟

ـ في شكل (٢): هل توجد علاقة بين $\angle HAD$ ، $\angle HCD$ ، $\angle HCB$ ، $\angle HBD$ ؟

ـ في شكل (٣): هل توجد علاقة بين $\angle HAD$ ، $\angle HCB$ ، $\angle HCA$ ؟


تمرين مشهور

إذا تقاطع المستقيمان الحاويان للوترين \overline{AB} ، \overline{CD} لدائرة في نقطة H فإن:

$$\angle HAB = \angle HCD = \angle HCB = \angle HDB$$



شكل (٢)



شكل (١)


لاستنتاج ذلك:

ـ ارسم \overline{AO} ، \overline{BO} ، \overline{CO} ، \overline{DO}

ـ في كل من الشكلين أثبت أن المثلثين $\triangle HAO$ ، $\triangle HCO$ ، $\triangle HBO$ ، $\triangle HDO$ متشابهان فيكون:

$$\frac{HA}{HB} = \frac{HC}{HD} \therefore \angle HAB = \angle HCD = \angle HCB = \angle HDB$$

مثال



- ١ في الشكل المقابل: $AB \cap CD = \{K\}$
وإذا كان $\frac{CK}{KB} = \frac{1}{3}$ ، $HK = 9$ سم ، $HD = 6$ سم
أوجد طول HB

الحل

$$\therefore \frac{CK}{KB} = \frac{1}{3} \Rightarrow HK = 9 \text{ سم} , HB = 27 \text{ سم}$$

(تمرين مشهور)

$$\therefore AB \cap CD = \{K\} \Rightarrow HK \times HB = HD \times HK$$

$$\text{فيكون: } 9 \times 27 = 6 \times 9$$




$$27 = 6$$

$$27 = 3$$


$$HK = 27 \text{ سم} , HB = 27 \text{ سم}$$

داور آن تحل

- ١ أوجد قيمة س في كل من الأشكال الآتية (الأطوال مقدرة بالستيمترات)



مثال



- ٢ في الشكل المقابل: $AB \cap CD = \{K\}$ ، $AB = 9$ سم ،
 $CD = 5$ سم ، $HK = 3$ سم. أوجد طول HB

الحل

يفرض أن $HB = s$ سم.

$$\therefore AB \cap CD = \{K\} \Rightarrow HK \times HB = HD \times HK$$

$$\text{فيكون: } s(s + 3) = (9 + 3)(3)$$

$$s^2 + 5s - 36 = 0$$



$$(s - 4)(s + 9) = 0$$

$$\therefore s = 4 \text{ ، } s = -9 \text{ مرفوض}$$

$$\therefore \text{طول } HB = 4 \text{ سم.}$$


حاول أن تحل

(الأطوال مقدرة بالستيمترات)



٢ أوجد قيمة س في كل من الأشكال الآتية

٣




٤


إذا كانت M نقطة خارج دائرة، \overrightarrow{MD} يمس الدائرة في ج، \overrightarrow{MB} يقطعها في A، B فـان

نتيجة

في الشكل المقابل: \overrightarrow{MD} مماس للدائرة،
 \overrightarrow{MB} يقطع الدائرة في A، B
 $\therefore (MD)^2 = MA \times MB$



مثال






٣ في الشكل المقابل: \overline{AD} مماس للدائرة،
 \overline{MB} يقطع الدائرة في A، B على الترتيب.
 حيث $DC = 8$ سم، $GD = 5$ سم، أوجد طول \overline{AB}

الحل

$$\begin{aligned} & \because \overline{AD} \text{ مماس، } \overrightarrow{MD} \text{ قاطع للدائرة} \\ & \therefore (AD)^2 = DC \times GD \quad (\text{نتيجة}) \\ & (AD)^2 = (5 + 4) \times 5 = 45 \\ & \therefore AD = 3\sqrt{5} \text{ سم.} \end{aligned}$$


حاول أن تحل

٤ في كل من الأشكال التالية \overline{AD} مماس للدائرة، أوجد قيم س، ص، ع العددية (الأطوال مقدرة بالستيمترات)



عکس تبریز شهر

إذا تقاطع المستقيمان الحاويان للقطعتين $A\bar{B}$ ، $\bar{C}\bar{D}$ في نقطة H (مختلفة عن A ، B ، C ، D) وكان $H \times A = H \times B = H \times C = H \times D$ فإن النقط A ، B ، C ، D تقع على دائرة واحدة.



30/30

۱۰۷


فیکون

• حل في (Δ) = في (Δ) لماذا؟

كـ هـ لـ اـ نـ تـ طـ أـ وـ بـ جـ لـ قـ عـ لـ دـ اـ لـ رـةـ وـ اـ حـ دـ ةـ فـ سـرـ إـ جـ اـ بـ تـ كـ

三

- ٤) أب ج مثلث فيه أب = ١٥ سم، أجد = ١٢ سم، وج = ٩ سم
أثبت أن الشكل وج هـ رباعي دائري.



الحل

$$v^2 = v_0^2 + \omega^2$$

$$T_0 = 17 \times 5 = 85$$

$$\therefore \text{اے} \times \text{بے} = \text{اے} \times \text{جے}$$


$\therefore \overrightarrow{PQ} \cap \overrightarrow{AB} = \{O\} = A \cap B$

القطع ٥، بـ جـ هـ تتم على دائرة واحدة

(فکس تبریز مشهور)

دالول آن تدل

- ٤) في أيِّ من الأشكال التالية تقع النقطَ أ، ب، ج، د على دائرة واحدة؟ فسر إجابتك.




نتیجه إذا كان $(هـ)$ = $هـ \times هـ$

مثال

- ٥ اب ج مثلث فيه اب = 8 سم، اجد = 4 سم، وج = 6 سم
أثبت أن \overline{AB} تمس الدائرة المارة بالنقطة ب، ج، وج

الحل



$$\therefore \text{اج} \times \text{أي} = 4 \times 4 = 16$$


$$\therefore (\text{اب})^2 = 64 =$$

$$\therefore (\text{اب})^2 = \text{اج} \times \text{أي}$$

$\therefore \overline{AB}$ تمس الدائرة المارة بالنقطة ب، ج، وج عند النقطة ب.

حاول أن تحل

- ٦ في أيٍ من الأشكال الآتية يكون \overline{AB} مماساً للدائرة المارة بالنقطة ب، ج، وج




مثال



- ٦ **تطبيقات حياتية: الربط مع الجبال والجبل**: في إحدى المناطق الساحلية توجد طبقة أرضية على شكل قوس خلبي. وجد الجبالوجيون أنه قوس دائرة كافٍ في الشكل المقابل. أوجد طول نصف قطر دائرة القوس.

الحل



يفرض أن طول نصف قطر دائرة القوس = ١٥ متراً

$\therefore \overline{AB}$ ، ج، وج وتران متقاطعان في هـ

$$\therefore \text{هـ} \times \text{هـ} \times \text{هـ} = \text{هـ} \times \text{هـ} \times \text{هـ}$$

$$27 \times 27 = 9 \times (2 \times 9)$$

$$81 = 9 \times 18$$


$$81 = 81$$

$$15 = 15$$


أي أن طول نصف قطر دائرة القوس يساوي ١٥ متراً.

٤ - تمارين


١ باستخدام الآلة الحاسبة أو الحساب العقلي، أوجد قيمة س العددية في كل من الأشكال التالية
(الأطوال مقدرة بالستيمترات)




٢ في أيٍ من الأشكال التالية تقع النقطة أ، ب، ج، د على دائرة واحدة؟ فسر إجابتك.
(الأطوال مقدرة بالستيمترات)




٤ في أي من الأشكال التالية \overline{AB} مماس للدائرة المارة بالقطع b , جد i .



٥ دائرتان متقاطعتان في A , B , C $\cong \overline{AB}$, C $\cong \overline{AB}$ رسم من جد القطعان \overline{CD} , \overline{EF} مماسان للدائرةتين عند S , M . أثبت أن $CS = EF$.



٦ في الشكل المقابل: الدائرة M , N , متماستان عند H . \overline{AH} يمس الدائرة M عند B , و YH يمس الدائرة N عند G . AH يقطع الدائرة N عند D , YH على الترتيب حيث $O_1 = E$ سم، $O_2 = H$ سم، $HD = 7$ سم. أثبت أن B منتصف AH .



٧ في الشكل المقابل: $L \cong \overline{SC}$ حيث $S-L = 4$ سم، $SC = 8$ سم، $M \cong \overline{SU}$ حيث $S-M = 6$ سم، $UM = 2$ سم. أثبت أن:

١ $\triangle SLM \sim \triangle SUC$

٢ الشكل $LSCU$ رباعي دائري.

٨ $\overline{AB} \cap \overline{GH} = \{H\}$, $AH = \frac{5}{11}BH$, $GH = \frac{3}{5}HG$, إذا كان $BH = 1$ سم، $GH = 5$ سم.

أثبت أن النقطة A , B , G , H تقع على دائرة واحدة.

٩ \overline{AB} جد مثلث Y , \overline{BZ} حيث $ZB = 4$ سم، $ZG = 6$ سم. إذا كان $AG = 6$ سم. أثبت أن:


١ \overline{AG} مماسة للدائرة التي تمر بالقطع AB , Z .

٢ $\triangle AGZ \sim \triangle BGA$


٣ $mr(\triangle ABG) : mr(\triangle AGZ) = 5 : 4$.

١٠ دائرة متحدة المركز M , طولاً نصف قطر يهما 12 سم، 7 سم، رسم الوتر \overline{AC} في الدائرة الكبرى ليقطع الدائرة الصغرى في B , G على الترتيب. أثبت أن: $AB \times BG = 95$.


- ١٠ اب ج د مستطيل فيه أب = ٦ سم، ب ج = ٨ سم. رسم بـ هـ تـ آجـ ققطع آجـ في هـ، آوـ في دـ.
 أ) أثبت أن $(اب)^2 = او \cdot او$.
 ب) أوجد طول آوـ.




- ١١ **الربط مع المثلثات:** كسر أحد تروس آلـه ولاستبدالـه مطلوب معرفة طول نصف قطر دائـرتهـ. يـبين الشـكـلـ المـقـابـلـ جـزـمـاـ من هـذاـ التـرسـ، والـمـطلـوبـ تـعـيـنـ طـولـ نـصـفـ قـطـرـ دائـرـتهـ



- ١٢ **الربط مع النسبة:** يـبـينـ الشـكـلـ المـقـابـلـ مـخـطـلـاـ لـحـدـيـقـةـ عـلـىـ مـدـخـلـ دـ. شـكـلـ دـائـرـةـ بـهـ طـرـيقـانـ يـتـقـاطـعـانـ عـنـدـ نـافـورـةـ المـيـاهـ. أـوجـدـ بـعـدـ نـافـورـةـ المـيـاهـ عـنـدـ المـدـخـلـ جـ



- ١٣ **الربط مع المنزل:** تـسـتـخدـمـ هـذـىـ شـبـكـةـ لـشـنـ الـحـومـ عـلـىـ شـكـلـ دائـرـةـ مـنـ سـلـكـ، طـولـ قـطـرـهـ ٤٠ـ سـمـ، يـدـعـمـهـاـ مـنـ الوـسـطـ سـلـكـانـ متـواـزـيـانـ وـمـتـسـاوـيـانـ فـيـ الطـولـ كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ المـقـابـلـ، وـبـعـدـ يـبـنـهـاـ ١٠ـ سـمـ. أحـبـ طـولـ كـلـ مـنـ سـلـكـيـ الدـعـامـ.



- ١٤ **الربط مع الاتصال:** تـنـقلـ الأـقـمـارـ الصـنـاعـيـةـ البرـامـجـ التـلـيـقـزـيونـةـ إـلـىـ كـافـةـ مـنـاطـقـ الـأـرـضـ، وـتـسـتـخدـمـ أـطـيـاقـ خـاصـةـ لـاسـتـبـالـ إـشـارـاتـ البـثـ التـلـيـقـزـيونـيـ، وـهـيـ أـطـيـاقـ مـقـعـرـةـ عـلـىـ شـكـلـ جـزـءـ مـنـ سـطـحـ كـرـةـ. يـبـنـ الشـكـلـ المـقـابـلـ مـقـطـلـاـ فـيـ أـحـدـ هـذـهـ الـأـطـيـاقـ، طـولـ قـطـرـهـ ١٨٠ـ سـمـ، وـالـمـطلـوبـ حـاـبـ طـولـ نـصـفـ قـطـرـ كـرـةـ تـقـعـرـةـ ٤٠ـ سـمـ.

ملخص الوحدة

المضلعان المتشابهان

يتناهيان متشابهان لهما نفس العدد من الأضلاع إذا كانت الزوايا المتناظرة متطابقة وأطوال الأضلاع المتناظرة متساوية.

نسبة التشابه (معامل التشابه)

إذا كان المضلع $A/B/C/D$ المضلع $A'/B'/C'/D'$ يكون كمعامل تشابه المضلع $A/B/C/D$ للمضلع $A'/B'/C'/D'$ حيث $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'} = k$ ، $k \neq 0$.
النسبة بين محيطين متشابهين تساوى معامل تشابههما

سلمة: قضية أو عبارة رياضية يسلم بصحتها دون برهان ويستتبع منها حقائق تتعلق بالنظام، مثل:
«إذا طابقت زاويتان في مثلث نظائرها في مثلث آخر كان المثلثان متشابهين».

نتيجة (١): إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمين الحادعين لهما فإن المثلث الناتج يشابه المثلث الأصلي.

نتيجة (٢): إذا رسم من رأس القائمة في المثلث القائم الزاوية عمود على الوتر انقسم المثلث إلى مثلتين، وكلاهما يشابه المثلث الأصلي.

نظريّة ١: إذا كانت الأضلاع المتناظرة في مثلتين فأنهما يتشابهان.

نظريّة ٢: إذا طابقت زاوية من مثلث زاوية من مثلث آخر، وتناسبت أطوال الأضلاع التي تحווها هاتان الزاويتان كان المثلثان متشابهين.

العلاقة بين مساحتي سطحين متشابهين

نظريّة ٣: النسبة بين مساحتي سطحين متساويين متشابهين متساوية مربع النسبة بين طولى أي ضلعين متناظرين فيها.

حقيقة: المضلعان المتشابهان يمكن أن ينقسمان إلى نفس العدد من المثلثات التي يشابه كل منها نظيره.

نظريّة ٤: النسبة بين مساحتي سطحين متشابهين متساوي مربع النسبة بين طولى أي ضلعين متناظرين فيها.

معلومات إثرائية @

تم زيارة الموقع الآتى:



نظريات التنااسب في المثلث

The Triangle Proportionality Theorems

محيي الدين سعيد بالآخر

أهداف الوحدة

في نهاية الوحدة يكون الطالب قادرًا على أن:

- يُعرف ويرهن النظرية التي تنص على: (إذا رسم متىيم بوازي أحد أضلاع المثلث وقطع القائمتين الآخرين فإنه يقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة) وعكستها، ونتائج عليها.
- يُعرف ويرهن نظرية تاليس العامة التي تنص على: (إذا قطع متىيمان عدة مستقيمات متوازية فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القائمتين تكون متناسبة مع أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر)، وحالات خاصة منها.
- يُعرف ويرهن النظرية التي تنص على: (إذا نصفت زاوية رأس مثلث أو الزاوية الخارجية للمثلث عند هذا الرأس،
- قسم القاعدة المثلث من الداخل أو الخارج إلى جزأين تساوى نسبة طولهما نسبة طول القائمتين الآخرين) وحالات خاصة منها.
- يوجد قواعد نقطة تقاطع بالنسبة لدائرة (القواعد والمحاسن).
- يستخرج قياسات الزوايا الناتجة من تقاطع الأوتار والمسامس في دائرة.
- يحل تطبيقات تشمل إيجاد طول المضلع الداخلي والخارجي.

المصطلحات الأساسية

Exterior Bisector	Interior Bisector	Perpendicular	Bisector	Midpoint	Concurrent	Ratio	Line
نصف خارجي	نصف داخلي	عمودي على	نصف	نقطة تقسيف	متواز	ناب	زاوية
				Median	Concurrent	Proportion	Parallel

دروس الوحدة


الدرس (١ - ٢): المستقيمات المتوازية والأجزاء المتضادة.

الدرس (٣ - ٤): منصف الزاوية والأجزاء المتضادة.

الدرس (٥ - ٦): تطبيقات النسب في الدائرة.

الأدوات المستخدمة

أدوات هندسية للرسم والقياس - حاسب آلي -
برامج رسومية - جهاز عرض بيانات - ورق مربعات
- خيوط - مقص




لعبة لازرية

الرياضيات شاطئ ذكري معن يجعل الدهن مفتوحاً، والعطل صحراء، وشهم في حل كثير من المشكلات والتحديات العملية والعلمية والحياتية، من خلال تمثيلها أو تمثيلها بعلاقات بلغة الرياضيات ورموزها ليتم حلها، ثم إعادةها إلى أصولها المادية.

فقط قدماء المصريين لذلك فقاموا بالمعابدة والأهرامات وفق خطوط مستقيمة بعضها متوازي والأخر قاطع لها، كما حرسوا الأرض الزراعية في خطوط مستقيمة متوازية، وقد أخذ الإغريق الهنود عن المصريين القدماء فوضع إقليدس (٣٠٠ ق.م) نظاماً هندسياً متكاملاً عرف بالهندسة الإقليدية وتقوم على مسلمات خمس، أهمها: مسلمة التوازي وهي: "من نقطة خارج مستقيم يمكن رسم مستقيم واحد فقط يمر بذلك النقطة وموازي مستقيماً معلوماً". وتعني الهندسة الإقليدية بالأشكال المتوازية (المثلثات - المقلعات - الدوائر) والأشكال ثلاثية الأبعاد، كما أن لها تطبيقات عملية في مجالات متعددة منها إنشاء الطرق والكباري وتحطيم المدن وإعداد خرائطها التي تعتمد على توازي المستقيمات و المستقيمات القاطعة لها وفق تسامب بين الطول الحقيقي والطول في الرسم (مقاييس الرسم).

مخطط تظليلي للوحدة




المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة

Parallel Lines and Proportional Parts

سوف تتعلم


- خصائص المستقيم التوازي لدى شعاع من أضلاع مثلث.
- استخدام النسب في حساب أطوال وبرهنة علاقات المقطع متناسبة ناتجة عن قواعد مسطريات متوازية.
- تدريب وحل مشكلات حياتية تتضمن المستقيمات المتوازية وقواعدها.



فكرة و لفظ

- ١- ارسم المثلث $A-B-C$ ، عين نقطة $D \in AB$
ثم ارسم $E \in BC$ // AB ويقطع AC في H
- ٢- أوجد بالقياس طول كل من:
 AD, DB, AH, HC
- ٣- احسب النسبتين $\frac{AD}{DB}$, $\frac{AH}{HC}$ وقارن بينهما، ماذا تلاحظ؟
إذا تغير موقع E محافظاً على توازيه مع AB .
هل تتغير العلاقة بين $\frac{AD}{DB}$, $\frac{AH}{HC}$? ماذا تنتهي؟

إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث ويقطع الضلعين الآخرين فإنه يقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة.



نظريه

المعلميات: $A-B-C$ مثلث، $E \in BC$ // AB

المطلوب: $\frac{AD}{DB} = \frac{AH}{HC}$

البرهان: $\because E \in BC$ // AB

$\therefore \triangle A-B-E \sim \triangle A-C-H$ (سلسلة الشاب)

ويكون $\frac{AD}{DB} = \frac{AH}{HC}$

$\therefore AD \parallel DB, AH \parallel HC$

$\therefore AD = DB, AH = HC$ (٢)

من (١)، (٢) ينتج أن:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AH}{HC}$$

ويكون $\frac{AD}{DB} = \frac{AH}{HC} = \frac{AD}{AH}$

$$1 + \frac{AD}{DB} = 1 + \frac{AD}{AH}$$

$$\therefore \frac{AD}{DB} = \frac{AH}{HC}$$

ومن خواص النسبة نجد أن: $\frac{AD}{DB} = \frac{AH}{HC}$ (وهو المطلوب)

المصطلحات الأساسية


Parallel	• يوازي
Midpoint	• مصف
Median	• متوسط
Transversal	• قاطع

الأدوات والوسائل

- أدوات هندسية للرسم والقياس.
- حاسب آلي.
- برنامج رسوميات.
- جهاز عرض بيانات.

اللحظة إن: $\therefore \frac{أي}{أي} = \frac{أي}{أي}$ $\therefore \frac{أي}{أي} = \frac{أي}{أي}$

المشكلة: $\frac{أي}{أي} = \frac{أي}{أي}$



مثال

١ في الشكل المقابل: $\overline{SC} // \overline{BG}$, $AS = 16$ سم, $BS = 12$ سم.

إذا كان $AC = 4$ سم، أوجد CG .

إذا كان $GD = 21$ سم، أوجد AG .

الحل

$$1 \quad \because \overline{SC} // \overline{BG} \quad \therefore \frac{AS}{SB} = \frac{AC}{CG}$$




$$\text{ويكون: } \frac{16}{12} = \frac{4}{CG} \quad \therefore CG = \frac{12 \times 4}{16} = 3 \text{ سم}$$

$$2 \quad \because \overline{SC} // \overline{BG} \quad \therefore \frac{AB}{BS} = \frac{AG}{GD}$$

$$\text{ويكون: } \frac{12+16}{12} = \frac{AG}{21} \quad \therefore AG = \frac{21 \times 28}{32} = 14.25 \text{ سم}$$

داول أو تحل

١ في كل من الأشكال التالية: $\overline{SC} // \overline{BG}$. أوجد قيمة SC العددية (الأطوال مقدرة بالسنتيمترات)




إذا رسم مستقيم خارج مثلث ABC يوازي ضلعه BC ، ولتكن SC ، وقطع

SC على الترتيب فلن: $\frac{AS}{SB} = \frac{AC}{SC}$ (كما في الشكل).


النتيجة

بتطبيق خواص النسبة نستنتج أن:

$$\frac{AS}{AB} = \frac{AC}{SC}, \quad \frac{AS}{AB} = \frac{AC}{BG}$$



مثال



- ٢ في الشكل المقابل: $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$, $\frac{BE}{EC} = \frac{1}{2}$
ص \parallel ه حيث $BC \parallel DE$.
إذا كان $AB = 6$ سم، $AC = 12$ سم، $BC = 8$ سم
أوجد طول كل من AD ، DB .

الدل


$$\therefore DE \parallel BC \quad \text{و} \quad \frac{AD}{DB} = \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$$

في $\triangle AHD$:

$$\because BC \parallel DE \quad \therefore \frac{AD}{DB} = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad \frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$$

$$\text{و} \quad \frac{AD}{DB} = \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$$


حاول أن تحل



- ٢ في الشكل المقابل: $DE \parallel AC$ ، $AD \parallel DC = (b)$
إذا كان: $AB = 8$ سم، $BC = 9$ سم، $DC = 12$ سم
أوجد طول DE .
ب إذا كان: $AB = 6$ سم، $BC = 9$ سم، $DC = 18$ سم.
أوجد طول DE .

عُّرض
نظريّة


إذا قطع مستقيم ضلعين من أضلاع مثلث، وقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة فإنه يوازي
الضلع الثالث.



في الأشكال الثلاثة السابقة: $AB \parallel DE$ ، $DE \parallel BC$ في $\triangle ABC$ ، $AD \parallel DC$ في $\triangle ABC$
فإن $DE \parallel BC$

تفكر منطقى: هل $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ولماذا؟ - هل $\angle ADE \equiv \angle ABC$ فسر إجابتك.

اكتب برهانك العكس النظريّة.



110

- ٤ في الشكل المقابل: أب جد مثلث قائم الزاوية في أ
أليت أن: $\angle H = \angle G$.
أوجد طول بـ جـ.

15

- $$\therefore \text{أك} = \frac{\text{م}}{16 - 25} = 3$$

١- المثلث أو هـ قائم الزاوية في ا
(نظرية فيثاغورث)




$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{3} = \frac{-1}{-3}, \quad \frac{1}{\tau} = \frac{\tau}{3} = \frac{51}{-3}.$$

$\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ ويكون $\triangle AED \sim \triangle ABC$.

$$\therefore \Delta ABC \sim \Delta AED \quad (\text{لما زاويا} \angle A \text{ و} \angle C \text{ متساوية})$$

دانلود آن


- ٢) في كل من الأشكال التالية حدد ما إذا كان و_ع_د / ب_ج أم لا.



11

- ١) اب جو شکل ریاضی فیہ سے آب، ص ۶ آج حیث سے ص / ب جد،
رسم صع / جو ویقطع اور فی ع ابست ان مع / ب ع.

150



$$(v) \quad \frac{اص}{اس} = \frac{اس}{اص} ; \quad \overline{\text{اس}} \overline{\text{اص}} // \overline{\text{اص}} \overline{\text{اس}}$$

فی اور جد


$$(1) \quad \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \tan x = 1$$

من (٤٢) نتائج آن: $\frac{اسود}{اسود} = \frac{٤}{٤}$

فی ابڑی

حاول أن تحل


- ٤ اب ج د شكل رباعي تقاطع قطراته في م. رسم $\overline{مـهـ} // \overline{أـبـ}$ ويقطع $\overline{أـبـ}$ في ه رسم $\overline{مـوـ} // \overline{جـدـ}$ ويقطع $\overline{جـدـ}$ في و. أثبت أن $\overline{هـوـ} // \overline{أـجـ}$



تعمير منطقى: إذا كان $هـ، وـ، سـ، صـ$ من منصصات الأضلاع $\overline{أـبـ}، \overline{بـجـ}، \overline{جـدـ}، \overline{وـأـ}$ في الشكل الرباعي $أـبـجـدـ$. هل الشكل $هـوـسـوـ$ من منوارى أضلاع؟

لفهم: ما المطلوب؟ متى يكون الشكل متوازى أضلاع؟

خطى: كون مثلثات برسم $\overline{بـوـ}$ التي تقسم الشكل إلى مثلثين.



حل: اكتب العبارات الرياضية المناسبة للبرهان ومبرراتها.


تحقق: ابحث هل $\overline{هـ} // \overline{سـ}$ ؟ فسر إجابتك.

حاول أن تحل

- ٥ في الشكل المقابل: $أـبـ$ جـ مثلث، $هـ$ ∞ $\overline{أـجـ}$.

$\overline{وـهـ} // \overline{أـبـ}، \overline{وـ} // \overline{أـهـ}$

ارسم مخططًا يوضح كيفية إثبات أن $(جـهـ)^\circ = جـو \times جـبـ$




مثال

- ٦ **تحديد المواقع:** لتحديد الموقع جـ، قام الماسحون بالقياس وإعداد المخطط المقابل.

أوجد بعد الموضع جـ عن الموضع أـ

الحل



$$أـبـ \perp بـيـ، جـدـ \perp بـيـ \therefore أـبـ // جـدـ$$


$$\therefore أـجـ \cap بـيـ = [هـ] \therefore أـبـ // جـدـ$$

$$\therefore \frac{هـ}{أـجـ} = \frac{هـبـ}{بـيـ} \text{ ويعمل } \frac{هـ}{أـجـ} = \frac{60}{100+60} = \frac{60}{160} = \frac{3}{8}$$

$$\therefore أـجـ = \frac{3 \times 160}{8} = 60 \text{ متر.}$$

حاول أن تحل

- ٦ مكافحة التلوث: قام فريق مكافحة التلوث بتحديد موقع بقعة زيت على أحد الشواطئ كما في الشكل المقابل. احسب طول بقعة الزيت.




فكرة و ناقش



لعلك لاحظت إسقاطات إيكانية استخدام توازي مستقيم لأحد أضلاع مثلث في تطبيقات حياتية كثيرة. يوضح الشكل المقابل بوابة أحد المشاتل الزراعية، وهي مكونة من قطع خشبية متوازية وأخرى قاطعة لها. هل توجد علاقة بين أطوال أجزاء قواعده هذه القطع المتوازية؟

نحوحة

لبحث وجود علاقة أم لا ندرج المشكلة (ضع نموذجاً رياضياً للمشكلة) كما يلى:




- ١- ارسم المستقيمات $l, //, m, //, n, //, o$ ، a, b ، c, d, e قاطعنان لها في A, B, C, D, E, F على الترتيب كما بالشكل المقابل.

- ٢- قس أطوال القطع المستقيمة وقارن النسب التالية:
 $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{BD} = \frac{CD}{CE} = \frac{DE}{EF}$
 ماذا نستنتج؟

Tallis' Theorem

نظرية تاليس العامة

إذا قطع مستقيمان عدة مستقيمات متوازية، فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين تكون متناسبة مع أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر.



المعطيات: $l, //, m, //, n, //, o, //, p$ ، a, b ، c, d, e, f, g, h, i قاطعنان لها

المطلوب: $A: B: C: D: E = F: G: H: I: J$

البرهان: ارسم \overleftrightarrow{m} أو \overleftrightarrow{o} ، ويقطع l في H ، n في G ، o في I ، p في J .
 $\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{BD} = \frac{CD}{CE} = \frac{DE}{EF}$
 $\frac{FG}{FH} = \frac{GH}{HI} = \frac{HI}{IJ}$
 $\therefore A: B: C: D: E = F: G: H: I: J$

$\therefore A: B: C: D: E$ متوازي أضلاع ويكون: $A: D = F: I$

بالمثل: $هـ = بـ جـ$ ، $بـ سـ = بـ جـ$ ، $سـ صـ = جـ حـ$
في $\triangle ABC$:

$$\therefore \overline{BC} \parallel \overline{AD} \quad ; \quad \frac{AB}{BC} = \frac{AH}{HD}$$

$$\text{ويبكون: } \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{GD} \quad , \quad \frac{AB}{BC} = \frac{BG}{GD}$$

بالمثل $\triangle ABC$ و $\triangle GHD$:

$$\therefore \frac{BG}{GD} = \frac{BG}{HD} \quad , \quad \frac{BG}{GD} = \frac{GD}{HD}$$

من (١)، (٢) يتبع أن

$$\frac{AB}{BC} = \frac{BG}{GD} = \frac{GD}{HD}$$


$\therefore AB : BC : GD = AB : BG : GH : HD$ وهو المطلوب.

حاول أن تحل

٧ اكتب ما تساويه كل من النسب التالية مستخدماً الشكل السابق:

$$\frac{AB}{BC} \quad \frac{AD}{BD} \quad \frac{DC}{BC} \quad \frac{DC}{AC} \quad \frac{AD}{AC}$$

مثال



٦ في الشكل المقابل: $AB \parallel CD \parallel HE \parallel GS$ ،
 $AG = 28$ سم، $GH = 20$ سم، $HE = 15$ سم، $GS = 22$ سم.
أوجد طول كل من: BE ، HS

الحل



$$\therefore AB \parallel CD \parallel HE \parallel GS$$



$$\therefore \frac{AB}{CD} = \frac{HE}{GS} = \frac{BE}{ED}$$

$$\therefore \frac{28}{20} = \frac{15}{ED} \quad ; \quad BE = 21 \text{ سم} \quad ; \quad HS = 44 \text{ سم}$$

حاول أن تحل

٨ في كل من الأشكال التالية، المستقيمات الحمراء تقطع مستقيمات متوازية. احسب قيم s ، t العددية
(الأطوال مقدرة بالسيمتراط)





حالات خاصة

- إذا تناصف المستقيمان m, m' في النقطة A
وكان: $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{A'B'}$, فإن: $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{AD}{A'D'}$
وبالعكس: إذا كان: $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{AD}{A'D'}$
فإن: $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{A'B'}$

نظرية تاليس الخاصة

- إذا كانت أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين متساوية فإن
أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر تكون متساوية كذلك.
في الشكل المقابل L, L', L'', L''' , قطعها المستقيمان m, m'
وكان: $AB = B'D' = D'E' = E'F'$ فإن: $AB = B'D' = D'E' = E'F'$


مثال

- ٧ في الشكل المقابل أوجد القيمة العددية لكل من s, m, n .

الحل




$$\therefore \overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD} \parallel \overrightarrow{EF}, \quad B'D = D'E \\ \therefore C'D = DE$$

$$\text{ويكون: } 2s - 3 = s + 2 \quad \therefore s = 5 \\ \therefore B'D = 5 \quad \therefore s = 5$$



حاول أن تحل


- ٨ في كل مما يأتي أوجد قيمة s, m, n العددية. (الأطوال مقدرة بالستيمترات)



مكمل

أراد يوسف تقسيم شريط من الورق إلى ٢ أجزاء متساوية في الطول، فقام بوضعها على صفحة كراسه كما بالشكل المقابل وحدد نقطتي التقسيم A, B .

هل تقسيم يوسف للشريط صحيحًا؟ فسر إجابتك.
استخدم أدواتك الهندسية لتحقق من صحة إجابتك.




٤ الربط بالصناعة: تنقل عبوات الأسمدة من إنتاج أحد المصانع بائز لاقتها عبر أنبوب مائل لتحملها السيارات إلى مراكز التوزيع كما في الشكل المقابل.
إذا كانت $\triangle ABC$ مساقط النقط A, B, C على الأفق نفس الترتيب، $AB = 12\text{متر}$ ، $BC = 8\text{متر}$ ، $\angle B = 90^\circ$.
أوجد طول الأنابيب لأقرب متر.

الحل

$$\begin{aligned} & \because \triangle ABC \text{ مساقط النقط } A, B, C \text{ على الأفق} \\ & \therefore \triangle ABC \text{ قائم على } \angle B \\ & \text{ويكون: } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{12^2 + 8^2} = \sqrt{144 + 64} = \sqrt{208} = 4\sqrt{13} \approx 19,7 \text{ متر.} \\ & \therefore AC = 19,7 \text{ متر.} \end{aligned}$$


حاول أن تحل

٥ الربط بالإنشاءات:

إذا كان $AB = 18\text{متر}$ ، $BC = 2\text{متر}$
 $AB : BC : CG : GD = 3 : 4 : 5 : 2$
أوجد طول كل من CG ، GD .


أوجد من الشكل $\triangle ABC$ بعدة طرق مختلفة،
كلاهما ممكن ذلك. هل حصلت على نفس الناتج؟

تحقق من فهمك



حل مشكلات: أ ب سلم طوله 12متر يستند بطرفه العلوي على حائط رأسى وبطرفه السقلى ب على أرض أفقية خشنة. إذا كان بعد الطرف السقلى عن الحائط 10متر . فاحسب المسافة التي يقصدها الرجل على السلم ليصبح على ارتفاع 4متر من الأرض.


تمارين ١٣ - ١



١ في الشكل المقابل $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ أكمل:

أ إذا كان $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$ فإن: $\frac{DE}{BC} = \frac{1}{3}$ ، $\frac{DE}{BC} = \frac{1}{3}$

ب إذا كان $\frac{AD}{AB} = \frac{4}{7}$ فإن: $\frac{DE}{BC} = \frac{4}{7}$ ، $\frac{DE}{BC} = \frac{4}{7}$



٢ في الشكل المقابل $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$. حدد العبارات الصحيحة من ما يلي:








أ $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$ ب $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{3}$ ج $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{4}$

د $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{5}$ ه $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{6}$

ب $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{7}$ و $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{8}$

ز $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{9}$ ز $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{10}$

٣ في كل من الأشكال التالية $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$. أوجد قيمة س العددية (الأطوال بالستيمترات).




٤ في الشكل المقابل: $AB \parallel DE$ ، $AD = 6\text{ سم}$ ، $DB = 3\text{ سم}$

$AC = 8\text{ سم}$ ، $BC = 4\text{ سم}$ ، $DE = 3\text{ سم}$

أوجد طول \overline{DE}




- ٥ س $\overline{ص}$ \cap $\overline{ع} \cap \overline{ل} = \{م\}$ ، حيث $س ع // ل ص$ ، فإذا كان $س = 9$ سم، $ص = 15$ سم، $ع = 36$ سم.
أوجد طول $ع م$.



لكل مما يأتي: استخدم الشكل المقابل والبيانات المعلقة لإيجاد قيمة س:

- ١ أى = ٤ ، ب و = ٨ ، ج ه = ٦ ، ا ه = س.
- ٢ ا ه = س ، ه ج = ٥ ، او = س - ٢ ، و ب = ٣.
- ٣ أ ب = ٢١ ، ب و = ٨ ، و ج = ٦ ، او = س.
- ٤ او = س ، ب و = س + ٥ ، و ب = ٣ و ج = ١٣.

- في كل من الأشكال التالية، حدد ما إذا كان $س ص // ب ج$



١

- ٦ س $ص ع$ مثلث فيه س $ص = 14$ سم، س $ع = 21$ سم، ل \equiv س $ص$ بحيث س $ل = 7$ سم،
م \equiv س $ع$ حيث س $م = 8$ سم. أثبت أن $ل م // ع س$

- ٧ في المثلث $A B C$ ، $D \equiv A B$ ، $E \equiv A C$ ، $H = A H$ = $B H$.
إذا كان $أو = 10$ سم، $و ب = 8$ سم، حدد ما إذا كان $ه // ب ج$. فسر إجابتك.

- ٨ ا ب ج د شكل رباعي تقاطع فطراه في هـ فإذا كان $ا ه = 6$ سم، $ب ه = 12$ سم، $ه د = 10$ سم،
 $ه د = 7$ ، $ه د = 8$ سم. أثبت أن الشكل ا ب ج د شبه منحرف.


- ٩ أثبت أن القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصف ضلعين في مثلث يوازي ضلعه الثالث، وطولها يساوي
نصف طول هذا الضلع.

- ١٠ ا ب ج مثلث، $D \equiv A B$ حيث $أو = 4$ و $ب$ ، $H \equiv A G$ حيث $ه ج = 2$ ا ج، رسم AS يقطع $ب ج$
في سـ. إذا كان $أو = 8$ سم، $اس = 20$ سم، حيث $و \equiv AS$. أثبت أن النقطة S ، و H على استقامة واحدة.

- ١١ ا ب ج مثلث، $D \equiv B J$ ، بحيث $و ج = \frac{2}{3}$ ، $H \equiv A D$ ، بحيث $أو = \frac{5}{7}$ ، رسم $ج H$ يقطع $A B$ في سـ،
رسم $س ص // ج س$ فقطع $A B$ في صـ. أثبت أن $اس = ب ص$.




- ١٢ ا ب ج د مستطيل تقاطع فطراه في مـ. هـ منتصف $A M$ ، و منتصف $M J$. رسم $ه د$ يقطع $A B$ في سـ،
ورسم $و د$ يقطع $B J$ في صـ. أثبت أن $س ص // A J$.

١٥ اكتب ما تساويه كل من النسب التالية مستخدماً الشكل المقابل:



- أ) $\frac{AB}{BC} = \frac{5}{2}$
 ب) $\frac{AB}{BC} = \frac{2}{5}$
 ج) $\frac{AB}{BC} = \frac{5}{3}$
 د) $\frac{AB}{BC} = \frac{3}{5}$
 هـ) $\frac{AB}{BC} = \frac{5}{6}$
 و) $\frac{AB}{BC} = \frac{6}{5}$
 ز) $\frac{AB}{BC} = \frac{2}{3}$

١٦ في كل من الأشكال التالية، احسب قيم س، ص العددية (الأطوال مقدرة بالستيمرات)



في الشكل المقابل:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{m}{n} = \frac{3}{2},$$

$$و \frac{m}{n}, AG // DE // CB$$



أوجد:

- أ) طول m و
 ب) طول n

١٧ أ) $\frac{AB}{BC} = \frac{m}{n}$ «(ها)، س \equiv آب، ص \equiv جد، وكان $BC // DE // AG$

أثبت أن: $AS \times DE = GD \times HC$

١٨ في كل من الأشكال التالية، احسب قيم س، ص العددية:



١٩ أ) $AB // DE$ شكل رباعي فيه $AB // DE$ ، تقاطع قطراء في m ، نصف BC في n .

ورسم $HO // BA$ ، ويلتقط DE في S ، AG في CH ، AO في D .

أثبت أن:

$$1) \quad HO = \frac{1}{2} AB$$


$$2) \quad \frac{AS}{CH} = \frac{BS}{DH}$$

منصف الزاوية والأجزاء المتناسبة

Angle Bisectors and Proportional Parts

سوف تتعلم

عمل تعاوني



- ١- ارسم المثلث $A-B-C$ وارسم أو لينفع $B-C$ في C .
- ٢- قس كلًا من $B-C$ ، $C-A$ ، $A-B$.
- ٣- احسب كل من النسبتين $\frac{B-C}{C-B}$ ، $\frac{A-C}{C-A}$ وقارن بينهما.
ماذا تنتهي؟
- ٤- كرر العمل السابق عدة مرات.
هل يتحقق استنتاجك؟ عبر عن استنتاجك بلغتك.

Bisector of an Angle of a Triangle


منصف زاوية مثلث

المصطلحات الأساسية

• منصف	Bisector
• منصف داخلي	Interior Bisector
• منصف خارجي	Exterior Bisector
• عمودي	Perpendicular

إذا نصفت زاوية رأس مثلث أو زاوية الخارجية للمثلث عند هذا الرأس، وقسم المنصف قاعدة المثلث من الداخل أو الخارج إلى جزأين فإن النسبة بين طوليهما تساوي النسبة بين طولي الضلعين الآخرين

نظريه



المعطيات: $A-B-C$ مثلث، أو ينصف $B-C$ (من الداخل في شكل $ب$ ، من الخارج في شكل $ج$).

$$\text{المطلوب: } \frac{B-D}{D-C} = \frac{B-C}{C-A}$$

البرهان: ارسم $C-E // A-D$ وينفع أو في هـ اتبع المخطط التالي واكتب البرهان.

الأدوات والوسائل


• أدوات هندسية للرسم.
• حاسوب آلى وبرامج رسومية.
• جهاز عرض بيانات.



مثال

- ١) اب ج مثلث فيه اب = ٨ سم، اجد = ٦ سم، ب جد = ٧ سم، رسم \overline{AO} ينصف $\angle B$ اجد ويقطع \overline{JD} في O . اوجد طول كل من BO ، OJ




الحل



$$\begin{aligned} & \because \overline{AO} \text{ ينصف } \angle BAC \quad \therefore \frac{BO}{OJ} = \frac{AB}{AC} \\ & \because AB = 8 \text{ سم، } AC = 6 \text{ سم} \quad \therefore \frac{BO}{OJ} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \\ & \because BO + OJ = 7 \text{ سم} \quad \therefore 7 - OJ = \frac{3}{4}OJ \\ & 3OJ = 28 - 4OJ \quad \therefore OJ = 4 \text{ سم} \\ & \therefore BO = 7 - 4 = 3 \text{ سم} \quad \therefore BO = 3 \text{ سم} \end{aligned}$$

حاول أن تحل


- ١) في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة س العددية (الأطوال مقدرة بالستيمترات)



مثال

- ٢) اب ج مثلث. رسم \overline{AO} ينصف $\angle B$ ، ويقطع $\angle C$ في O ، حيث $AO = 14$ سم، $CJ = 18$ سم. إذا كان محيط $\triangle ABC$ = ٤٠ سم، فأوجد طول كل من: BC ، AC .

الحل



$$\begin{aligned} & \text{في } \triangle ABC \\ & \because \overline{AO} \text{ ينصف } \angle B \quad \therefore \frac{AB}{AC} = \frac{AO}{CJ} \\ & \therefore \frac{AB}{AC} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9} \\ & \therefore \text{محيط } \triangle ABC = 40 \text{ سم، } AB + AC + BC = 40 \text{ سم} \\ & \therefore AB + AC = 40 - BC = 40 - 16 = 24 \text{ سم} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{AB}{BG} = \frac{7}{4}$$

$$\text{و يكون } \frac{BG}{HG} = \frac{16}{9} \quad \therefore BG = 27 \text{ سم} , \quad AB = 21 \text{ سم}$$

حاول أن تحل

- ٢) \overline{AB} جد مثلث قائم الزاوية في ب. رسم \overline{AO} ينصف $\triangle A$, ويقطع \overline{BG} في د. إذا كان طول $\overline{BD} = 24$ سم، بـ $A:AD = 3:5$ فما محيط $\triangle ABD$ جد.

ملاحظة هامة

- ١- في المثلث $\triangle ABD$ حيث $AB \neq AD$:

إذا كان \overline{AO} ينصف $\triangle ABD$,

$\angle AHD$ ينصف الزاوية الخارجية للمثلث عند د.

$$\text{فإن: } \frac{BD}{DG} = \frac{BA}{AH}, \quad \frac{BD}{DG} = \frac{AD}{AH}$$

$$\text{و يكون } \frac{BD}{DG} = \frac{BA}{AH}$$

أي أن \overline{BG} تقسم من الداخل في د ومن الخارج في ه بنسبة واحدة
ويكون المتعاقبين \overline{AO} ، $\angle AHD$ متعادلين . (المذا؟)

- ٢- إذا كان $AB > AD$, قطع منصف $\angle ABD$ في د حيث $BH < HD$ ، أما منصف الزاوية الخارجية
عند A فيقطع \overline{BG} في ه حيث $BH > HD$.

تفكر بالمقدمة

ـ كلما كبر AD ماذا يحدث للنقطة د؟

ـ إذا كان $AD > AB$ ، أين تقع النقطة د؟ وما وضع $\angle AHD$ بالنسبة إلى \overline{BG} عندئذ؟

ـ عندما يصبح $AD > AB$ ما العلاقة بين دـ جـ هـ بـ؟ وأين تقع دـ عندئذ؟ قارن إجابتك مع زملائك.

مثال

- ٢) \overline{AB} جد مثلث فيه $AB = 6$ سم، $AD = 4$ سم، $BG = 5$ سم. رسم \overline{AO} ينصف $\triangle A$ وينقطع \overline{BG} في د،
ورسم $\angle AHD$ ينصف $\angle ABD$ الخارجية وينقطع \overline{BG} في هـ احسب طول دـ هـ.

الدل


$\therefore \overline{AO}$ ينصف $\triangle A$ ، $\angle AHD$ ينصف $\angle ABD$ الخارجية

$\therefore D$ ـ هـ تقسمان \overline{BG} من الداخل ومن الخارج بنفس النسبة.

$$\text{أي أن: } \frac{BD}{DG} = \frac{BA}{AH} = \frac{AB}{AD}$$

$$\therefore \frac{BD}{DG} = \frac{BHD}{HD} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore BD = \frac{3}{2} DG = \frac{3}{2} \times 5 = 7.5 \text{ سم}$$



من خواص النسب نجد

$$\frac{ب \cdot ج}{ي \cdot ج} = \frac{2+2}{2}$$

$$\frac{ب \cdot ه - ه \cdot ج}{ه \cdot ج} = \frac{2-2}{2}$$

$$\text{ويكون } ب \cdot ه = ي \cdot ج + ج \cdot ه = 10 + 2 = 12 \text{ سم}$$

حاول أن تحل

- ٢) اب ج مثلث فيه اب = ٣ سم، ب ج = ٧ سم، ج ا = ٦ سم. رسم آد ينصف $\angle A$ ويقطع $\overline{B\bar{G}}$ في ي، ورسم آه ينصف $\angle A$ الخارجي ويقطع $\overline{B\bar{H}}$ في ه
- أثبت أن آب متوسط في المثلث آج ه
 - أوجد النسبة بين مساحة المثلث آو ه، ومساحة المثلث آج ه
- إيجاد طول المنصف الداخلي والمنصف الخارجي لزاوية رأس مثلث.**

للسريين مشهور
إذا كان آد ينصف $\angle A$ في $\triangle ABC$ من الداخل ويقطع $\overline{B\bar{G}}$ في ي

$$\text{فإن: } AD = AB \cdot AG - BG$$

المعطيات: اب ج مثلث، آد ينصف $\angle B$ من الداخل، آه $\angle C$ ب ج = (آي)

المطلوب: $(AD)^2 = AB \cdot AG - BG \cdot AG$

البرهان: ارسم دائرة تمر برؤوس المثلث اب ج
ونقطع آه في ه، ارسم ب ج


فيكون $\triangle ADG \sim \triangle AHB$ (لماذ؟)، $AD = AH$

$$AD \cdot AH = AB \cdot AG$$

$$(AD)^2 = AB \cdot AG - AD \cdot AG$$

$$(AD)^2 = AB \cdot AG - BG \cdot AG$$


$$\text{أي أن: } AD^2 = AB \cdot AG - BG \cdot AG$$

**لذلك**

$$AD^2 = BG \cdot AG$$

مثال

- ٤) اب ج مثلث فيه اب = ٢٧ سم، اج = ١٥ سم. رسم آد ينصف $\angle A$ ويقطع $\overline{B\bar{G}}$ في ي.
إذا كان ب ي = ١٨ سم احسب طول آه.

**الحل**

$$\therefore AD \text{ ينصف } \angle BAG \quad \therefore BG = AG$$

$$\text{ويكون } \frac{BG}{AG} = \frac{18}{15} \quad \therefore BG = 10 \text{ سم}$$





$$\therefore AD^2 = AB \cdot AG - BG \cdot AG$$

$$\therefore AD^2 = 27 \times 15 - 18 \times 10 = 225 \text{ سم}^2$$

$$\therefore AD = \sqrt{225} = 15 \text{ سم}$$

حاول أن تحل




٤ في كل من الأشكال التالية (الأبعاد مقدرة بالستيمترات) احسب قيمة س وطول \overline{AO}



للحظ آن: في الشكل المقابل: \overline{AO} ينصف $\angle B$ من الخارج
ويقطع \overline{BC} في هـ. فإن: $AH = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}BC = BG$. $\angle B = \angle G$

حاول أن تحل

٥ في كل من الأشكال التالية (الأبعاد مقدرة بالستيمترات) احسب قيمة س، وطول \overline{AO}



في الشكل المقابل: \overline{AO} منوسط في $\triangle ABC$
 \overline{AS} ينصف $\angle AOB$. ويقطع \overline{AB} في س.
 \overline{SC} ينصف $\angle AOC$ ويقطع \overline{AC} في ص.
أثبت آن: $SC = \frac{1}{2}BG$.

الدل

$$(1) \quad \because \overline{AO} \text{ ينصف } \angle AOB \quad \therefore \frac{AO}{OB} = \frac{AS}{SB}$$

$$(2) \quad \because \overline{AO} \text{ منوسط } \angle AOC \quad \therefore \frac{AO}{OC} = \frac{AS}{SC}$$

$$(3) \quad \therefore OB = OC$$

ويبكون $SC = BG$

في $\triangle AOB$: $\because \overline{AO}$ ينصف $\angle AOB$


في $\triangle AOC$: $\because \overline{AO}$ ينصف $\angle AOC$

في $\triangle ABC$: $\because \overline{AO}$ منوسط


من (1)، (2)، (3) $\therefore \frac{AS}{SC} = \frac{AS}{BG}$

حاول أن تحل

٦ في كل من الأشكال التالية أثبت أن $\overline{هـ} \parallel \overline{بـ جـ}$



ب



ج

تفكير منطقي

في الشكل المقابل: $هـ \equiv بـ جـ$.

كيف يمكن رسم $\overline{هـ}$ يقطع $\overline{أـ}$ في هـ لحساب النسبة $\frac{هـ}{بـ} = \frac{هـ}{جـ}$ ؟

إذا كان $\frac{هـ}{بـ} = \frac{هـ}{جـ}$ ماذا تنتهي؟

حالات خاصة

١- في $\triangle ABC$:

إذا كان $هـ \equiv بـ جـ$, حيث $\frac{هـ}{بـ} = \frac{هـ}{جـ}$

فإن: $\overline{أـ}$ ينصف $\angle BAG$

وإذا كان $هـ \equiv بـ جـ$, $هـ \not\equiv بـ جـ$, حيث $\frac{هـ}{بـ} \neq \frac{هـ}{جـ}$

فإن: $\overline{أـ}$ ينصف $\angle BAG$ الخارج عن المثلث ABC

ويعرف هذا بعكس النظرية السابقة.

٢- في الشكل المقابل:

$\overline{بـ هـ}$, $\overline{جـ هـ}$ متصفاً زاويتا B , C

يتقاطعاً في نقطة $H \equiv \overline{أـ}$. ماذا تنتهي؟

حقيقة: متصفات زوايا المثلث تتقاطع في نقطة واحدة.

مثال

٧- A , B , C مثلث فيه $A = 18^\circ$, $B = 15^\circ$, $C = 12^\circ$, $هـ \equiv بـ$, حيث $هـ = 9$ سم.
رسم $\overline{أـ هـ} \perp \overline{أـ جـ}$ فقطع \overline{BAG} في H . أثبت أن $\overline{أـ}$ ينصف $\angle BAG$ أو جـ ثم أوجد طول $\overline{هـ جـ}$.


الدل

في $\triangle ABC$: $\frac{أـ}{جـ} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$

$جـ = بـ$, $بـ = 9 - 15 = 6$ سم

$\therefore \frac{أـ}{جـ} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

$\therefore \frac{أـ}{جـ} = \frac{أـ}{جـ}$



$\therefore \overline{AD} \perp \overline{BC}$ وقطع \overline{BC} في H

$$\text{و يكون } \frac{BH}{CH} = \frac{AB}{AC}$$

$$BH = 20 \text{ سم}$$

$\therefore \overline{AD}$ ينصف $\triangle ABC$ الخارج عن $\triangle ABC$

$$\therefore BH = CH \Rightarrow CH = \frac{10 + 20}{2} = 15 \text{ سم}$$

دائل أن تحل

- ٧) \overline{AB} جد شكل رباعي فيه $AB = 18$ سم، $BC = 12$ سم، $CD = 2$ سم، $AD = 2$ سم $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ حيث $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ رسم $\overline{AD} // \overline{BC}$ قطع \overline{AD} في O . أثبت أن \overline{AD} ينصف $\triangle ABC$.

مثال


- ٨) \overline{AB} قطر في دائرة، \overline{AC} وتر فيها. رسم \overline{AD} مماس للدائرة عند D قطع \overline{AC} في O .

إذا كانت $H \in \overline{AD}$ بحيث $\frac{OH}{DH} = \frac{OC}{CH}$ أثبت أن:

$$(1) \quad \overline{AC} \text{ ينصف الزاوية الخارجية للمثلث } \overline{BCD} \text{ عند } \overline{D}$$

$$(2) \quad \overline{AD} \text{ ينصف } \angle BDC \text{ في } \triangle ABC$$

الحل



(١)

$$\therefore \frac{OC}{CH} = \frac{OD}{DH}$$

$\therefore \overline{OC}$ ينصف $\angle BDC$ في $\triangle BDC$

$\therefore \overline{AB}$ قطر في الدائرة

$$\therefore (\angle ADB) = 90^\circ \quad \text{و يكون } \overline{AD} \perp \overline{BC}$$

$\therefore \overline{AD}$ ينصف $\angle BDC$ في $\triangle ABC$

$\therefore \overline{AD}$ ينصف الزاوية الخارجية عند \overline{D}

$$\text{و يكون } \frac{OA}{DA} = \frac{OC}{CH}$$

(٢)

(منصتا الزاوية متعمدان) (وهو المطلوب أولاً)


من (١)، (٢) ينبع أن: $\frac{OA}{DA} = \frac{OC}{CH} \therefore \frac{OA}{DA} = \frac{OC}{CH}$

(وهو المطلوب ثانياً)

دائل أن تحل

- ٩) دائرتان M ، N متداشان من الخارج في A . رسم مستقيم يوازي \overline{MN} قطع الدائرة M في B ، C ، D ، E ، F ، G ، H على الترتيب. فإذا تقاطع \overline{BM} ، \overline{HN} في النقطة O . أثبت أن \overline{AO} ينصف \overline{MN} ون.

تحقق من فهمك




حل مشكلات: بين الشكل المقابل تقريبا لقطعة أرض مستطيلة الشكل إلى أربعة أقسام مختلفة بالمستقيمين \overline{BD} ، \overline{AC} ، \overline{AE} ، \overline{CD} ، حيث $H \in \overline{BD}$ ، $B \in \overline{AE}$ ، $C \in \overline{AC}$ ، $D \in \overline{CD}$.

فإذا كان $AB = BD = 42$ مترا، $AO = 56$ مترا.

احسب مساحة القطعة AB س بالأمتار المربعة و طول AS

تمارين ٣ - ٢






١ في الشكل المقابل: \overline{AO} ينصف $\triangle A$. أكمل:


$$\text{أ} = \frac{1}{2} \times \text{ب}$$

$$\text{ج} = \frac{1}{2} \times \text{ب}$$

٢ في كل من الأشكال التالية، أوجد قيمة س (الأطوال مقدمة بالستيمترات)



٣






٤

٥ أ ب ج مثلث محيطه ٢٧ سم، رسم ب ج ينصف $\triangle B$ ويقطع \overline{AC} في د.

إذا كان أ د = ٨ سم، ج د = ٦ سم، أ ج = ٩ سم، أ د = ٥ سم، أ ج = ٧ سم، أ ب = ١٠ سم.


٦ في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة س، ثم أوجد محيط $\triangle ABC$




٧ أ ب ج مثلث فيه أ ب = ٨ سم، أ ج = ٤ سم، ب ج = ٦ سم، رسم أ د ينصف $\triangle A$ ويقطع \overline{BC} في د.

ورسم أ ه ينصف $\triangle A$ الخارجية ويقطع \overline{BC} في هـ. أوجد طول كل من د هـ، أ د، أ هـ.

٦ في كل من الأشكال التالية، أثبت أن $\overline{SC} \parallel \overline{B_1C}$




(أ)




(ب)

٧ في كل من الأشكال التالية، أثبت أن \overline{BH} ينصف $\triangle ABC$



(أ)




(ب)


٨ في الشكل المقابل: $\overline{HO} \parallel \overline{SC} \parallel \overline{B_1C}$

$$AO \times BC = AG \times HS$$

أثبت أن \overline{AC} ينصف $\triangle AGO$.



٩ أ ب ج مثلث و $\overline{B_1C} \parallel \overline{B_2C}$ و $\overline{B_1C} \parallel \overline{B_3C}$ حيث $B_1 = A$ ، $B_2 = B$ ، $B_3 = C$. رسم $\overline{CH_1} \parallel \overline{AB}$ و يقطع $\overline{A_1B_1}$ في H_1 و $\overline{CH_2} \parallel \overline{AB}$ و يقطع $\overline{A_2B_2}$ في H_2 و $\overline{CH_3} \parallel \overline{AB}$ و يقطع $\overline{A_3B_3}$ في H_3 و على الترتيب.



في الشكل المقابل: أ ب ج مثلث فيه أ ب = 6 سم، أ ج = 9 سم،

$$B_1C = 10 \text{ سم. } B_1 \parallel B_2 \parallel B_3 \text{ بحيث } B_1 = A, B_2 = B, B_3 = C.$$

رسم $\overline{CH_1} \parallel \overline{AB}$ و يقطع $\overline{A_1B_1}$ في H_1 ، A_1 في C ، وعلى الترتيب.

أثبت أن $\overline{AH_1}$ ينصف $\triangle A_1B_1C$.

أ) أوجد م($\triangle A_1B_1C$) : م($\triangle A_1B_1H_1$)

تطبيقات النسب في الدائرة

٣ - ٣

Applications of Proportionality in the Circle


رسوف تتعلم

- إيجاد قوة نقطة بالنسبة لدائرة.
- تحديد موقع نقطة بالنسبة لدائرة.
- إيجاد نسبات الزوايا الناتجة من تقاطع الأقواء والزوايا في الدائرة.
- تحلية وحل تطبيقات تشمل إيجاد طول المصف الداخلي والمخارجي لزاوية.

فكرة عقليّة

كيف يمكن إنشاء قطعة مستقيمة يكون طولها ل وسعلاً متناسبًا بين طولين س، ص لقطعتين معلومتين؟

في كل من الشكلين التاليين $أب = س$ ، $أج = ص$ ، $أي = ل$



$$\therefore \triangle AOB \sim \triangle AJI \text{ (الماذورة)} \quad \therefore \frac{أي}{أب} = \frac{أي}{أج}$$

ويكون $\frac{أي}{أب} = \frac{l}{s}$ ، $ل = س \cdot ص$ أي أن ل وسط متناسب بين س، ص

المصطلحات الأساسية

Power of a point	نسبة نقطة
Circle	دائرة
Chord	وتر
Tangent	لمس
Secant	تقاطع
Diameter	نطرين
Concentric Circles	دوائر متحدة المركز

Common External Tangent	لمسان خارجي مشترك
Common Internal Tangent	لمسان داخلي مشترك

Power of a point


أولاً: قوة نقطة بالنسبة لدائرة

تعريف

قوة النقطة أ بالنسبة لدائرة م التي طول نصف قطرها س هو العدد الحقيقي $و = (أ) - (م)$ حيث: $و > 0$ ، $و < 0$ ، $و = 0$

الأدوات والوسائل

- أدوات هندسية للرسم والقياس



ملاحظات هامة

ملاحظة ١

يمكن التبؤ بموقع نقطة أ بالنسبة لدائرة م
فإذا كان: $و < 0$. فإن أقع خارج الدائرة.
 $و = 0$. فإن أقع على الدائرة.
 $و > 0$. فإن أقع داخل الدائرة.

- ١) حدد موقع كل من النقط A, B, C بالنسبة للدائرة M التي طول نصف قطرها 3 سم إذا كان:
 $C = 11^\circ$, $B = \text{صفر}$, $C = 16^\circ$, ثم احسب بعد كل نقطة عن مركز الدائرة.

الحل

$$\begin{aligned} & \because C = 11^\circ \therefore A \text{ تقع خارج الدائرة} \\ & \because C = (A)^\circ - 180^\circ \quad 180^\circ = (A)^\circ - 11^\circ \\ & \therefore B = \text{صفر} \quad \therefore B \text{ تقع على الدائرة} \\ & \therefore C = 16^\circ \quad \therefore D \text{ تقع داخل الدائرة} \\ & \therefore C = (D)^\circ - 180^\circ \quad 180^\circ = (D)^\circ - 16^\circ \end{aligned}$$

حاول أن تحل

- ١) حدد موقع كل من النقط A, B, C بالنسبة للدائرة N التي طول نصف قطرها 2 سم , ثم احسب بعد كل نقطة عن مركز الدائرة في كل من الحالات الآتية:


$$A: C = 15^\circ \quad B: C = \text{صفر} \quad C: C = 4^\circ$$

ملاحظة



$$\begin{aligned} & \text{إذا وقعت النقطة } A \text{ خارج الدائرة } M \text{ فإن: } C = (A)^\circ - 180^\circ \\ & = (A)^\circ - (C + 3^\circ) \\ & = A^\circ - 11^\circ - 3^\circ \\ & \therefore \text{طول المماس المرسوم من النقطة } A \text{ للدائرة } M = C = (A)^\circ - 180^\circ - 3^\circ \end{aligned}$$

ملاحظة ٢



$$\begin{aligned} & \text{إذا وقعت النقطة } B \text{ داخل الدائرة } M \text{ فإن: } C = (A)^\circ - 180^\circ \\ & = (A)^\circ - (C + 3^\circ) \\ & = (C - A)^\circ - 3^\circ \\ & \therefore A^\circ - 16^\circ - 3^\circ \end{aligned}$$

وصفة عامة

أ) داخل الدائرة

$$C = (A)^\circ - A^\circ \times A^\circ - A^\circ / A^\circ$$

ب) خارج الدائرة

$$C = A^\circ \times A^\circ - A^\circ / A^\circ = (A)^\circ - 180^\circ - 3^\circ$$

مثال

الدائرة م طول نصف قطرها ٣١ سم، النقطة A تبعد عن مركزها ٢٢ سم، رسم الوتر $\overline{B\bar{C}}$ حيث $A \in \overline{B\bar{C}}$


أ ب = ٣ أ ج احـبـ

(١) بعد الوتر $\overline{B\bar{C}}$ عن مركز الدائرة

(٢) طول الوتر $\overline{B\bar{C}}$

الحل

في الدائرة M



(١) $OB = 31 \text{ سم}, OM = 22 \text{ سم}, A \in \overline{B\bar{C}} \therefore A$ تقع داخل الدائرة ويكون

$$\text{في } (A) = (A)^* - \text{من} = -AB = AJ$$

$$(22)^2 - (31)^2 = -AJ \times AJ \therefore AJ = 12 \text{ سم}$$

، طول الوتر $\overline{B\bar{C}} = 4 AJ = 4 \times 12 = 48 \text{ سم}$

(٢) بفرض أن بعد الوتر عن مركز الدائرة = م و حيث $M \perp \overline{B\bar{C}}$

$\therefore M \perp \overline{B\bar{C}}$ و متصف $\overline{B\bar{C}}$ ويكون $B \in M = 44 \text{ سم}$

$$\therefore OM^2 = OB^2 - (31)^2 = 48^2 = 3856 \text{ سم}^2$$

حلول آنـ تحلـ

الدائرة N طول نصف قطرها ٨ سم، النقطة B تبعد ١٢ سم عن مركز الدائرة، رسم مستقيم يمر بالنقطة B وينقطع الدائرة في نقطتين جـ وـ دـ، حيث جـ دـ بـ جـ دـ احـبـ طول الوتر $\overline{J\bar{D}}$ وبعده عن النقطة N.

مثال

الدائرةان M، N متقاطعتان في A، B، جـ $\equiv \overline{B\bar{A}}$ ، جـ دـ قطـ $\overline{B\bar{A}}$ ، رسم جـ دـ فـنـقطع الدائرة M في دـ، هـ حيث جـ دـ = ٩ سم، دـ هـ = ٧ سم، ورسم جـ دـ ويسـ الدائرة N عندـ.

(١) أثبتـ أنـ $C_i(G) = C_r(G)$. (٢) إذا كان $AB = 10 \text{ سم}$. أوجد طول كلـ من \overline{AD} ، \overline{GD} .

الحل

(١) جـ تقع خارج الدائرة M، جـ هـ قاطـ $\overline{B\bar{A}}$ فـ مـقـعـانـ للدائرة M.

$$\therefore C_i(G) = C_r(G) \times C_h = GA \times GB \quad (١)$$

ـ جـ تقع خارج الدائرة N، جـ دـ قاطـ $\overline{B\bar{A}}$ جـ دـ عـمـاسـ لهاـ.

$$\therefore C_r(G) = GD \times GB = (GD)^2 \quad (٢)$$

$$\text{من (١)، (٢)} \therefore C_i(G) = C_r(G) = GD = 9 \times 7 = 63 \text{ سم}$$

(٢) $AB = 10 \text{ سم} \therefore C_i(G) = GA (GA + 10) = (GD)^2 = 144$

$$\therefore (GA)^2 + 10 \cdot GA = 144 \therefore GA = 8 \text{ سم}$$

$$\therefore GD = 12 \text{ سم} \therefore (GD)^2 = 144$$

الملاحظة هامة

تسمى مجموعة النقاط التي لها نفس النسبة بالنسبة لدائرتين مختلفتين بالمحور الأساس للدائرتين.

فأذا كان في (١) = **فإن** أتقع على المحور الأساس للدائرتين م، ن.

في المثال السابق لاحظ أن: فـ (ج) = فـ (ج)، فـ (ا) = فـ (ا) = صفرًا، فـ (ب) = فـ (ب) = صفرًا

∴ **آب** محور أساس للدائرتين م، ن.

دليل أو تحليل

الدائرتان م، ن متضادتان من الخارج في آ، آب عباس مشترك للدائرتين م، ن، بـ جـ يقطع الدائرة م في جـ جـ، بـ هـ يقطع الدائرة ن في هـ، وعلى الترتيب:

١ أثبت أن: **آب** محور أساس للدائرتين م، ن

٢ إذا كان فـ (ب) = ٣٦، بـ جـ = ٤٣م، هـ = ٩٣م، أوجد طول كل من جـ جـ، آب، بـ هـ.

ثانية: القاطع والمماس وقياسات الزوايا

سبق ودرست:

١- إذا تقاطع قاطعان داخل دائرة فإن قياس زاوية تقاطعهما يساوي نصف مجموع قياسي القوس المقابل لهذة الزاوية والقوس المقابل للزاوية التي تقابلاها بالرأس.

في الشكل المقابل: **آب** ∩ **جـ جـ** = (هـ)

فإن فـ (**آهـ جـ**) = $\frac{1}{2}$ [فـ (**اجـ**) + فـ (**وبـ**)]




٢- إذا تقاطع قاطعان خارج دائرة فإن قياس زاوية تقاطعهما يساوي نصف الفرق الموجب بين قياسي التوسيعين المقابلين لها.

في الشكل المقابل: **آب** ∩ **جـ جـ** = (هـ)

فإن فـ (**آهـ جـ**) = $\frac{1}{2}$ [فـ (**اجـ**) - فـ (**وبـ**)]

دليل أو تحليل

١ في كل من الأشكال الآتية: أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس.



الأنسaf بيرنستيج هاريس


استنتاج قياس الزاوية الناتجة من تقاطع قاطع وعماس (أو مماسين) لدائرة.

القاطع والمماس (أو المماسان) لدائرة المتلقيان خارج الدائرة، يكون قياس زاوية تقاطعهما متساوياً نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المقابلين لها.


لتدرين
مشهور

البرهان

الحالة الأولى: تقاطع القاطع والمماس لدائرة.



الحالة الثانية: تقاطع القاطع والمماس لدائرة.



$$\begin{aligned} & \because \angle \text{ وجب خارجة عن } \triangle A B G \\ & \therefore \varphi(\angle A) = \varphi(\angle B) - \varphi(\angle G) \\ & = \frac{1}{2} \varphi(BS\text{ جد}) - \frac{1}{2} \varphi(B\text{ جد}) \\ & = \frac{1}{2} [\varphi(BS\text{ جد}) - \varphi(B\text{ جد})] \end{aligned}$$

$$\therefore \angle \text{ وجب خارجة عن } \triangle A B G$$




$$\therefore \varphi(\angle A) = \varphi(\angle B) - \varphi(\angle G)$$

$$= \frac{1}{2} \varphi(BS\text{ جد}) - \frac{1}{2} \varphi(B\text{ جد})$$

$$= \frac{1}{2} [\varphi(BS\text{ جد}) - \varphi(B\text{ جد})]$$

داخل أن تحل

٥ متعيناً بمعطيات الشكل، أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس.




مثال

٤ **الربط بالأقمار الصناعية:** يدور قمر صناعي في مدار، محاافطاً في أثناء دورانه على ارتفاع ثابت فوق منطقة خط الاستواء، وتسلق آلة التصوير به رصد قوس طوله ٦٠١١ كم على سطح الأرض. إذا كان قياس هذا القوس 54° . فأوجد:

- ١ قياس زاوية آلة التصوير الموضعة على القمر الصناعي.
- ٢ ملول نصف قطر الأرض عند دائرة خط الاستواء.

الحل



نتذكرة المشكلة: باعتبار الدائرة م هي دائرة خط الاستواء يكون
في $\widehat{B\text{---}M\text{---}A} = 44^\circ$ ، وطول $\widehat{B\text{---}M} = 6011$ كم.

$$\text{أ} \therefore \text{قياس الدائرة} = 360^\circ$$

$$\therefore \text{في } \widehat{B\text{---}M\text{---}A} = 360^\circ - 54^\circ = 306^\circ$$

$$\text{ويكون في } \triangle A = \frac{1}{2}(\text{في } \widehat{B\text{---}M\text{---}A} - \text{في } \widehat{B\text{---}M})$$

$$= \frac{1}{2}(306^\circ - 54^\circ) = 126^\circ$$

ب في الدائرة يتاسب طول القوس مع قياسه

$$\therefore \text{مع} = \frac{126^\circ}{360^\circ} \times 6377,87 \text{ كم}$$

$$\therefore \text{طول نصف قطر الأرض عند خط الاستواء} = 6378 \text{ كم.}$$

لذكر

متوسط القوس . قياس الزاوية .
محيط دائرة . لغز دائرة


حلول آن تحل

٦ تدور بكرة عملاقة حول محور م بواسطة سير يمر على بكرة صغيرة عند أ.
إذا كان قياس الزاوية بين جزئي السير 40° . فأوجد طول $\widehat{B\text{---}M}$
الكبير، علما بأن طول نصف قطر الكرة الكبيرة ٩ سم.


٧ في الشكل المقابل: دائرة م طول نصف قطرها ٩ سم، \overline{AB} ، \overline{AC}
مسان للدائرة عند ب، \overline{AM} يقطع الدائرة في د، $\overline{B\text{---}M}$ في س
رسم بـ فقطع \overline{AC} في ه، إذا كان في $\triangle A = 144$ ، أوجد:

$$\text{أ طول } \overline{AB}$$

$$\text{ب طول } \overline{AS}.$$



٤ تحقق من فهمك



حل مشكلات: بين الشكل المقابل مختلفاً لحديقة على شكل دائرة. أثرين مترین للمشاة أحدهما خارج الحديقة يمسها في النقطة ب والأخر يقطع الحديقة في نقطتي د، ه ويتقاطع المساران عند أ.

إذا كان في $\triangle A = 100^\circ$ ، $\text{أ جد} = 5$ أمتار.

أوجد طول كل من \overline{AB} ، \overline{GD} ، ثم أوجد في $\triangle BH$.


تمارين ٣-٣


١) حدد موقع كل من النقطة التالية بالنسبة إلى الدائرة M ، والتي طول نصف قطرها 10 سم، ثم احسب بعد كل نقطة عن مركز الدائرة.

أ) Q ، ب) R ، ج) صفر

أ) Q ، ب) R

أ) Q ، ب) R

٢) أوجد قوّة النقطة المعطاة بالنسبة إلى الدائرة M ، والتي طول نصف قطرها 10 :

أ) النقطة A حيث $AM = 12$ سم، ب) $AM = 9$ سم

ب) النقطة B حيث $BM = 8$ سم، ب) $BM = 15$ سم

ج) النقطة C حيث $CM = 7$ سم، ب) $CM = 7$ سم

د) النقطة D حيث $DM = 27$ سم، ب) $DM = 4$ سم

٣) إذا كان بعد نقطة عن مركز دائرة يساوى 25 سم وقوّة هذه النقطة بالنسبة إلى الدائرة يساوى 400 .
أوجد طول نصف قطر هذه الدائرة.

٤) الدائرة M طول نصف قطرها 20 سم. نقطـة تبعد عن مركز الدائرة مسافة 16 سم، رسم الوتر \overline{PQ}
حيث $AP = PB$ ، أ) طول الوتر PQ ، ب) إحسب طول الوتر PQ .


٥) في الشكل المقابل: الدائريان M ، N متقاطعان في A ، B

حيث $AB \cap MN = H$ ، $AN = 25$ سم، $BN = 10$ سم،
ف) $(AB) = 144$.






أ) أثبت أن AB محور أساسى للدائرةين M ، N .


ب) أوجد طول كل من MN ، AB و

ج) أثبت أن الشكل HED رباعي دائري.




٦ مستعيناً بمعطيات الشكل، أوجد قيمة الرمز المستخدم في القياس.






- ٧ في الشكل المقابل: في $\angle A = 94^\circ$ ، وفي $\angle C = 100^\circ$ ، وفي $\angle B = 22^\circ$ ، وفي $\angle D = 70^\circ$.
أوجد قياس كل من:
- ١ \widehat{AC}
 - ٢ \widehat{BD}
 - ٣ $\angle BHD$



- ٨ **الربط مع المثلثات:** منشار دائري لقطع الخشب طول نصف قطر دائرته ١٠ سم يدور داخل حافظة حماية، فإذا كان في $\angle A = 45^\circ$ ، وفي $\angle B = 105^\circ$ ، أوجد طول قوس قرص المنشار خارج حافظة الحماية.



- ٩ **اتصالات:** تبع الإشارات التي تصدر عن برج الاتصالات في مسارها شعاعاً، نقطة بدايته على قمة البرج، ويكون مماساً لسطح الأرض، كما في الشكل المقابل. حدد قياس القوس المحصور بالمسارين بفرض أن البرج يقع على مستوى سطح البحر، في $\angle JAB = 80^\circ$.


معلومات إثرائية @

قم بزيارة المواقع الآتية:



ملخص الوحدة

نظرة ١: إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث ويقطع الضلعين الآخرين فإنه يقسمها إلى قطع متناسبة.



نتيجة: إذا رسم مستقيم خارج مثلث ABC وج يوازي ضلعين من أضلاع المثلث ولتكن $BC \parallel DE$ وينقطع AB ، AC في D ، E على الترتيب (كما في الشكل)

$$\text{فإن: } \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} > \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

عكس نظرية ١: إذا قطع مستقيم ضلعين من أضلاع مثلث، وقسمهما إلى قطع أطوالها متناسبة فإنه يوازي الضلع الثالث.

نظرية تاليس العامة (Talis Theorem): إذا قطع مستقيمان عدّة مستقيمات متوازية، فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين تكون متناسبة مع أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر.


حالات خاصة

١- إذا تناصف المستقيمان m, m' في النقطة O وكان: $BC \parallel DE$ ، فإن: $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DC}$
وبالعكس: إذا كان: $\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DC}$ فإن: $BC \parallel DE$

٢- إذا كان $L, L' \parallel L, L' \parallel L$ ،
وقطعا المستقيمان m, m' وكان: $AB = BC = CD$
فإن: $AB = BC = CD = DA$

نظرية ٣ منصف زاوية مثلث (Triangle-Angle-Bisector Theorem): إذا نصفت زاوية رأس مثلث أو الزاوية الخارجية للثلث عند هذا الرأس، قسم المنصف قاعدة المثلث من الداخل أو الخارج إلى جزأين النسبة بين طوليهما تساوي النسبة بين طولى الضلعين الآخرين

ملاحظة هامة: في الشكل المقابل



١- BC تقسم من الداخل في D ومن الخارج في H بنسبة واحدة
فيكون $\frac{BD}{DC} = \frac{BH}{CH}$


٢- المنصف الداخلي والمنصف الخارجي لزاوية في مثلث متعامدان: أي أن: $AO \perp AD$

٣- إذا كان $AB < AC$ قطع منصف $\angle A$ الضلع BC في D ، حيث $B < D < C$ ، أما منصف الزاوية الخارجية عند A فيقطع BC في H ، حيث $B < H < C$.

$$4- AD = \sqrt{AB \cdot AC - BC^2}$$

$$5- AH = \sqrt{AB \cdot AC + BC^2}$$

ملخص الوحدة



حالات خاصة لعكس نظرية (٣)

١- في $\triangle ABC$:

إذا كان $p = q$ حيث $p + q = AB$
فإن: $\angle A$ ينصف $\angle BAC$

وإذا كان $p = q$, $p \neq B$, حيث $p = q = \frac{1}{2}AB$
فإن: $\angle A$ ينصف $\angle BAC$ الخارجة عن المثلث ABC

٢- حقيقة: منصقات زوايا المثلث تلتقي في نقطة واحدة.

أولاً: قوة نقطة بالنسبة للدائرة Power of a point

قوة النقطة P بالنسبة للدائرة M التي طول نصف قطرها r هو العدد الحقيقي c , حيث:

$c = (PM)^2 - r^2$

فإذا كان $c < 0$, فإن P تقع خارج الدائرة M

$c = 0$, P تقع على الدائرة M



$c > 0$, P تقع داخل الدائرة M

ثانياً: القاطع والمماس وقياسات الزاوية.

١- قياس الزاوية الناتجة من تقاطع قاطعين داخل دائرة:

b) خارج الدائرة:

١) داخل الدائرة





$$\text{فـ } (\angle ACD) = \frac{1}{2} [\text{فـ } (\widehat{AC}) + \text{فـ } (\widehat{BD})]$$

$$\text{فـ } (\angle ACD) = \frac{1}{2} [\text{فـ } (\widehat{AC}) + \text{فـ } (\widehat{DB})]$$

٢- قياس الزاوية الناتجة من تقاطع قاطع ومماس للدائرة

$$\text{فـ } (\angle A) = \frac{1}{2} [\text{فـ } (\widehat{BD}) - \text{فـ } (\widehat{BC})]$$



٣- قياس الزاوية الناتجة من تقاطع مماسين لدائرة.

$$\text{فـ } (\angle A) = \frac{1}{2} [\text{فـ } (\widehat{BSC}) - \text{فـ } (\widehat{BC})]$$

الوحدة



حساب المثلثات

Trigonometry

أهداف الوحدة

في نهاية الوحدة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يُعرف الزوايا المستبة ($180^\circ \pm \theta$, $360^\circ \pm \theta$).
- يُعرف الوضع القياسي للزاوية الموجة.
- يُعرف القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجة.
- يُعطي الحل العام للمعادلات المثلثية على الصورة:
- يُعرف نوع قياس الزوايا بالتقديرتين (الستيني والدائرى).
- يُعرف القياس الدائري للزاوية المركزية في دائرة.
- يستخدم الآلة الحاسبة في إجراء العمليات الحسابية الخاصة بالتحويل من القياس الدائري إلى القياس الستيني والعكس.
- يُعرف الدوال المثلثية.
- يحدد إشارات الدوال المثلثية في الأرباع الأربع.
- يُعرف أن مجموعة زوايا المكافئة لها نفس الدوال المثلثية.
- يُعرف النسب المثلثية للزاوية الحادة ولأى زاوية.
- يستخرج النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة.
- يستخدم الآلة الحاسبة في حساب المثلثات.
- يستخدم تكنولوجيا المعلومات في التعرف على التطبيقات المتعددة للمقاييس الأساسية لحساب المثلثات.

المصطلحات الأساسية

Secant	لابتع	\Rightarrow	دالة مثلثية	\Rightarrow	قياس موجب	\Rightarrow	قياس ستيني
Cotangent	ظل تمام	\Rightarrow	Trigonometric Function	\Rightarrow	Positive Measure	\Rightarrow	قياس دائري
Circular Function	دالة دائرية	\Rightarrow	Sine	\Rightarrow	قياس سالب	\Rightarrow	زاوية موجبة
Related Angles	الزوايا المستبة	\Rightarrow	Cosine	\Rightarrow	Negative Measure	\Rightarrow	زاوية نصف نظرية (إنadian)
		\Rightarrow	Tangent	\Rightarrow	زاوية مكافئة	\Rightarrow	Radian
		\Rightarrow	Cosecant	\Rightarrow	زاوية ربعية	\Rightarrow	وضع قياس
		\Rightarrow		\Rightarrow	Quadrant Angle	\Rightarrow	Standard Position

دروس الوحدة


- الدرس (٤ - ١): الزاوية الموجة.
- الدرس (٤ - ٢): القياس السيني والقياس الدائري لزاوية.
- الدرس (٤ - ٣): الدوال المثلثية.
- الدرس (٤ - ٤): الزوايا المنسنة.
- الدرس (٤ - ٥): التمثيل البياني للدوال المثلثية.
- الدرس (٤ - ٦): إيجاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبها المثلثية.

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية - ورق مربعات - حاسب آلي -
- برنامج رسم بياني

خطط تدريس الوحدة

حساب المثلثات



لذاته الأريادية

حساب المثلثات هو أحد فروع علم الرياضيات، فهو يختص بالحسابات الخاصة بين قياسات زوايا المثلث وأطوال أضلاعه. وقد نشأ هذا العلم من الرياضيات القديمة خصوصا فيما يتعلق بحسابات علم الفلك التي اهتم بها الإنسان القديم لما يتأمله ويشاهده في الكون من حركة الشمس والقمر والنجوم والكواكب.

وينعد الرياضي العربي نعير الدين الطوسي هو أول من فصل حساب المثلثات عن الفلك.

وكان لحساب المثلثات نصيه من اهتمامات العرب، ويدرك أن اصطلاح (الظل) قد وصف العالم العربي أبو الوفا البوزجاني (٩٠٨ - ٩٤٠م) في القرن العاشر الميلادي، وهذا الاصطلاح مأخوذ من ظلال الأجسام التي تكون نتيجة سير الضوء المنبعث من الشمس في خطوط مستقيمة.


كما أن للعرب إضافات عديدة في حساب المثلثات المستوى والكروري (السبة إلى سطح الكرة) وعنهما أخذ الغربيون المعلومات المهمة، وأضافوا إليها أيضا الكثير حتى أصبح حساب المثلثات منظماً العديد من الأبحاث الرياضية، وأصبح تطبيقاته في شتى المعارف العلمية والعملية، وساهم في دفع عجلة التقدم والازدهار.

المثلثات المستوى والكروري (السبة إلى سطح الكرة) وعنهما أخذ الغربيون المعلومات المهمة، وأضافوا إليها أيضا الكثير حتى أصبح حساب المثلثات منظماً العديد من الأبحاث الرياضية، وأصبح تطبيقاته في شتى المعارف العلمية والعملية، وساهم في دفع عجلة التقدم والازدهار.

الزاوية الموجهة

Directed Angle

سوف نتعلم



سيق لك أن تعرفت على أن الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نقطة بداية واحدة. في الشكل المرسوم تسمى النقطة بـ «رأس الزاوية». والشعاعان \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC} يسميان **ضلوعي الزاوية**. أي أن: $\overrightarrow{AB} \cup \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AB}) \cup (\overrightarrow{AC})$ ونكتب كذلك $\overrightarrow{AB} \cup \overrightarrow{AC}$.

- مفهوم الزاوية الموجهة.
- الوضع القياسي للزاوية الموجهة.
- القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة.
- موقع الزاوية الموجهة في المربع الستوي.
- مفهوم الزاوية المكافئة.

Degree Measure System

القياس الستيني للزاوية

علمت أن القياس الستيني يعتمد على تقسيم الدائرة إلى ٣٦٠ قوساً متساوياً في الطول. وبالتالي فإن:

المصطلحات الأساسية

- ١- الزاوية المركزية التي ضلعاها يمتدان بيهما من أحد هذه الأقواس تكون قياسها درجة واحدة (1°)
 - ٢- تقسيم الدرجة إلى ٦٠ جزءاً، كل منها يسمى دقيقة، وترمز له بالرمز ($'$)
 - ٣- تقسيم الدقيقة إلى ٦٠ جزءاً، كل منها يسمى ثانية، وترمز له بالرمز ($''$)
- أي أن: $1^\circ = 60' = 3600''$

Degree Measure	قياس ستيني
Directed angle	زاوية موجهة
Standard Position	وضع قياسي
Positive measure	قياس موجب
Negative measure	قياس سالب
Equivalent Angle	زاوية مكافئة
Quadrantal Angle	زاوية زاوية

Directed Angle

الزاوية الموجهة



إذا رأينا ترتيب الشعاعين المكونين للزاوية فإنه يمكن كتابتها على شكل الزوج المترتب ($\overrightarrow{OA} \cup \overrightarrow{OB}$) حيث المنصر الأول \overrightarrow{OA} هو الضلع الابتدائي للزاوية، المنصر الثاني \overrightarrow{OB} هو الضلع النهائي للزاوية التي رأسها نقطة O كما بالشكل (١).

الأدوات والوسائل

- آلة حاسمة علمية.



أما إذا كان الضلع الابتدائي \overrightarrow{OB} ، الضلع النهائي \overrightarrow{OA} فنكتب عندهما ($\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}$) كما في شكل (٢).

تعريف الزاوية الموجة هي زوج مترتب من شعاعين هما يضلعاً الزاوية، لهما نقطة بداية واحدة هي رأس الزاوية.


تفكير ناقد

هل $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = (\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA})$? فسر إجابتك.


Standard position of the directed angle**الوضع القياسي للزاوية الموجة**

تكون الزاوية في وضع قياسي إذا كان رأس هذه الزاوية هو نقطته الأصل في نظام إحداثي متعامد، وضلعها الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات.


هل \overrightarrow{OA} أو \overrightarrow{OB} الموجة في الوضع القياسي؟ فسر إجابتك.

**تعمير شفهي**

أيٌّ من الأزواج المترتبة التالية يعبر عن زاوية موجة في وضعها القياسي؟ فسر إجابتك.

**داول أنا نحل**

أي الزوايا الموجة التالية في وضعها القياسي؟ فسر إجابتك.



القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجبة:

Positive and negative measures of a directed angle


في شكل (١) يكون قياس الزاوية الموجبة موجباً إذا كان الاتجاه من الفرع الابتدائي \overrightarrow{OA} إلى الفرع النهائي \overrightarrow{OB} ، في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

في شكل (٢) يكون قياس الزاوية الموجبة سالباً إذا كان الاتجاه من الفرع الابتدائي \overrightarrow{OA} إلى الفرع النهائي \overrightarrow{OB} ، هو نفس اتجاه حركة عقارب الساعة.



مثال

١ أوجد قياس الزاوية الموجبة θ المشار إليها في كل شكل من الأشكال الآتية:



الحل

نعلم أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي 360°



$$1 \quad \theta = 360^\circ - 227^\circ = 133^\circ$$

$$2 \quad \theta = 360^\circ - 125^\circ = 225^\circ$$

$$3 \quad \theta = 360^\circ - 120^\circ = 240^\circ$$


دأول آن تحل

٢ أوجد قياس الزاوية الموجبة θ المشار إليها في كل شكل من الأشكال الآتية:




موقع الزاوية في المستوى الإحداثي المتعامد: Angle's position in the orthogonal coordinate plane

يقسم المستوى الإحداثي المتعامد إلى أربعة أرباع كما في الشكل المقابل.



﴿إذا كانت Δ و θ الموجة في الوضع القبابي والتي قياسها الموجب هو (θ) فإن قطعها النهائي ω يمكن أن يقع في أحد الأرباع:



﴿إذا وقع القطع النهائي ω على أحد محوري الإحداثيات تسمى الزاوية في هذه الحالة **بالزاوية الرباعية** (Quadrantal angle)، فتكون الزوايا التي قياساتها $-{}^{\circ}90, {}^{\circ}90, {}^{\circ}180, {}^{\circ}270, {}^{\circ}360$ هي زوايا رباعية.

مثال

٢ عين الربع الذي تقع فيه كل من الزوايا التي قياساتها كالتالي :

- أ ${}^{\circ}48$ ب ${}^{\circ}217$ ج ${}^{\circ}125$ د ${}^{\circ}295$ ه ${}^{\circ}270$

الحل

فهي تقع في الربع الأول.

أ ${}^{\circ}48 > {}^{\circ}90 > {}^{\circ}$

فهي تقع في الربع الثالث.

ب ${}^{\circ}217 > {}^{\circ}270 > {}^{\circ}$

فهي تقع في الربع الثاني.

ج ${}^{\circ}125 > {}^{\circ}90 > {}^{\circ}$

فهي تقع في الربع الرابع.

د ${}^{\circ}270 > {}^{\circ}295 > {}^{\circ}$

ه ${}^{\circ}270$ زاوية رباعية.

دليل آن تدل


٣ عين الربع الذي تقع فيه كل من الزوايا التي قياساتها كالتالي :

- أ ${}^{\circ}88$ ب ${}^{\circ}152$ ج ${}^{\circ}180$ د ${}^{\circ}300$ ه ${}^{\circ}196$

ملاحظة:

﴿إذا كان (θ) هو القياس الموجب لزاوية موجبة فإن القياس السالب لها يساوي $(\theta - 360)$ ﴾

﴿وإذا كان $(-\theta)$ هو القياس السالب لزاوية موجبة فإن القياس الموجب لها يساوي $(-360 + \theta)$ ﴾



مثال

٢ عين القياس السالب لزاوية قياسها 275° .

الحل

القياس السالب للزاوية $(275^\circ) = 360^\circ - 275^\circ = 85^\circ$

التحقق: $|85^\circ| + |275^\circ| = 360^\circ$

مجموع الثمانية المطلقة لكل من
القياسين الموجب والسالب
للزاوية الموجهة يساوى 360° .

حاول أن تحل

٤ عين القياس السالب للزوايا التي قياساتها كالتالي:

315° ٣

210° ٤

270° ٥

322° ٦

مثال

٤ عين القياس الموجب للزاوية -225° .

الحل

القياس الموجب للزاوية $(-225^\circ) = 360^\circ - 225^\circ = 135^\circ$

التحقق: $|135^\circ| + |-225^\circ| = 360^\circ$

حاول أن تحل

٥ عين القياس الموجب لكل زاوية من الزوايا الآتية:

340° ٣

90° ٤


126° ٥

52° ٦


٦ **الربط بالألفاظ الرياضية**: يدور أحد لاعبي الترس بزاوية قياسها 150° . ارسم هذه الزاوية في الوضع القياسي.

الزوايا المتكافئة


تأمل الأشكال الآتية وحدد الزاوية الموجهة (θ) في الوضع القياسي لكل شكل. ماذا تلاحظ؟




شكل (١)



شكل (٢)



شكل (٣)



شكل (٤)

في الأشكال (٢)، (٣)، (٤) نلاحظ أن الزاوية (θ) والزاوية المرسومة معها لها نفس الضلع النهائي \overrightarrow{OB} .

شكل (١): الزاوية التي قياسها θ في الوضع القياسي.

شكل (٢): الزاویتان θ ، $360^\circ - \theta$ متكافئان.

شكل (٣): الزاویتان θ ، $360^\circ + \theta$ متكافئان.

شكل (٤): الزاویتان θ ، $-(360^\circ - \theta)$ متكافئان.

مسابقات تتبع أن:

عند رسم زاوية موجبة قياسها θ في الوضع القياسي فإن جميع الزوايا التي قياساتها $260^\circ + \theta$ أو $260^\circ - \theta$ أو ... أو $\theta + n \times 360^\circ$ حيث $n \in \mathbb{Z}$ تكون لها نفس الضلع النهائي، وتسمى **زوايا مكافئة**.

مثال

- ٥ أوجد زاويتين إحداهما بقياس موجب والأخرى بقياس سالب مشتركتين في الضلع النهائي لكل من الزاويتين الآتية:

أ

ب

الحل

أ زاوية بقياس موجب: $120^\circ + 360^\circ = 480^\circ$ (إضافة 360°)

زاوية بقياس سالب: $120^\circ - 360^\circ = -240^\circ$ (طرح 360°)

ب زاوية بقياس موجب: $-220^\circ + 360^\circ = 140^\circ$ (إضافة 360°)

زاوية بقياس سالب: $-220^\circ - 360^\circ = -580^\circ$ (طرح 360°)

مهم: هل توجد زوايا أخرى بقياس موجب، وأخرى بقياس سالب؟ اذكر بعض هذه الزوايا إن وجدت.

حاول أن تدل

- ٦ أوجد زاويتين إحداهما بقياس موجب والأخرى بقياس سالب مشتركتين في الضلع النهائي لكل من الزوايا الآتية:

أ 40° **ب** 150° **ج** 240° **د** 120° **هـ** 180°

اكتشف الخطأ: جميع قياسات الزوايا التالية مكافئة للزاوية 75° في الوضع القياسي ما عدا الإجابة:

أ 280° **ب** 90° **ج** 480° **د** 645° **هـ** 425°

تحقق من فهمك

- ١ عين الربع الذي تقع فيه كل زاوية من الزوايا التي قياساتها كالتالي:

أ 56° **ب** 325° **ج** 57° **د** 166°

- ٢ عين أحد القياسات السالبة لكل زاوية من الزوايا التي قياساتها كالتالي:

أ 42° **ب** 214° **ج** 125° **د** 90° **هـ** 212°

- ٣ عين أصغر قياس موجب للكل زاوية من الزوايا الآتية:


أ 56° **ب** 215° **ج** 495° **د** 920° **هـ** 450°

تمارين ٤ - ١

١ أكمل:

- ١** تكون الزاوية الموجبة في وضع قياسي إذا كان _____.
- ٢** يقال للزاوية الموجبة في الوضع القياسي أنها متكافئة إذا كان _____.
- ٣** تكون الزاوية موجبة إذا كان دوران الزاوية _____ و تكون سالية إذا كان دوران الزاوية _____.
- ٤** إذا وقع الضلع النهائي للزاوية الموجبة على أحد محاور الإحداثيات تسمى _____.
- ٥** إذا كان θ قياس زاوية موجبة في الوضع القياسي، فإن $(\theta + 360^\circ \times n)$ تسمى بالزوايا _____.
- ٦** أصغر قياس موجب للزاوية التي قياسها 53° هو _____.
- ٧** الزاوية التي قياسها 920° تقع في الربع _____.
- ٨** أصغر قياس موجب للزاوية التي قياسها -190° هو _____.

٢ أي من الزوايا الموجبة الآتية في الوضع القياسي



٣ أوجد قياس الزاوية الموجبة θ المشار إليها في كل شكل من الأشكال التالية:



٤ عين الربع الذي تقع فيه كل من الزوايا التي قياساتها كالتالي:

- ١** 24°
- ٢** -40°
- ٣** 215°
- ٤** 220°
- ٥** 24°

٥ ضع كلاماً من الزوايا الآتية في الوضع القياسى، موضحاً ذلك بالرسم:

٣١٥ - ٣٢٢

١٤٠ - ١١٠

٨٠ - ٩٠

٦٠ - ٧٠

٢٦٤ - ٢٧٠

٨٣ - ٩٠

١٣٦ - ٩٠

٦ عين أحد القياسات السالبة لكل زاوية من الزوايا الآتية:

٩٠ - ٨٣

١٣٦ - ٨٣

٢٦٤ - ٢٧٠

٢٧٠ - ٢٦٤

٣١٥ - ٣٢٢

٣٦٠ - ٣٥٧

٣٦٠ - ٣٥٧

٧ عين أصغر قياس موجب لكل زاوية من الزوايا الآتية:

٣١٧ - ٣٢١

٢١٧ - ١٨٣

١٨٣ - ٥٧٠

٥٧٠ - ٣١٥

٣١٥ - ٣٢٢


٣٦٠ - ٣٥٧

٨ في الشكل المقابل، أيّاً من الأزواج المرتبة الآتية تعبّر عن زاوية موجّهة في وضعها القياسى؟ لماذا؟

١ (أب، ود) ٢ (وز، وج)

٣ (اه، آج) ٤ (وه، ود)

٥ (وئ، وز) ٦ (وب، وف)



٩ يدور أحد لاعبي الجبار على جهاز الألعاب بزاوية قياسها 200° . ارسم هذه الزاوية في الوضع القياسى.

اكتشف الخطأ: اكتب قياس أصغر زاوية بقياس موجب وزاوية أخرى بقياس سالب تشتراطان مع الصلم النهائي للزاوية (-135°) .

إجابة زياد

أصغر زاوية بقياس موجب = $135^\circ - 225^\circ = 135^\circ - 360^\circ + 225^\circ = 45^\circ$ أصغر زاوية بقياس سالب = $135^\circ - 135^\circ - 360^\circ = -360^\circ$

إجابة كريم

أصغر زاوية بقياس موجب = $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ أصغر زاوية بقياس سالب = $135^\circ - 180^\circ = -45^\circ$

أى الإجابتين صحيح فسر إجابتك.

القياس الستيني والقياس الدائري لزاوية


Degree Measure and Radian Measure of an Angle

سوف نتعلم

- مفهوم القياس الدائري لزاوية.
- العلاقة بين القياس الستيني والقياس الدائري.
- كيفية إيجاد طول قوس في دائرة.

سيق أن علمت أن القياس الستيني ينقسم إلى درجات ودقائق وثوان، وأن الدرجة الواحدة = ٦٠ دقيقة، وأن الدقيقة الواحدة = ٦٠ ثانية.
هل توجد قياسات أخرى لزاوية؟

Radian Measure



القياس الدائري

المفهوم

- أرسم مجموعة من الدوائر المتحدة المركز كـ في الشكل المقابل.
- أوجد النسبة بين طول قوس أي زاوية مركزية وطول نصف قطر دائرتها الم対اظرة - عاذا تلاحظ **نلاحظ أن** النسبة بين طول قوس أي زاوية مركزية، وطول نصف قطر دائرتها الم対اظرة تساوي مقدارا ثابتا.

$$\text{إذ ان: } \frac{\text{طول } \widehat{AB}}{م} = \frac{\text{طول } \widehat{AB}}{م} = \text{مقدار ثابت.}$$

وهذا المقدار الثابت هو القياس الدائري لزاوية.
القياس الدائري لزاوية مركزية في دائرة = $\frac{\text{طول القوس الذي تحصره هذه الزاوية}}{\text{طول نصف قطر هذه الدائرة}}$
ويرمز لها بالرمز (θ)

المصطلحات الأساسية

- | | |
|----------------|-----------------|
| Degree Measure | قياس ستيني |
| Radian Measure | قياس دائري |
| Radian Angle | زاوية نصف قطرية |

الأدوات والوسائل


- آلة حاسبة علمية.

إذا كان θ هو قياس الزاوية المركزية
لدائرة طول نصف قطرها من تقابل قوسا
من الدائرة طوله l فإن:
$$\theta = \frac{l}{r}$$
 من

الزاوية نصف قطرية

من التعريف نستنتج أن: $l = \theta \cdot r$ مع $r = \frac{l}{\theta}$

وحدة قياس الزاوية في القياس الدائري هي الزاوية الصفت قطرية، ويرمز لها بالرمز (rad) ويقرأ واحد دائري (راديان).



الزاوية الصفت قطرية Radian angle

هي الزاوية المركزية في الدائرة التي تحصر قوساً طوله يساوي طول نصف قطر هذه الدائرة.

المفهوم

تفكر ناقد: هل القياس الدائري لزاوية مركبة يتناسب مع طول القوس المقابل لها؟ فسر إجابتك.

مثال




١١ دائرة طول نصف قطرها ٨ سم، أوجد لأقرب رقمن عشرين طول القوس إذا كان قياس الزاوية المركزية التي تقابلته يساوي $\frac{\pi}{12}$

الحل

$$\text{نستخدم صيغة طول القوس: } L = \theta \times r \text{ مع: } L = \frac{\pi}{12} \times 8 \text{ فيكون: } L = \frac{\pi}{12} \times 8 = \frac{\pi}{12} \text{ سم.}$$

حاول أن تحل

أوجد طول القوس الذي يحصر الزاوية المعلومة في كل من الدوائر الآتية مقرباً الناتج لأقرب جزء من عشرة.



العلاقة بين القياس الثنائي والقياس الدائري لزاوية

Relation between degree measure and radian measure of an angle



إذا كان طول نصف قطر الدائرة يساوى الوحدة فإن الدائرة تسمى دائرة الوحدة.

تعلم أن: قياس الزاوية المركزية لدائرة يساوى قياس قوسها.

إذ أن: الزاوية المركزية التي قياسها الثنائي 360° يكون طول قوسها ٢ π س

وفي دائرة الوحدة

فإن: 2π (راديان) بالتقدير الدائري يكافئ 360° بالتقدير الثنائي.

إذ أن: 2π (راديان) يكافئ 180° π (راديان) يكافئ 180°

إذا كان لدينا زاوية قياسها الدائري θ وقياسها الثنائي س فإن:

$$\frac{\theta}{\pi} = \frac{s}{180}$$

مثال

١٢) حول 20° إلى قياس دائري بدلالة π .

الدل


للتتحويل إلى رadians تستخدم الصورة

$$\frac{\theta}{\pi} = \frac{\text{س.}}{180}$$

$$\frac{\pi}{1} = \frac{\pi \times 20}{180} = \theta$$

داهل آن تحل

٢) الشكل المقابل يمثل قياسات بعض الزوايا الخاصة أحدها كُب بالراديان (خارج الدائرة) والآخر كُب بالدرجات (داخل الدائرة). اكتب قياسات زوايا الشكل المقابلة أمام كل قياس زاوية مناظرة لها.



مثال

١٣) حول قياس الزاوية 210° إلى قياس ستين.

الدل

$$\text{س.} = \frac{210}{180} \pi$$

$$\text{س.} = 68,75493542^\circ = 68^\circ 45' 18''$$

وستخدم الآلة الحاسبة على النحو التالي:



داهل آن تحل

٤) حول قياسات الزوايا التالية إلى قياس ستيني مقرّبا الناتج لأقرب ثانية:

١) 110°

٢) 120°

٣) 110°


٤) 120°



مثال

١٤) **البيط بالفضاء:** قمر صناعي يدور حول الأرض في مدار دائري دورة كاملة كل ٢ ساعات، إذا كان طول نصف قطر الأرض يبلغ تقريبا 6400 كم وبعد القمر عن سطح الأرض 3600 كم، فما وجد المسافة التي يقطعها القمر خلال ساعة واحدة مقرّبا الناتج لأقرب كيلومتر.

الحل



بين الشكل المقابل المسار الدائري لحركة القمر:

١٠ طول نصف قطر دائرية مسار القمر $m = M \cdot J \cdot d$

$$m = M = 6400 + 3600 = 10000 \text{ كم}$$

١١ القمر يقطع المسار الدائري (دورة كاملة) في ٢ ساعات، وهذا يقابل زاوية مرکزية $= \frac{\pi}{2}$

١٢ القمر يقطع قوساً طوله $\frac{1}{4}$ محيط الدائرة في الساعة الواحدة، وهذا يقابل زاوية مرکزية $= \frac{\pi}{4}$

نستخدم صيغة طول القوس:

$$L = \theta \times r \quad \text{بالتعويض عن } r = 10000 \text{ كم، } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ :} \quad L = \frac{\pi}{4} \times 10000 \text{ كم}$$

$$L \approx 20944 \text{ كم}$$

- ١٥ **ألعاب رياضية**: يدور أحد لاعبي الجباز على جهاز الألعاب بزاوية قياسها 200° . ارسم هذه الزاوية في الوضع التسنجي وأوجد قياسها بالتقدير الدائري.

الحل

ارسم محورين لإنشاء مستوى إحداثي متعادل ومتناطعين في النقطة O .

بتفرض أن اللاعب يدور بزاوية موجبة أو ب حيث:

$$\angle (AOB) = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \text{ فيكون في } \angle (AOB) < 200^\circ.$$

١٦ الصلع النهائي للزاوية يقع في الربع الثالث.

$$200^\circ = \frac{\pi}{180} \times 200 = \frac{\pi}{180} \times 400 = 40^\circ$$

حاول أن تحل

- ١٧ **الربط بالألعاب الرياضية**: لاعب اسكواش تحرك في مسار على شكل قوس طول نصف قطر دائرته 100 متر وزاوية دوران اللاعب 80° . أوجد لأقرب جزء من عشرة طول هذا القوس.

لتحقيق من فهمك

- ١٨ **الصناعة**: يدور قرص آلة بزاوية قياسها -315° . ارسم هذه الزاوية في الوضع التسنجي.

تمارين ٤ - ٢

أولاً: اختيار من متعدد:

١) الزاوية التي قياسها 60° في الوضع القياسي تكافئ الزاوية التي قياسها:

- أ) 420° ب) 300° ج) 240° د) 120°

٢) الزاوية التي قياسها $\frac{\pi}{3}$ تقع في الربع:

- أ) الأول ب) الثاني ج) الثالث د) الرابع

٣) الزاوية التي قياسها $\frac{\pi}{4}$ تقع في الربع:

- أ) الأول ب) الثاني ج) الثالث د) الرابع

٤) إذا كان مجموع قياسات زوايا أي مضلع منتظم تساوى $180^\circ(n-2)$ حيث n عدد الأضلاع، فإن قياس زاوية المخمس المنتظم بالقياس الدائري تساوى:

- أ) $\frac{\pi}{3}$ ب) $\frac{\pi}{2}$ ج) $\frac{\pi}{7}$ د) $\frac{\pi}{4}$

٥) الزاوية التي قياسها $\frac{\pi}{7}$ قياسها стационарной يساوى:

- أ) 105° ب) 210° ج) 420° د) 840°

٦) إذا كان القياس стационарной لزاوية هو 48° فإن قياسها الدائري يساوى:

- أ) 10.18° ب) 10.36° ج) 18.10° د) 36.10°

٧) علو القوس في دائرة طول قطرها ٢٤ سم ويقابل زاوية مركزية قياسها 30° يساوى:

- أ) ١٢٢ سم ب) ٢٣٨ سم ج) ٤٢٨ سم د) ٥٣٢ سم

٨) القوس الذي طوله ٥٣٢ سم في دائرة طول نصف قطرها ١٥ سم يقابل زاوية مركزية قياسها يساوى:

- أ) 30° ب) 60° ج) 90° د) 180°

٩) إذا كان قياس إحدى زوايا مثلث 75° وقياس زاوية أخرى فيه $\frac{\pi}{4}$ فإن القياس الدائري للزاوية الثالثة يساوى:

- أ) $\frac{\pi}{12}$ ب) $\frac{\pi}{3}$ ج) $\frac{\pi}{4}$ د) $\frac{\pi}{6}$

ثانية، أجب عن الأسئلة الآتية:

١٠ أوجد بدلالة θ القياس الدائري للزوايا التي قياساتها كالتالي:

- | | | | |
|----|------|---|------|
| ب | ٢٤٠° | ١ | ٢٢٥° |
| د | ٣٠٠° | ٢ | ١٣٥° |
| هـ | ٧٨٠° | ٣ | ٣٩٠° |

١١ أوجد القياس الدائري للزوايا التي قياساتها كالتالي، مقرراً الناتج ثلاثة أرقام عشرية:

- | | | | |
|----|--------|---|---------|
| ب | ٦٨°٤٨' | ٢ | ٢٥٠°٥٠' |
| جـ | ٥٦,٦° | ١ | ١٦٠°٤٨' |

١٢ أوجد القياس الستي للزوايا التي قياساتها كالتالي، مقرراً الناتج لأقرب تانية:

- | | | | |
|----|--------|---|--------|
| بـ | ٤٩,٤٧° | ١ | ٤٠,٤٩° |
| هـ | ٣٦٠ | | |

١٣ إذا كان θ قياس زاوية مركزية في دائرة طول نصف قطرها ١٥، وتحصر قوساً طوله L :

(الأقرب جزء من عشرة) ١ إذا كان $m\theta = ٢٠$ سم، $m\theta = ٢٠^\circ$ "٧٨" أوجد L .

(الأقرب جزء من عشرة) ٢ إذا كان $L = ٢٧,٣$ سم، $m\theta = ٢٤^\circ$ "٧٨" أوجد $m\theta$.

١٤ زاوية مركزية قياسها ١٥٠ " وتحصر قوساً طوله ١١ سم، احسب طول نصف قطر دائريتها (الأقرب جزء من عشرة)

١٥ أوجد القياس الدائري والقياس الستي للزاوية المركزية التي تقابل قوساً طوله ٨,٧ سم في دائرة طول نصف قطرها ٤ سم.

١٦ **الربط بال الهندسة:** مثلث قياس إحدى زواياه ٦٠ " وقياس زاوية أخرى منه يساوي $\frac{\pi}{4}$ أوجد القياس الدائري والقياس الستي لزاوته الثالثة.

١٧ **الربط بال الهندسة:** دائرة طول نصف قطرها ٤ سم، رسمت $\triangle ABC$ بحيث $m\angle A = ٣٠$ " أوجد طول القوس الأصغر \widehat{AC} .


١٨ **الربط بال الهندسة:** في الشكل المقابل إذا كان مساحة المثلث $MABC$ القائم الزاوي في $M = ٢٢$ سم^٢ فأوجد محيط الشكل المظلل مقرراً الناتج لأقرب رقمين عشرين



٢٩) الربط بالهندسة: \overline{AB} قطر في دائرة طوله ٢٤ سم ، رسم الوتر \overline{AC} بحيث كان ق($\angle B$) = 50° .
أوجد طول القوس الأصغر \widehat{AC} مترًا الناتج لأقرب رقمن عشرين.

٣٠) مسافات: كم المسافة التي تقطعها نقطة على طرف عقرب الدقائق خلال ١٠ دقائق إذا كان طول هذا العقرب ٦ سم؟

٣١) ملائكة: قمر صناعي يدور حول الأرض في مسار دائري دورة كاملة كل ٦ ساعات، فإذا كان طول نصف قطر مساره عن مركز الأرض ٩٠٠٠ كم، فأوجد سرعته بالكميلومتر في الساعة.



٣٢) الربط بالهندسة: في الشكل المقابل:

\overline{AB} ، \overline{AC} مسان للدائرة M ، ق($\angle CAB$) = 60° ، $AB = 12$ سم.
أوجد لأقرب عدد صحيح طول القوس الأكبر \widehat{BC} .



٣٣) الربط بالزمن: تستخدم المزولة الشمسية لتحديد الوقت أثناء النهار من خلال طول الفضل الذي يسقط على سطح مدرج لإظهار الساعة وأجزائها، فإذا كان الفضل يدور على القرص بمعدل 15° لكل ساعة.

أ) أوجد قياس الزاوية بالراديان التي يدور الفضل عنها بعد مرور ٤ ساعات.


ب) بعد كم ساعة يدور الفضل بزاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ رadian؟

ج) مزولة طول نصف قطرها ٢٤ سم، أوجد بدلالة π طول القوس الذي يصنعه دوران الفضل على حافة القرص بعد مرور ١٠ ساعات.

٣٤) تفكير ناقد: مستقيم يصنع زاوية قياسها $\frac{\pi}{4}$ في الوضع التیاسى لدائرة الوحدة مع الاتجاه الموجب لنحوير البيانات. أوجد معادلة هذا المستقيم.

سوى تتعلم

- دائرة الوحدة.
- الدوال المثلثية الأساسية.
- ملحوظات الدوال المثلثية الأساسية.
- إثارات الدوال المثلثية.
- الدوال المثلثية لبعض الزوايا الخاصة.



فكرة و راقيل

سبق أن درست النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة، وفي $\triangle ABC$ فإن القائمة الزاوية في ب تحدد:

$$\sin A = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\cos A = \frac{\text{ال المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{AC}{AB}$$

$$\tan A = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{BC}{AC}$$

١- في الشكل المقابل عبر عن

جـ جـ بـ بـ لـ لـ مـ مـ خـ خـ لـ لـ


هل تساوى هذه النسب؟ فسر إجابتك.

★ ماذا تستنتج؟

للحظان

المصطلحات الأساسية

Trigonometric Function	دالة مثلثية
Sine	جيب
Cosine	جيب تمام
Tangent	ظل
Cosecant	قاطع تمام
Secant	قاطع
Cotangent	ظل تمام



المثلثات $\triangle ACD$ ، $\triangle CBD$ ، و $\triangle ABC$ متشابهات (لماذا؟)

ومن التشابه يكون: $\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{BC} = \frac{AD}{AC}$ (لماذا؟)

إذن: النسبة المثلثية للزاوية الحادة ثابتة لا تتغير إلا إذا تغيرت الزاوية نفسها.

٢- بين الشكل المقابل رباع دائرة طول نصف قطرها مـ سـ

حيث: $\theta = \angle AOB$

$$\sin \theta = \frac{جـ}{مـ}$$

وعندما يزداد θ (أو جـ) إلى α


$$\sin \alpha = \frac{جـ}{مـ}$$

إذن: النسبة المثلثية لزاوية تتغير بتغير قياس زاويتها،

وهذا ما يعرف بالدوال المثلثية.


الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية.



دائرة الوحدة

The unit circle



في أي نظام إحداثي متعامد تسمى الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها يساوى وحدة الأطوال بدائرة الوحدة.

* دائرة الوحدة تتقطع محور السينات في النقاطين $A(1,0)$ ، $B(-1,0)$ ، وتقطع محور الصادات في النقاطين $C(0,1)$ ، $D(0,-1)$.

* إذا كان (s, c) هما إحداثي أي نقطة على دائرة الوحدة فإن:

$$s^2 + c^2 = 1 \quad \text{حيث } s \neq 0, c \neq 0.$$


نظرية فيثاغورث

الدوال المثلثية الأساسية للزاوية

لأى زاوية موجهة في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة $P(s, c)$ وقياسها θ يمكن تعريف الدوال الآتية:

١- جيب تمام الزاوية θ = الإحداثي الصادي للنقطة P

$$\text{أى أن: } \sin \theta = s$$



٢- جيب الزاوية θ = الإحداثي الصادي للنقطة P

$$\text{أى أن: } \cos \theta = c$$

٣- قلل الزاوية θ = $\frac{\text{الإحداثي الصادي للنقطة } P}{\text{الإحداثي الصافي للنقطة } P}$

$$\text{أى أن: } \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \text{حيث } s \neq 0.$$


اللحوظة: يكتب الزوج المرتب (s, c) لأى نقطة على دائرة الوحدة بالصورة $(\sin \theta, \cos \theta)$

إذا كانت النقطة $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ هي نقطة تقاطع الضلع النهائي لزاوية موجهة قياسها θ مع دائرة الوحدة

$$\text{فإن: } \sin \theta = \frac{1}{2}, \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

The reciprocals of the basic trigonometric functions

لأى زاوية موجهة في الوضع القياسي وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة $P(s, c)$ وقياسها θ توجد الدوال الآتية:




١- قاطع الزاوية θ : $\csc \theta = \frac{1}{s} = \frac{1}{\cos \theta}$ حيث $s \neq 0$.

٢- قاطع تمام الزاوية θ : $\sec \theta = \frac{1}{c} = \frac{1}{\sin \theta}$ حيث $c \neq 0$.

٣- قاطع تمام الزاوية θ : $\cot \theta = \frac{s}{c} = \frac{1}{\tan \theta}$ حيث $c \neq 0$.


The signs of The Trigonometric Functions

إشارات الدوال المثلثية




الربع الثاني
$\sin > 0$
$\cos < 0$

الصلع النهائي للزاوية يقع في الربع الثاني
لذلك دالة الجيب ومتلويها تكونان موجبتين وباقى
الدوال سالبة.



الربع الأول
$\sin < 0$
$\cos > 0$

الصلع النهائي للزاوية يقع في الربع الأول.
لذلك كل الدوال المثلثية للزاوية التي علّمها النهائي
وبـ ت تكون موجبة



الربع الثالث
$\sin < 0$
$\cos < 0$


الصلع النهائي للزاوية يقع في الربع الثالث
لذلك دالة القيل ومتلويها تكونان موجبتين، وباقى
الدوال سالبة.



الربع الرابع
$\sin < 0$
$\cos > 0$

الصلع النهائي للزاوية يقع في الربع الرابع.
لذلك دالة جيب التام ومتلويها تكونان موجبتين،
وباقى الدوال سالبة.

ويمكن تلخيص إشارات الدوال المثلثية جميعها في الجدول الآتي:



إشارات الدوال المثلثية			الفترة التي يقع فيها قياس الزاوية	الصلع النهائي للزاوية
ظا، قتا	جنا، قتا	جدا، قتا	ظا، قتا	الربع الذي يقع فيه الصلع النهائي للزاوية
+	+	+	$[0, \frac{\pi}{4}]$	الأول
-	-	+	$[\pi, \frac{3\pi}{4}]$	الثاني
+	-	-	$[\frac{\pi}{4}, \pi]$	الثالث
-	+	-	$[\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$	الرابع

مثال

- ١) عين إشارة كل من النسب المثلثية الآتية:
١) جا 120° ٢) قا -215° ٣) جنا 60°

الحل

- ١) الزاوية التي قياسها 120° تقع في الربع الثاني
 \therefore جا 120° موجبة

- ٣) الزاوية التي قياسها 215° تقع في الربع الرابع
 ٤) الزاوية التي قياسها 60° تكافئ زاوية قياسها $60^\circ - 360^\circ = 240^\circ$
 ٥) الزاوية التي قياسها 150° تقع في الربع الرابع
 ٦) الزاوية التي قياسها (-30°) تكافئ زاوية قياسها $-30^\circ + 360^\circ = 330^\circ$
 ٧) الزاوية التي قياسها (-30°) تقع في الربع الرابع

داول او تحمل

١) عين إشارة كل من النسب المثلثية الآتية:

$$1) \text{ جتا } 210^\circ \quad 2) \text{ طا } 300^\circ \quad 3) \text{ جا } 1230^\circ \quad 4) \text{ ص } 75^\circ$$

مثال

- ٢) إذا كانت $\angle AOB$ في وضعها النهائي وضعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة B وفيها θ .
 أوجد النسب المثلثية الأساسية للزاوية AOB إذا كان إحداثياً النقطة B هي:
 ١) $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ، ٢) $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ، ٣) $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ ، ٤) $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$
 حيث $\sin < 0$ ، $\cos > 0$.

الحل

$$1) \text{ جتا } \theta = -1 , \text{ جا } \theta = -1 , \text{ طا } \theta = -\frac{1}{2} \quad (\text{غير معرف})$$

$$2) \begin{aligned} \text{ص}^2 + \text{ص}'^2 &= 1 && (\text{دائرة الوحدة}) \\ \text{ص}' &= \pm \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} && \text{بالتعويض عن ص} = \frac{1}{2} \\ \text{ص}' &= \frac{\sqrt{3}}{2} && \text{فيكون} \\ \text{ص}' &= -\frac{\sqrt{3}}{2} && \therefore \text{ص} = -\frac{\sqrt{3}}{2} && (\text{مرفوض}) \end{aligned}$$

$$\therefore \text{جتا } \theta = -\frac{1}{2} , \text{ جا } \theta = -\frac{1}{2} , \text{ طا } \theta = -\frac{1}{2}$$

$$3) \begin{aligned} \text{ص}' &= 1 && \therefore \text{ص} = \frac{1}{2} \\ \text{ص}' &= -1 && \therefore \text{ص} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{ويكون جتا } \theta = -\frac{1}{2} , \text{ جا } \theta = -\frac{1}{2} , \text{ طا } \theta = -1$$

- ٣) إذا كانت $270^\circ < \theta < 360^\circ$ وكان $\text{جا } \theta = -\frac{5}{13}$ أوجد جميع النسب المثلثية الأساسية للزاوية التي قياسها θ

الحل


نفرض أن في $(\angle AOB) = \theta$ حيث θ في الربع الرابع

وأن إحداثيات النقطة B هما (س، ص)

$$\therefore \text{ص} = \text{جا } \theta = -\frac{5}{13} , \text{ س} = \text{جتا } \theta \quad \text{حيث جتا } \theta < 0$$

$$\therefore \text{ص}'^2 + \text{ص}^2 = 1 \quad \therefore \text{جتا}' \theta = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2} = \pm \frac{12}{13}$$

$$\therefore \text{جتا}' \theta = 1 - \frac{12}{169} = \frac{157}{169} \quad \text{جتا}' \theta = -\frac{12}{13} \quad \text{أو} \quad \text{جتا}' \theta = -\frac{12}{13}$$




$$\operatorname{جنا} \theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (\text{لماذا}) \quad \operatorname{ظلا} \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

دائل أن تحل

- ٢ إذا كانت $90^\circ < \theta < 180^\circ$ ، $\operatorname{جا} \theta = \frac{1}{2}$ أوجد $\operatorname{جنا} \theta$ ، $\operatorname{ظلا} \theta$ حيث θ زاوية في وضعها القياسى في دائرة الوحدة.

مثال

- ٣ إذا كانت الزاوية التي قياسها θ المرسومة في الوضع القياسى، وضلعها النهاى يقطع دائرة الوحدة في النقطة ب $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. فأوجد جميع النسب المثلثية للزاوية θ .



$$\operatorname{جا} \theta = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{جنا} \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{ظلا} \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}},$$


$$\operatorname{قنا} \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{قا} \theta = -\frac{1}{2}, \quad \operatorname{غنا} \theta = -\frac{\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3}$$

دائل أن تحل

- ٤ أوجد جميع النسب المثلثية للزاوية التي قياسها θ المرسومة في الوضع القياسى، وضلعها النهاى يقطع دائرة الوحدة في النقطة ب حيث:

$$(1) \quad \text{ب } B \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \quad (2) \quad \text{ب } B \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{2} \right)$$

الدوال المثلثية لبعض الزوايا الخاصة



في الشكل المقابل: قطعت دائرة الوحدة محور الإحداثيات في النقاط $A(1, 0)$, $A(-1, 0)$, $A(0, 1)$, $A(0, -1)$.

وكانت θ قياس الزاوية الموجبة او ب في وضعها القياسى، والذى يقطع ضلعها النهاى وب دائرة الوحدة في ب.

أولاً: إذا كانت $\theta = 0^\circ$ أو $\theta = 360^\circ$ فإن: $\operatorname{ب}(0, 1)$

ويكون: $\operatorname{جنا} 0^\circ = \operatorname{جنا} 360^\circ = 1$ ، $\operatorname{جا} 0^\circ = \operatorname{جا} 360^\circ = \text{صفر}$ ،

$$\operatorname{ظلا} 0^\circ = \operatorname{ظلا} 360^\circ = \text{صفر}$$

ثانياً: إذا كانت $\theta = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$ فإن: $\operatorname{ب}(1, 0)$

$\operatorname{جنا} 90^\circ = \text{صفر}$ ، $\operatorname{جا} 90^\circ = 1$ ، $\operatorname{ظلا} 90^\circ = \frac{1}{2}$ (غير معرف)

ثالثاً: إذا كانت $\theta = 180^\circ = \pi$ فإن: $\operatorname{ب}(-1, 0)$




$\operatorname{جنا} 180^\circ = 1$ ، $\operatorname{جا} 180^\circ = \text{صفر}$ ، $\operatorname{ظلا} 180^\circ = \text{صفر}$

فیاض: ب

رابعاً: إذا كانت

دافتار

- ٤) في الأشكال التالية حدد إحداثي النقطة ب لكل شكل واستتبع الدوال المثلثية لقياسات الزوايا ٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٢٠.



110

- ٥ أثبت بدون استخدام الآلة الحاسبة أن: $جا ٢٠ \cdot جا ٣٠ = جا ٦٠$

العنوان

$$\text{نعلم أن } \sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$(v) \quad \frac{1}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{x}}}} = \frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{x}}}}} = \dots \text{الطرف الأيمن} = \frac{\frac{1}{1}}{\frac{1}{x}}.$$

$$\frac{1}{\sqrt{4}} = \pm \frac{1}{2} \text{ or } \pm \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$(٢) \quad \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{\sqrt[4]{4}} \right) = \sqrt[4]{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{\frac{1}{2^2}} = \sqrt[2]{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

عن (١) ، (٢) ، الظرفان متاوياً.

حاجل آن تحل

- ٥ أوجد قيمة: ٣ جا - ٣ جا - جتا - قا - جا - جبا

- ٦) تفكير ناقد:** إذا كانت الزاوية التي قياسها θ مرسومة في الوضع القياسى، وكان جنباً $\theta = \frac{1}{3}$ ، جاً $\theta = \frac{2}{3}$. هل من الممكن أن يكون $\theta = 240^\circ$ ؟ وضح ذلك.

لتحقيق من مكتبة

أثبت صحة كلٍ من المساويات التالية:

تمارين ٤ - ٣

أولاً، الاختيار من متعدد:

- ١ إذا كان θ قياس زاوية في الوضع القياسي و ضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ فإن جا θ تساوي:

١ $\frac{1}{2}$ ٢ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ٣ $\frac{1}{2}$

٤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ٥ $\frac{1}{2}$

٦ $\frac{1}{2}$ ٧ $\frac{1}{2}$

٨ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ٩ $-\frac{1}{2}$

٩ $-\frac{1}{2}$ ١٠ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

١١ $-\frac{1}{2}$ ١٢ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

١٣ $\frac{\pi}{2}$ ١٤ $\frac{\pi}{3}$

١٥ $\frac{\pi}{2}$ ١٦ $\frac{\pi}{3}$

١٧ $\frac{\pi}{2}$ ١٨ $\frac{\pi}{3}$

١٩ $-\frac{\pi}{2}$ ٢٠ $-\frac{\pi}{3}$

٢١ $-\frac{\pi}{2}$ ٢٢ $-\frac{\pi}{3}$

٢٣ $-\frac{\pi}{2}$ ٢٤ $-\frac{\pi}{3}$

٢٥ $-\frac{\pi}{11}$ ٢٦ $-\frac{\pi}{9}$

٢٧ $-\frac{\pi}{9}$ ٢٨ $-\frac{\pi}{7}$

٢٩ $-\frac{\pi}{7}$ ٣٠ $-\frac{\pi}{5}$

٣١ $-\frac{\pi}{6}$ ٣٢ $-\frac{\pi}{4}$

٣٣ $-\frac{\pi}{4}$ ٣٤ $-\frac{\pi}{3}$

٣٥ $-\frac{\pi}{3}$ ٣٦ $-\frac{\pi}{2}$

٣٧ $-\frac{\pi}{2}$ ٣٨ $-\frac{\pi}{3}$

٣٩ $-\frac{\pi}{3}$ ٤٠ $-\frac{\pi}{2}$

٤١ $-\frac{\pi}{2}$ ٤٢ $-\frac{\pi}{3}$

٤٣ $-\frac{\pi}{7}$ ٤٤ $-\frac{\pi}{6}$

٤٥ $-\frac{\pi}{6}$ ٤٦ $-\frac{\pi}{5}$

٤٧ $-\frac{\pi}{5}$ ٤٨ $-\frac{\pi}{4}$

٤٩ $-\frac{\pi}{4}$ ٥٠ $-\frac{\pi}{3}$

٥١ $-\frac{\pi}{3}$ ٥٢ $-\frac{\pi}{2}$

٥٣ $-\frac{\pi}{2}$ ٥٤ $-\frac{\pi}{3}$

- ٥٥ ثالثاً، أجب عن الأسئلة الآتية:
أوجد جميع الدوال المثلثية لزاوية قياسها θ المرسومة في الوضع القياسي، وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في النقطة

٥٥ $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ٥٦ $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ٥٧ $(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ ٥٨ $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$

١٠ إذا كان θ هو قياس زاوية موجبة في الوضع القياسي، وصلبها النهاي يقطع دائرة الوحدة في النقطة المعطاة فأوجد جميع الدوال المثلثية لهذه الزاوية في الحالات الآتية:

حيث $\alpha < 0$.

أ) $(\cos \alpha, -\sin \alpha)$

حيث $\frac{\pi}{2} > \theta > 0$

ب) $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

١١ اكتب إشارات النسب المثلثية الآتية:

أ) $\tan 410^\circ$

ب) $\cot 335^\circ$

ج) $\sin 240^\circ$

د) $\tan \frac{\pi}{9}$


هـ) $\cot \frac{\pi}{4}$

ذ) $\tan \frac{\pi}{6}$

١٢ أوجد قيمة ما يأنى:

أ) $\sin \frac{\pi}{7} \times \sin \alpha + \cos \frac{\pi}{7} \times \cos \alpha$

ب) $\tan 30^\circ \times 2 + \sin 45^\circ \times \sin 90^\circ$



١٣ **الربط بالقزيز:** عند سقوط أشعة الضوء على سطح شبه شفاف، فإنها تتعكس بنفس زاوية السقوط ولكن البعض منها ينكسر عند مروره خلال هذا السطح. كما في الشكل المجاور:

إذا كان $\sin \theta = k \sin \theta_1$ ، كانت $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$. فإذا كان $\sin \theta = \sqrt{2} \sin \theta_1$ ، فـأـوـجـدـ قـيـاسـ زـاوـيـةـ θ .

١٤ **اكتشف الخطأ:** طلب المعلم من طلاب الفصل إيجاد ناتج $2 \sin 45^\circ$.

إجابة أحد

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \times 2 = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

إجابة كريم

$$2 \sin 45^\circ = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2} = 1$$

أي الإجابتين صحيح؟ ولماذا؟


١٥ **تفكر ناقد:** إذا كانت θ قياس زاوية مرسومة في الوضع القياسي، حيث $\tan \theta = -1$. فـأـنـ $\theta = 270^\circ$. هل من الممكن أن يكون $\theta = \frac{\pi}{2}$? فـسـرـ إـجـابـتكـ.

الزوايا المتناسبة

Related Angles

سوفي تتعلم

- العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوين $\theta \pm 180^\circ$
- العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوين $\theta + 360^\circ$
- العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوين $\theta \pm 90^\circ$
- العلاقة بين الدوال المثلثية للزاوين $\theta \pm 270^\circ$



- أصل العام للمعادلات المثلثية التي حل الصور
- $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$
- $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$
- $\tan(-\theta) = -\tan(\theta)$

المصطلحات الأساسية

زاوين متباين

من الشكل المقابل بـ (s, c) صورة النقطة b (s, c) بالانعكاس حول محور الصادات فيكون $s = -s$, $c = -c$. لذلك فإن:



$$\begin{aligned} \text{جا}(-180^\circ - \theta) &= \text{جا} \theta, \quad \text{قنا}(-180^\circ - \theta) = -\text{قنا} \theta \\ \text{جنا}(-180^\circ - \theta) &= -\text{جنا} \theta, \quad \text{قنا}(-180^\circ - \theta) = -\text{قنا} \theta \\ \text{طنا}(-180^\circ - \theta) &= -\text{طنا} \theta, \quad \text{قطنا}(-180^\circ - \theta) = -\text{قطنا} \theta \end{aligned}$$

مثال: $\text{جنا}(-120^\circ) = \text{جنا}(180^\circ - 60^\circ) = -\text{جنا}60^\circ = -\frac{1}{2}$
 $\text{جا}(-135^\circ) = \text{جا}(180^\circ - 45^\circ) = \text{جا}45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2}$

الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية

حاول أن تحل


١ أوجد $\text{طنا}(-125^\circ)$, $\text{جا}(-120^\circ)$, $\text{جنا}(-150^\circ)$

للحظ أن: $\theta + (-180^\circ) = -\theta$

يقال إن الزاويتين θ و $-180^\circ - \theta$ زاويان متباين.

الزاويان المتباين: هما زاويان الفرق بين قياسيهما أو مجموع قياسيهما يساوى عدداً صحيحاً من التوانم.

٢- الدوال المثلثية لأي زاويتين قياسيهما θ ، $(\theta + 180^\circ)$



في الشكل المقابل نجد:
ب(س، ص) صورة النقطة ب(س، ص) بالانعكاس في
نقطة الأصل و فيكون س = -س، ص = -ص
لذلك فإن:

$$\begin{aligned} \text{جا}(\theta + 180^\circ) &= -\text{جا}\theta & \text{قنا}(\theta + 180^\circ) &= -\text{قنا}\theta \\ \text{جنا}(\theta + 180^\circ) &= -\text{جنا}\theta & \text{قا}(\theta + 180^\circ) &= -\text{قا}\theta \\ \text{ظا}(\theta + 180^\circ) &= -\text{ظا}\theta & \text{قظا}(\theta + 180^\circ) &= -\text{قظا}\theta \end{aligned}$$


مثال:

$$\begin{aligned} \text{جا}210^\circ &= \text{جا}(180^\circ + 30^\circ) = -\text{جا}30^\circ = -\frac{1}{2} \\ \text{جنا}225^\circ &= \text{جنا}(180^\circ + 45^\circ) = -\text{جنا}45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \text{ظا}240^\circ &= \text{ظا}(180^\circ + 60^\circ) = \text{ظا}60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

حاول أن تحل

$$٢) \text{أوجد جا}225^\circ, \text{جنا}210^\circ, \text{قا}60^\circ, \text{قظا}225^\circ$$

٣- الدوال المثلثية لأي زاويتين قياسيهما θ ، $(\theta - 180^\circ)$



في الشكل المقابل:
ب(س، ص) صورة النقطة ب(س، ص)
بالانعكاس حول محور السينات فيكون س = -س، ص = -ص
لذلك فإن:

$$\begin{aligned} \text{جا}(\theta - 180^\circ) &= -\text{جا}\theta & \text{قنا}(\theta - 180^\circ) &= -\text{قنا}\theta \\ \text{جنا}(\theta - 180^\circ) &= -\text{جنا}\theta & \text{قا}(\theta - 180^\circ) &= -\text{قا}\theta \\ \text{ظا}(\theta - 180^\circ) &= -\text{ظا}\theta & \text{قظا}(\theta - 180^\circ) &= -\text{قظا}\theta \end{aligned}$$

مثال:

$$\begin{aligned} \text{جا}330^\circ &= \text{جا}(360^\circ - 30^\circ) = -\text{جا}30^\circ = -\frac{1}{2} \\ \text{جنا}315^\circ &= \text{جنا}(360^\circ - 45^\circ) = -\text{جنا}45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

حاول أن تحل

$$٢) \text{أوجد: جا}315^\circ, \text{قنا}315^\circ, \text{ظا}330^\circ, \text{ظا}300^\circ$$

تفكر لقد: كيف يمكنك إيجاد جا(-45°)، جنا(-60°)، ظا(-30°)، جا(-60°).

مثال

١ بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة المقدار

$$\sin 15^\circ = \sin(30^\circ - 15^\circ) = \sin 30^\circ - \cos 30^\circ$$

الحل

$$\begin{aligned} \sin 15^\circ &= \sin(30^\circ - 15^\circ) = \sin 30^\circ - \cos 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

حاول أن تحل

٤ أثبت أن $\sin 15^\circ = \sin(30^\circ - 15^\circ) = \sin 30^\circ - \cos 30^\circ$

٤ - الدوال المثلثية لأي زاويتين قياسهما θ ، $(\theta - 90^\circ)$

يبين الشكل المجاور جزءاً من دائرة مركبة و.

الزاوية التي قياسها θ مرسومة في الوضع القياسى لدائرة طول نصف قطرها r

من تطابق المثلثين OAB و OCD ، وجد B

نجد أن: $\sin \theta = \sin (\theta - 90^\circ)$

لذلك يمكن استنتاج جميع الدوال المثلثية للزوايا θ ، $(\theta - 90^\circ)$

$$\sin(\theta - 90^\circ) = \sin \theta , \quad \cos(\theta - 90^\circ) = \cos \theta$$

$$\tan(\theta - 90^\circ) = \tan \theta , \quad \cot(\theta - 90^\circ) = \cot \theta$$

$$\sec(\theta - 90^\circ) = \sec \theta , \quad \csc(\theta - 90^\circ) = \csc \theta$$


مثال

١ إذا كانت الزاوية التي قياسها θ في الوضع القياسى، ويمر خطها النهائي بالنقطة $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

فأوجد الدوال المثلثية: $\sin(\theta - 90^\circ)$ ، $\cos(\theta - 90^\circ)$

الحل

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} - (\theta + 90^\circ) &= \text{جتا } \theta \\ \frac{\pi}{2} - (\theta + 90^\circ) &= \text{ظنا } \theta \end{aligned}$$

حاول أن تدل٥ في المثال السابق أوجد جتا $(\theta + 90^\circ)$ ، قتا $(\theta + 90^\circ)$ **٥ - الدوال المثلثية لأى زاويتين قياسيهما θ ، $(\theta + 90^\circ)$** 

من تطابق المثلثين بـ جدا و ، وجدا

لجدان $\text{ص}' = \text{س}$ ، $\text{س}' = -\text{ص}$ ومن ذلك يمكن استنتاج جميع الدوال المثلثية لزوايتين θ ، $(\theta + 90^\circ)$ كالتالي

$$\begin{aligned} \text{جا } (\theta + 90^\circ) &= \text{جتا } \theta & \text{قطا } (\theta + 90^\circ) &= \text{قا } \theta \\ \text{جتا } (\theta + 90^\circ) &= -\text{جا } \theta & \text{قا } (\theta + 90^\circ) &= -\text{قطا } \theta \\ \text{ظنا } (\theta + 90^\circ) &= -\text{ظنا } \theta & \text{قطنا } (\theta + 90^\circ) &= \text{ظنا } \theta \end{aligned}$$

مثال٦ إذا كانت الزاوية التي قياسها θ في الوضع القياسي يمر ضلعها النهائي بالتنुة $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ أوجد الدوال المثلثية ظنا $(\theta + 90^\circ)$ ، قتا $(\theta + 90^\circ)$ **الحل**

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \Rightarrow (\theta + 90^\circ) &= \text{ظنا } \theta \\ 2 &= (\theta + 90^\circ) & \therefore \text{قطا } (\theta + 90^\circ) &= \text{قا } \theta \end{aligned}$$

حاول أن تدل٧ في المثال السابق أوجد: جا $(\theta + 90^\circ)$ ، قا $(\theta + 90^\circ)$

٦- الدوال المثلثية لأي زاويتين قياسيهما θ .


من تطابق المثلثين بـ جـ وـ جـ بـ

لذلك يمكن استنتاج جميع الدوال المثلثية للزوايا θ كالتالي:

جـا $(\theta - 270^\circ) = -\text{جـا } \theta$ ، قـتا $(\theta - 270^\circ) = -\text{قـتا }$

جـنا $(\theta - 270^\circ) = -\text{جـنا } \theta$ ، قـا $(\theta - 270^\circ) = -\text{قـا }$

ظـا $(\theta - 270^\circ) = \text{ظـا } \theta$ ، ظـتا $(\theta - 270^\circ) = -\text{ظـتا } \theta$



مثال

- ٢) إذا كانت الزاوية التي قياسها θ المرسومة في الوضع القياسي يمر ضلعها النهائي بالنقطة $(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ فما هي الدوال المثلثية: جـا $(\theta - 270^\circ)$ ، ظـا $(\theta - 270^\circ)$

الحل

$$\therefore \text{جـا } (\theta - 270^\circ) = -\text{جـا } \theta$$

$$\therefore \text{ظـا } (\theta - 270^\circ) = \text{ظـا } \theta$$

دالة آن تحـلـل

- ٣) في المثال السابق أوجد ظـا $(\theta - 270^\circ)$ ، قـتا $(\theta - 270^\circ)$

٧- الدوال المثلثية لأي زاويتين قياسيهما θ .


من تطابق المثلثين: بـ جـ وـ جـ بـ

لذلك يمكن استنتاج جميع الدوال المثلثية للزوايا θ ، $(\theta + 270^\circ)$ كالتالي:

جـا $(\theta + 270^\circ) = -\text{جـا } \theta$ ، قـتا $(\theta + 270^\circ) = -\text{قـتا }$

جـنا $(\theta + 270^\circ) = -\text{جـنا } \theta$ ، قـا $(\theta + 270^\circ) = -\text{قـا }$

ظـا $(\theta + 270^\circ) = -\text{ظـا } \theta$ ، ظـتا $(\theta + 270^\circ) = -\text{ظـتا } \theta$



مثال

- ٤) إذا كانت الزاوية التي قياسها θ في الوضع القياسي يمر ضلعها النهائي بالنقطة $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ فما هي الدوال المثلثية: جـا $(\theta + 270^\circ)$ ، قـا $(\theta + 270^\circ)$

الحل

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} - \theta &= \tan(270^\circ + \theta) = \cot\theta \\ \frac{\pi}{4} &= (\theta + 270^\circ) \Rightarrow \cot\theta = \tan(\theta + 270^\circ) \end{aligned}$$

حاول أن تحل

٨ في المثال السابق أوجد هنا $(\theta + 270^\circ) = \tan(\theta)$

الحل العام للمعادلات المثلثية التي على الصورة: $\tan(\alpha) = \cot(\beta)$, $\sec(\alpha) = \csc(\beta)$, $\sin(\alpha) = \cos(\beta)$

General solution of trigonometric equations as the form [$\tan(\alpha) = \cot(\beta)$, $\sec(\alpha) = \csc(\beta)$, $\sin(\alpha) = \cos(\beta)$]



سبق أن درست أنه إذا كان α, β هما قياساً زاوياً متسامتين (أي مجموع قياسيهما 90°) فإن $\tan \alpha = \cot \beta$, $\sec \alpha = \csc \beta$ ومن ذلك فإن $\alpha + \beta = 90^\circ$ حيث α, β زاوياً متسان حادتان فإذا كانت $\tan \theta = \cot \alpha$ فما هي قيمة زاوية θ المتوقعة؟



١- إذا كان $\tan \alpha = \cot \beta$ (حيث α, β قياساً زاوياً متسامتين) فإن:

$$\tan \alpha = \tan(\frac{\pi}{2} - \beta) \quad \text{ومن ذلك فإن: } \beta - \frac{\pi}{2} = \alpha \quad \text{أي}$$

$$\frac{\pi}{2} = \beta - \alpha \quad \text{أي} \quad \beta + \frac{\pi}{2} = \alpha \quad \text{ومن ذلك فإن: } \beta + \frac{\pi}{2} = \alpha$$

وبإضافة π (حيث $n \in \mathbb{Z}$) إلى الزاوية β فإن:

(حيث $n \in \mathbb{Z}$), بالمثل:

$$\text{عندما } \tan \alpha = \cot \beta \quad \text{فإن } \alpha = \beta \pm \frac{\pi}{2} + n\pi$$

(حيث $n \in \mathbb{Z}$),

$$\text{عندما } \cot \alpha = \tan \beta \quad \text{فإن } \alpha = \beta \pm \frac{\pi}{2} + n\pi$$

$$\frac{\pi}{4} = \beta + \alpha \quad \text{أي} \quad \pi \neq n \neq (2n+1)\pi$$

٢- إذا كان $\sec \alpha = \csc \beta$ (حيث α, β قياساً زاوياً متسامتين) فإن:

$$\sec \alpha = \sec(\frac{\pi}{2} - \beta) \quad \text{ومن ذلك فإن: } \beta - \frac{\pi}{2} = \alpha \quad \text{أي}$$

$$\frac{\pi}{2} = \beta - \alpha \quad \text{أي} \quad \beta + \frac{\pi}{2} = \alpha \quad \text{ومن ذلك فإن: } \beta + \frac{\pi}{2} = \alpha$$

وبإضافة π (حيث $n \in \mathbb{Z}$) إلى زاويتين $\beta, \beta + \frac{\pi}{2}$ فإن:

(حيث $n \in \mathbb{Z}$),
 $\pi \neq n \neq (2n+1)\pi$

$$\text{عندما } \sec \alpha = \csc \beta \quad \text{فإن } \alpha = \beta + \frac{\pi}{2} + n\pi$$

四

٥ حل المعادلة: $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}$

الحل

من تعريف المعادلة $(n \in \mathbb{N})$

$$\sin \theta = \frac{y}{r} \quad \text{و} \quad \cos \theta = \frac{x}{r}$$

طبعة الطرفين على ٣

$$-3\pi \frac{r}{\tau} + \frac{\pi}{\gamma} = \theta$$

$$\sin \pi z + \frac{R}{z} = \theta \quad \text{أي أن:} \quad \sin \pi z + \frac{R}{z} = \theta - \theta z \quad \text{و (٢)}$$

$$\text{حل المعادلة هو: } \frac{\pi}{4} + k\pi \quad \text{أو} \quad \frac{3\pi}{4} + k\pi$$

دایل ان ندل

٩) أوجد الحل العام لكل من المعادلات الآتية:

$$\theta = \text{جناه } \theta = \text{جناه } (\theta - \frac{\pi}{2})$$

$$V = (\theta - \frac{K}{r})$$

$$\theta \pm \theta = \theta$$

١٠ اكتشف الخطأ: في إحدى مسابقات الرياضيات طلب المعلم من كريم وزياد إيجاد قيمة جا($\theta - \frac{\pi}{4}$) فأنهيا إجابته صحيحة؟ فسر ذلك.

$$\begin{aligned} & \left[\left(\theta - \frac{\pi}{\tau} \right) - \right] \text{جا} = \left(\frac{\pi}{\tau} - \theta \right) \text{جا} \\ & \quad \left(\theta - \frac{\pi}{\tau} \right) \text{جا} = - \left(\frac{\pi}{\tau} - \theta \right) \text{جا} \\ & \theta \text{جا} = - \left(\frac{\pi}{\tau} - \theta \right) \text{جا} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\pi}{\tau} - \theta + \pi \right) &= \text{jya} \left(\frac{\pi}{\tau} - \theta \right) \\ \left(\theta + \frac{\pi \tau}{\tau} \right) &= \text{jya} \left(\theta \right) \end{aligned}$$

విషయ మూలము

أُوجِدَ حَيْمَ قِيمَ θ حِيثُ $\exists \theta \in \mathbb{R}$ [والتي تتحقق كل من المعادلات الآتية :

$$\theta \bar{v} = (\frac{\pi}{\gamma} - \theta) \bar{v} - \psi$$

١ جا - جا - θ



تمارين E-E



أولاً: أكمل ما ياتي:

$$\text{جتا } (\theta - 90^\circ) = \text{ جتا } \underline{\quad}$$

$$\text{جنا } (\theta + 180^\circ) = \text{ جنا } \underline{\quad}$$

$$\text{قنا } (\theta + 360^\circ) = \text{ جا } \underline{\quad}$$

$$\text{قنا } (\theta - 360^\circ) = \text{ جا } \underline{\quad}$$

$$\text{جنا } (\theta - 90^\circ) = \text{ جنا } \underline{\quad}$$

$$\text{جنا } (\theta + 90^\circ) = \text{ جا } \underline{\quad}$$

$$\text{قنا } (\theta - 270^\circ) = \text{ جنا } \underline{\quad}$$

$$\text{قنا } (\theta + 270^\circ) = \text{ جا } \underline{\quad}$$

ثانياً: أكمل كلاً مما ياتي بقياس زاوية حادة

$$\text{جا } 67^\circ = \text{ جنا } \underline{\quad}$$

$$\text{جنا } 25^\circ = \text{ جنا } \underline{\quad}$$

$$\text{قنا } 12^\circ = \text{ قا } \underline{\quad}$$

$$\text{ظنا } 42^\circ = \text{ ظنا } \underline{\quad}$$

$$\text{إذا كان ظنا } \theta = \text{ ظنا } \theta \text{ حيث } 0 < \theta < 90^\circ \text{ فإن } \underline{\quad}(\theta)$$

$$\text{إذا كان جا } \theta = \text{ جنا } \theta \text{ حيث } \theta \text{ زاوية حادة موجبة فإن } \theta = \underline{\quad}$$

$$\text{إذا كان قا } \theta = \text{ قا } (90^\circ - \theta) \text{ فإن } \underline{\quad} \theta = \theta$$

$$\text{إذا كان ظا } \theta = \text{ ظنا } \theta \text{ حيث } \theta \in [0^\circ, 90^\circ] \text{ فإن } \underline{\quad}(\theta) = \underline{\quad}$$

$$\text{إذا كان جنا } \theta = \text{ جا } \theta \text{ حيث } \theta \text{ زاوية حادة موجبة فإن جا } \theta = \underline{\quad}$$

ثالثاً: الاختيار من متعدد:

$$18 \quad \text{إذا كانت ظنا } (\theta + 180^\circ) = 1 \text{ حيث } \theta \text{ قياس أصغر زاوية موجبة فإن قياس } \theta \text{ يساوى}$$

$$135^\circ \quad 3 \quad 45^\circ \quad 1 \quad 30^\circ \quad 2 \quad 60^\circ \quad 4$$

$$19 \quad \text{إذا كان جنا } \theta = \text{ جا } \theta \text{ حيث } \theta \in [0^\circ, 90^\circ] \text{ فإن جنا } \theta \text{ تساوى}$$

$$1 \quad 1 \quad \frac{1}{2} \quad 2 \quad \frac{1}{4} \quad 3 \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4}$$

$$20 \quad \text{إذا كان جا } \alpha = \text{ جنا } \beta, \text{ حيث } \alpha, \beta \text{ زوايا حادتان فإن ظا } (\alpha + \beta) \text{ تساوى}$$

$$1 \quad 1 \quad \frac{1}{2} \quad 2 \quad \frac{1}{4} \quad 3 \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4}$$

$$21 \quad \text{إذا كان جنا } \theta = \text{ جنا } \theta \text{ حيث } \theta \text{ زاوية حادة موجبة فإن ظا } (90^\circ - \theta) \text{ تساوى}$$

$$1 \quad 1 \quad \frac{1}{2} \quad 2 \quad \frac{1}{4} \quad 3 \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4}$$

$$22 \quad \text{إذا كان جنا } (\theta + 90^\circ) = \frac{1}{2} \text{ حيث } \theta \text{ قياس أصغر زاوية موجبة فإن قياس } \theta \text{ يساوى}$$

$$150^\circ \quad 1 \quad 210^\circ \quad 2 \quad 240^\circ \quad 3 \quad 330^\circ \quad 4$$

رابعاً: أجب عن الأسئلة الآتية

٢٣) أوجد إحدى قيم θ حيث $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ التي تحقق كلاً من الآتي:

أ) $\sin(\theta + 15^\circ) = \sin(15^\circ - \theta)$

ب) $\cos(25^\circ + \theta) = \cos(15^\circ - \theta)$

ج) $\tan(\theta + 20^\circ) = \tan(20^\circ + \theta)$

د) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$

٢٤) أوجد قيمة كل مما يأتى:

أ) $\tan 780^\circ$

ب) $\cos 30^\circ$

ج) $\tan 225^\circ$

د) $\sin 150^\circ$

أ) $\sin \frac{\pi}{4}$

ب) $\cos \frac{\pi}{3}$

ج) $\sin \frac{\pi}{6}$

د) $\tan \frac{\pi}{11}$

٢٥) إذا كان الضلع النهائي لزاوية قياسها θ والمرسمة في الوضع التماثلي وضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة

في النقطة ب $(-\frac{3}{2}, \frac{4}{2})$ فما هي:

أ) $\sin(\theta + \frac{\pi}{4})$

ب) $\sin(180^\circ + \theta)$

ج) $\cos(\theta - \frac{\pi}{4})$

د) $\tan(360^\circ - \theta)$

اكتشف الخطأ

جميع الإجابات التالية صحيحة ماعدا إجابة واحدة فقط. خطاً، فيما هي:

١- جناباً θ تساوى

أ) $\sin(\theta - 270^\circ)$ ب) $\sin(270^\circ - \theta)$ ج) $\sin(360^\circ - \theta)$ د) $\sin(\theta + 270^\circ)$


٢- جناباً θ تساوى

أ) $\sin(\frac{\pi}{4} - \theta)$ ب) $\sin(\theta - \pi)$ ج) $\sin(\theta + \frac{\pi}{4})$ د) $\sin(\theta - \frac{\pi}{4})$

٣- ظناباً θ تساوى

أ) $\cos(180^\circ - \theta)$ ب) $\cos(270^\circ - \theta)$ ج) $\cos(360^\circ - \theta)$ د) $\cos(270^\circ + \theta)$


الربط بالเทคโนโลยيا: ٢٧ عند استخدام كريم حاسوبه المحمول كانت زاوية ميله مع الأفقي 122° كما هو موضع بالشكل المقابل.



- ١ ارسم الشكل السابق في المستوى الإحداثي، بحيث تكون الزاوية 122° في الوضع القياس ثم أوجد زاويتها المترية.

- ٢ اكتب دالة مثلثية يمكن استخدامها في إيجاد قيم آ، ثم أوجد قيمة الأقرب سنتيمتر.

الألعاب: تنتشر لعبة العجلة الدوارة في مدينة الملاهي، وهي عبارة عن عدد من الصناديق تدور في قوس دائري يبلغ نصف قطره ١٢ متراً، فإذا كان قياس الزاوية المشتركة مع القطع النهائي في الوضع القياس $\frac{\pi}{2}$.



- ١ ارسم الزاوية التي قياسها $\frac{\pi}{2}$ في الوضع القياس.

- ٢ اكتب دالة مثلثية يمكن استخدامها في إيجاد قيمة آ ثم أوجد قيمة آ بالметр لأقرب رقمين عشررين.


تفكير ناقد ٢٨

- ١ إذا كان θ قياس زاوية مرسومة في الوضع القياس، حيث $\text{جتا } \theta = -1$ ، $\text{قتا } \theta = 27^\circ$ ، فهل يمكن أن يكون $\text{ف}(\theta) = \frac{\pi}{4}$ ؟ فسر إجابتك.

- ٢ إذا كان $\text{جتا } (\theta - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ، $\text{جا } (\frac{\pi}{4} + \theta) = \frac{1}{2}$ فأوجد أصغر قياس موجب للزاوية θ .

سوف نتعلم

- سوف نتعلم:
- * رسم دالة الجيب واستنتاج خواصها.
 - * رسم دالة جيب التمام واستنتاج خواصها.



فكرة و لفظ

تعتمد الموجات فوق الصوتية على ترددات عالية تختلف في طول الموجة. كما تستخدم في التصوير الطبي، وتستخدمها القواسم كجهاز رادار يعمل في أعماق المحيطات. وعند تمثيل هذه الموجات بمخاطلات بيانية لتعرف خواص دالة الجيب وجيب التمام فم آنت وزملاؤك بالأعمال التعاونية التالية:

المصطلحات الأساسية

Represent sine function graphically

التمثيل البياني لدالة الجيب

عمل تعاوني

- | | |
|-----------------|-----------------|
| Sine Function | دالة الجيب |
| Cosine Function | دالة جيب التمام |
| Maximum Value | قيمة عظمى |
| Minimum Value | قيمة صغرى |

- ١ أكمل الجدول التالي بالاشتراك مع زملائك:


	$\pi/2$	$11\pi/6$	$9\pi/6$	$7\pi/6$	π	$5\pi/6$	$3\pi/2$	$7\pi/6$	$4\pi/3$	θ
جا θ									٠,٥	٠

- ٢ ارسم المنحنى بتوصيل جميع نقاطه.

- ٣ أنشئ جدولًا آخر مستخدماً قيم المعكوس الجمعي للقيم الموجودة في الجدول السابق.

- ٤ عين جميع النقاط التي حصلت عليها على شبكة الإحداثيات.

- ٥ أكمل رسم المنحنى بتوصيل جميع نقاطه.



- ٦ هل لاحظت وجود قيم عظمى أو قيم صغرى لهذا المنحنى. فسر إجابتك!

تعلم

Properties of the sine function

خواص دالة الجيب

في الدالة د حيث $d(\theta) = \sin \theta$ فإن:

★ مجال دالة الجيب هو $[-\infty, \infty]$ ، ومدتها $[-\pi, \pi]$

★ دالة الجيب دالة دورية ذات دورة 2π أي أنه يمكن إزاحة المنحنى في الفترة $[0, 2\pi]$ إلى اليمين أو اليسار 2π وحدة، 4π وحدة، 6π وحدة، ... وهكذا.

★ القيمة العظمى لدالة الجيب تساوى 1 وتحدد عند النقطة $\theta = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ $n \in \mathbb{Z}$

★ القيمة الصغرى لدالة الجيب تساوى -1 وتحدد عند النقطة $\theta = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi$ $n \in \mathbb{Z}$

Represent cosine function graphically

التمثيل البياني لدالة جيب التمام

عمل تعاوني

١ أكمل الجدول التالي بالاشتراك مع زملائك:


$\pi/2$	$3\pi/4$	$5\pi/6$	$7\pi/6$	π	$5\pi/4$	$4\pi/3$	$2\pi/3$	$\pi/6$	0	θ	$\sin \theta$
									-0.8	1	$\sin \theta$

٢ ارسم المنحنى بتوصيل جميع نقاطه.

٣ أنشئ جدولًا آخر مستخدماً قيم الممكوس الجمعي للقيم الموجودة في الجدول السابق.

٤ عين جميع النقاط التي تحصل عليها على شبكة الإحداثيات.

٥ أكمل رسم المنحنى بتوصيل جميع نقاطه.



Properties of cosine function

خواص دالة جيب التمام

في الدالة د حيث $d(\theta) = \cos \theta$ فإن:

★ مجال دالة جيب التمام هو $[-\infty, \infty]$ ، ومدتها $[-\pi, \pi]$

★ دالة جيب التمام دورية ذات دورة 2π ، أي أنه يمكن إزاحة المنحنى في الفترة $[0, 2\pi]$ إلى اليمين أو اليسار 2π وحدة، 4π وحدة، 6π وحدة، ... وهكذا.

* القيمة العظمى لدالة جيب تمام تساوى ١ وتحدد عند النقطة $\theta = \frac{\pi}{2}$ نصف

* القيمة الصغرى لدالة جيب تمام تساوى -١ وتحدد عند النقطة $\theta = \frac{3\pi}{2}$ نصف

مثال

الربط بالفيزياء: يمكن لإحدى السفن الدخول إلى الميناء إذا كان مستوى المياه مرتفعاً نتيجة حركة المد والجزر، بحيث لا يقل عمق المياه عن ١٠ أمتار، وكانت حركة المد والجزر في ذلك اليوم تخضع للعلاقة $f = 6 \sin(15n)$ حيث n هو الزمن الذي يقضى بعد منتصف الليل بالساعات تبعاً لنظام حساب الوقت بدء ٢٤ ساعة. أوجد عدد المرات التي يبلغ فيها عمق المياه في الميناء ١٠ أمتار تماماً. ارسم مخططًا بيانياً بين كيف يتغير عمق المياه مع تغير حركة المد والجزر أثناء اليوم.

الحل

العلاقة بين الزمن (n) بالساعات وعمق المياه (f) بالأمتار هي

$$\text{من العلاقة: } f = 6 \sin(15n) \quad n \geq 0$$


$$\text{عندما } n = 0 \quad f = 6 \sin(15 \times 0) = 6 \sin 0 = 0 \text{ متر}$$

$$\text{عندما } n = 6 \quad f = 6 \sin(15 \times 6) = 6 \sin 90^\circ = 6 \text{ متر}$$

$$\text{عندما } n = 12 \quad f = 6 \sin(15 \times 12) = 6 \sin 180^\circ = 6 \text{ متر}$$

$$\text{عندما } n = 18 \quad f = 6 \sin(15 \times 18) = 6 \sin 270^\circ = -6 \text{ متر}$$

$$\text{عندما } n = 24 \quad f = 6 \sin(15 \times 24) = 6 \sin 360^\circ = 6 \text{ متر}$$



ن الساعات	٢٤	١٨	١٢	٦	٠
f بالأمتار	-٦	٣	٦	٣	٠

من الجدول نجد أن: عمق المياه يبلغ ١٠ أمتار

$$\text{عندما } n = 12, 18, 24 \text{ ساعة}$$

حلول وأنواع

١ في المثال السابق أوجد عدد الساعات خلال اليوم التي تستطيع فيها السفينة الدخول إلى الميناء؟

٣ انتبه من فهمك

١ أرسم منحني الدالة ص = ٣ جنس

٢ أرسم منحني الدالة ص = ٢ جنس

تمارين ٤ - ٥

أولاً، أكمل ما ياتي:


١ مدى الدالة d حيث $d(\theta) = \sin \theta$ هو

٢ مدى الدالة d حيث $d(\theta) = 2 \sin \theta$ هو


٣ القيمة العظمى للدالة u حيث $u(\theta) = 4 \sin \theta$ هي

٤ القيمة الصغرى للدالة u حيث $u(\theta) = 3 \sin \theta$ هي

ثانياً، اكتب قاعدة كل دالة مثلثية بجوار الشكل المتناظر لها.



شكل (٢) القاعدة هي:



شكل (١) القاعدة هي:

ثالثاً، أجب عن الأسئلة الآتية:

٥ أوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى، ثم احسب المدى لكل دالة من الدوال الآتية:

١ $\sin = \sin \theta$

٢ $\sin = 3 \sin \theta$

٣ $\sin = \frac{2}{3} \sin \theta$

٦ مثل كل من الدوال $\sin = 4 \sin \theta$ ، $\sin = 2 \sin \theta$ باستخدام الآلة الحاسبة الرسمية أو بأحد برامج الحاسوب الرسمية ومن الرسم أوجد:

ب) القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة.

١ مدى الدالة.

إتحاد قياس زاوية بمعلومية إحدى نسبيها المتثلثة

7-8

Finding the Measure of an Angle Given the value of one of its Trigonometric Ratios

سیف لیکن



٦- العاد قاسم (رواية يحيى بن معوية

علمت أنه إذا كانت $\sin \theta = \frac{3}{5}$ فإنه يمكن إيجاد قيمة من بعمولية الزاوية θ .
وعندما تعلق قيمة من فهل يمكن إيجاد قيمة θ ؟



24

فإنه يمكن إيجاد قيم θ إذا علمنا قيمة ص

三

جامعة الملك عبد الله

۲۰

Trigonometric Functions

١) أوجد θ حيث $\theta > 360^\circ$ والتي تحقق كلًا مما يأتى:

$$\text{جـا } \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866 \quad \text{وـ جـا } \theta = \frac{1}{2}$$

$\therefore \gamma\pi\pi = \theta$

150

١- حيث الزاوية <

..الزاوية تقع في الربع الأول أو الثاني.

وامتنان الآلة الحاسبة:

الآن، أنت على دراية بـ**النحو** وال**المorphology**.

الثانية الأولي $\theta = 6^\circ 39'$

الذى يعى بالخارج = θ

ب

الذئبة تقع في الربع الثاني أو الربع

www.al-azhar.org

ويمكن استخدام الألة الحاسبة:

“MAINTAIN YOUR POSITION AND DO NOT TURN BACK.”

مربع اسماي: $\text{Area} = \text{base} \times \text{height}$

هذا سكان التحفة من صحة الحال بارتكاب الآلة الحادة

197

حاول أن تحل


١ أوجد θ حيث $0 < \theta < 360^\circ$ والتي تحقق كلاً ما يأتي:

أ) $\cot \theta = -2,1036$

ب) $\tan \theta = -2,3615$

ج) $\sin \theta = -0,6205$

تحقق من مسلك



١ **الربط بالألعاب الرياضية**: توجد لعبة التزلق في مدينة الألعاب، فإذا كان ارتفاع إحدى العجلات ١٢ متراً وطولها ٥٠ متراً كما في الشكل المجاور، فاكتب دالة مثلثية يمكن استخدامها لإيجاد قيمة الزاوية θ ثم أوجد قيمة هذه الزاوية بالدرجات، لأقرب جزء من ألف.



٢ **سيارات**: يهبط كريم بسيارته أسفل منحدر طوله ٦٠ متراً وارتفاعه ٨٠ متراً، فإذا كان المنحدر يصنع مع الأفق زاوية قياسها θ . أوجد θ بالتقدير الثنائي.




٣ **اكتشف الخطأ**: بسب الرياح انكسرت نخلة طولها ٢٠ متراً، بحيث تأخذ الشكل المجاور، فإذا كان طول الجزء الرأسى منها ٧٠ متراً، والجزء المائل ١٣٠ متراً وكانت θ هي الزاوية التي يصتهرها الجزء المائل مع الأفق. فأوجد θ بالتقدير الثنائى.

إجابة عمر

$$\cot \theta = \frac{12}{7} \\ \therefore \theta = 57^\circ 25' 46''$$

إجابة كريم

$$\tan \theta = \frac{13}{7} \\ \therefore \theta = 62^\circ 34' 44''$$



٤ **التفكير الناقد**: الشكل المجاور يمثل قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين $A(3, 0)$ ، $B(7, 4)$. أوجد قياس الزاوية الممحضة بين \overline{AB} ومحور السينات.

تمارين ٤ - ١

أولاً: الاختيار من متعدد:

- ١ إذا كان $\text{جا } \theta = 4325^\circ$ ، حيث θ زاوية حادة موجبة فإن θ تساوى
- ٢ $46,316^\circ$ ٣ $46,347^\circ$ ٤ $46,388^\circ$
- ٥ $46,626^\circ$ ٦ $46,945^\circ$ ٧ $46,946^\circ$
- ٨ $46,949,000^\circ$ ٩ $46,950^\circ$ ١٠ $46,951,000^\circ$
- ١١ إذا كان $\text{ظا } \theta = 1,8 = 90^\circ > \theta > 360^\circ$ فإن θ تساوى

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

١ إذا قطع الضلع النهائي لزاوية قياسها θ في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب، فأوجد كلاً من جناب θ ، جا θ في الحالات الآتية:

- ١ ب $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$
- ٢ ب $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$
- ٣ ب $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$

٤ إذا قطع الضلع النهائي لزاوية قياسها θ في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب، فأوجد كلاً من قناب θ ، قناب θ في الحالات الآتية:

- ١ ب $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$
- ٢ ب $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$
- ٣ ب $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

٥ إذا قطع الضلع النهائي لزاوية قياسها θ في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب، فأوجد كلاً من ظناب θ ، ظناب θ في الحالات الآتية:

- ١ ب $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$
- ٢ ب $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$
- ٣ ب $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

٦ إذا قطع الضلع النهائي لزاوية قياسها θ في الوضع القياسي دائرة الوحدة في النقطة ب فأوجد: ج(θ)، جناب(θ) حيث $0^\circ < \theta < 360^\circ$ عندما:

- ١ ب $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$
- ٢ ب $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
- ٣ ب $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$

٥ أوجد بالقياس الستيني أصغر زاوية موجبة تحقق كلًا من:

(ج) 60° (ب) 436°

(ج) 600° (د) $1,400^\circ$

(ج) 510° (د) $1,500^\circ$

(ج) 6218° (هـ) 3°

(د) 2364° (هـ) 2°

٦ إذا كانت $0 < \theta < 360^\circ$ فأوجد قياس زاوية θ لكل مما يأتي:

(ج) 642° (ب) 2256°


(ج) 1407° (د) 210°

(ج) 180° (د) 90°

٧ إذا كان $\text{جا } \theta = \frac{1}{3}$ وكانت $0 < \theta < 180^\circ$




أ) احسب قياس زاوية θ لأقرب ثانية

ب) أوجد قيمة كلٍ من: $\text{جتا } \theta$ ، $\text{ظتا } \theta$ ، $\text{قا } \theta$.



٨ سلام: سلم علوه ٤ أمتار يستند على جدار فإذا كان ارتفاع السلم عن سطح الأرض يساوي ٣ أمتار فأوجد بالراديان زاوية ميل السلم على الأفقي.

٩ أوجد قياس زاوية θ بالقياس الستيني في كل شكل من الأشكال الآتية:



ملخص الوحدة

الزاوية الموجبة: هي زوج مترتب من شعاعين (\overrightarrow{OA} ، \overrightarrow{OB}) بما صلما الزاوية، لهما نقطة بداية واحدة هي رأس الزاوية، ويسمى $\angle A$ الضلع الابتدائي، \overrightarrow{OB} الضلع النهائي للزاوية.



الوضع القياسي للزاوية: في نظام إحداثي متعامد تكون رأس الزاوية هي نقطة الأصل، وضلعها الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات.

الزوايا المتكافلة: هي الزوايا التي قياساتها على الصورة $(\theta + n \times 360^\circ)$ حيث $n \in \mathbb{Z}$ ، حيث يكون لها نفس الضلع النهائي.

الزاوية النصف قطرية: هي الزاوية المركزية في الدائرة وتنطبق قوساً طوله يساوي طول نصف قطر الدائرة.

العلاقة بين القياس المستوي وال دائري: إذا كانت لدينا زاوية قياسها المستوي يساوي s° وفياسها الدائري يساوي θ فإن:

$$\theta = s^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} \quad s^\circ = \theta \times \frac{180^\circ}{\pi}$$

طول القوس: إذا كان θ هو قياس الزاوية المركزية لدائرة طول نصف قطرها من تقابل قوساً من الدائرة طوله L فإن: $L = \theta \times r$

الزاوية الرابعة: هي زاوية في الوضع القياسي، بحيث يقع ضلعها النهائي على أحد المحورين س أو جن.

دائرة الوحدة: هي دائرة مرسومة في المستوى الإحداثي، ومركزها نقطة الأصل، وطول نصف قطرها واحدة ووحدة واحدة.

النسبة المثلثية: هي نسبة بين طولي ضلعين من أضلاع المثلث القائم الزاوية.

10 اشارات الدوال المثلثية:

للحظة أن:

الربع الرابع:	الربع الثالث:	الربع الثاني:	الربع الأول:
$270^\circ < \theta < 360^\circ$ جنا θ ، قا θ موجبة وباقى الدوال سالبة.	$180^\circ < \theta < 270^\circ$ ظنا θ ، ظنا θ موجبةان وباقى الدوال سالبة.	$90^\circ < \theta < 180^\circ$ جا θ ، قتا θ موجبةان وباقى الدوال سالبة.	$0^\circ < \theta < 90^\circ$ كل الدوال المثلثية موجبة

اختبارات عامة

(الجبر وحساب المثلثات)

الاختبار الأول

السؤال الأول : أختير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعلقة:

١ إذا كان L , M جذري المعادلة $s^3 - 7s + 2 = 0$ فإن $L + M =$

٧٩ ٣

٥٨ ٤

٧ ١

٢ إذا كانت $\theta = 1^\circ$, $\sin \theta =$ فإن θ تساوي

$\pi/2$ ٣

$\pi/4$ ٤

π ٥

$\pi/4$ ٦

٣ المعادلة التربيعية التي جذراها -2 , 2 , 3 هي

٤ $s^3 + 4s^2 + 13s + 12 = 0$ ١ $s^3 + 4s^2 + 13s + 12 = 0$ ٢ $s^3 + 4s^2 + 13s - 12 = 0$ ٣ $s^3 - 4s^2 + 13s - 12 = 0$ ٤

٤ إذا كان أحد جذري المعادلة $s^2 - (m+2)s + 2 = 0$ معكوساً جمعياً للجذر الآخر فإن m تساوي

$2 - 3$ ٣

$2 - 4$ ٤

2 ٥

السؤال الثاني : أكمل

١ الدالة d : حيث $d(s) = -(s-1)(s+2)$ موجبة في الفترة

٢ الزاوية التي قياسها 930° تقع في الربع

٣ إذا كان $\sin \theta = \frac{1}{2}$, $\cos \theta =$ فإن θ تساوي

٤ المعادلة التربيعية التي جذراها ضعف جذري المعادلة $2s^2 - 8s + 8 = 0$ هي

السؤال الثالث :

١ ضع العدد $\frac{2}{3} + \frac{1}{2}i$ في صورة عدد مركب، حيث $i^2 = -1$.

٢ إذا كان $z = 3 - 2i$ موجود، حيث $z = 3 + 2i$

السؤال الرابع :

١ إذا كانت $d : x \mapsto 4x - s^2 - 15$ حيث $d(s) = -s^2 - 8s - 15$

٢ **أولاً :** ارسم منحني الدالة في الفترة $[7, 11]$. ثانياً: عين من الرسم إشارة هذه الدالة.

٣ إذا كان $s = 3 + 2t$, $x = \frac{1-t}{1+t}$ فأوجد x في صورة عدد مركب.

السؤال الخامس :

١ أوجد مجموعة حل المتباينة $s^2 + 2s - 1 > 0$.

٢ إذا كان طلاب $= \frac{2}{3}$ حيث $180^\circ < B < 270^\circ$ فأوجد قيمة $\sin(360^\circ - B) - \sin(90^\circ - B)$.

اختبارات عامة

(الجبر وحساب المثلثات)

الاختبار الثاني

السؤال الأول: أكمل ما يأتي

أبسط صورة للعدد التخيلي $i^2 =$ ①

إذا كان جذراً المعادلة $s^2 - 6s + l = 0$ - حقيقيان ومتاوياً فإن $l =$ ②

إذا كان $0 < \theta < 90^\circ$ وكان $\sin \theta = \frac{1}{2}$ فإن $\cos(\pi - \theta) =$ ③

عند الدالة d حيث $d(\theta) = \frac{1}{\theta} \sin \theta$ هو ④

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعلقة :

المعادلة: $s(s-1)(s+1) = 0$ من الدرجة: ①

أ الأولى ب الثانية ج الثالثة د الرابعة ②

إذا كان جذراً المعادلة $s^2 - 3s - m = 0$ - حقيقيان و مختلفان فإن m تساوى: ③

أ 1 ب 2 ج 3 د 4 ④

إذا كان مجموع قياسات زوايا أي مضلع منتظم تساوى $180(n-2)$ حيث n عدد الأضلاع فانتساب زاوية المثلمن المنتظم بالقياس الدائري تساوى:

أ $\frac{\pi}{3}$ ب $\frac{\pi}{4}$ ج $\frac{\pi}{5}$ د $\frac{\pi}{6}$ ⑤

أ $\frac{\pi}{3}$ ب $\frac{\pi}{4}$ ج $\frac{\pi}{5}$ د $\frac{\pi}{6}$ ⑥

أ $\frac{\pi}{3}$ ب $\frac{\pi}{4}$ ج $\frac{\pi}{5}$ د $\frac{\pi}{6}$ ⑦

أ $\frac{\pi}{3}$ ب $\frac{\pi}{4}$ ج $\frac{\pi}{5}$ د $\frac{\pi}{6}$ ⑧

إذا كان $2 \sin \theta = \sqrt{3}$ ، $\pi > \theta > 0$ فإن $\cos(\pi - \theta)$ يساوى ⑨

أ $\frac{\pi}{6}$ ب $\frac{\pi}{4}$ ج $\frac{\pi}{5}$ د $\frac{\pi}{3}$ ⑩

أ $\frac{\pi}{6}$ ب $\frac{\pi}{4}$ ج $\frac{\pi}{5}$ د $\frac{\pi}{3}$ ⑪

أ $\frac{\pi}{6}$ ب $\frac{\pi}{4}$ ج $\frac{\pi}{5}$ د $\frac{\pi}{3}$ ⑫

السؤال الثالث :

أ وجد قيمة k التي تجعل أحد جذري المعادلة: $4k^2s^2 + 7s + k + 4 = 0$ هو المعکوس الضربى للجذر الآخر.

ب إذا كان $\sin \theta = \cos(75^\circ)$ فإن $\theta = 300^\circ + 60^\circ$ حيث $0 < \theta < 360^\circ$ فأوجد $\cos(\pi - \theta)$.

السؤال الرابع :

أولاً: أوجد قيمتي a ، b اللتين تحققان المعادلة: $12 + 13a + 4b = 27$ - ت

ثانياً: أوجد في ح مجموعة حل المتباعدة: $s(s+1) = 2 - 4$.

ب زاوية مركزية قياسها θ مرسومة في دائرة طول نصف قطرها 18 سم وتحصر قوساً طوله 26 سم. أوجد θ بالقياس الثنائي.

السؤال الخامس :

إذا كان مجموع الأعداد الصحيحة المتالية $(1+2+3+\dots+n)$ يعطى بالعلاقة $S = \frac{n}{2}(n+1)$ فكم عدداً صحيحاً متالياً يدهما من العدد 1 يكون مجموعها مساوياً 210.


ب إذا كان $\sin s = \frac{1}{2}$ حيث $0 < s < 180^\circ$ فأوجد $\cos(180^\circ - s) + \cos(270^\circ - s) + \cos(360^\circ - s)$.

اختبارات عامة

(الهندسة)

الاختبار الثالث

السؤال الأول: أكمل ما يأتي



المضلعان الشابهان ثالث يكونان

في الشكل المقابل :

$$\text{أولاً: } (ab)'' = ab \times \quad , \quad (jcd)'' = jc \times \quad$$

$$\text{ثانياً: } j \times jc = \quad$$

$$\text{ثالثاً: } ab \times bc = \quad \times \quad$$

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ مستطيلان متشابهان الأول طوله ٦ سم والثاني طوله ١٠ سم، فإن النسبة بين محیط الأول إلى محیط الثاني يساوى:

١ : ٤ ٣




٤ : ١ ٤

٣ : ١ ٤

٢ : ١ ١

١ : ٤ ١

٢ أي من المثلثين الآتيين متشابهين؟



(١), (٣) ٣

(٢), (١) ٤

(٤), (٢) ٤

(١), (٤) ١

٣ إذا كانت النسبة بين محیط مثليثين متشابهين ١ : ٤ فإن النسبة بين مساحتى سطحهما تساوى

١٦ : ١ ٣

٨ : ١ ٤

٤ : ١ ٤


٢ : ١ ١

١ : ٤ ١

٤ في الشكل المقابل: كل التعبيرات الرياضية التالية صحيحة ماعدا العبارة:

أ (ab)'' = ab × أ ب (ab)'' = ab × أ و

ب ab × أ = ab × أ و (ab)'' = ab × ه و



السؤال الثالث:


١ في الشكل المقابل: $\triangle ABC \sim \triangle AED$ أثبت أن: $\frac{AB}{ED} = \frac{BC}{ED}$

وإذا كان: $AB = 4$ سم، $ED = 2$ سم، $BC = 1,5$ سم، $ED = 0,5$ سم.
أوجد طول كل من AE ، ED .

٢ أب ج مثلث، $\angle B = 5$ درجة، $\angle C = 2$ درجة، $\angle A = 4$ درجة بحيث $AB = 2$ سم، $BC = 4$ سم.
أثبت أن $\triangle ABC \sim \triangle AED$ ثم أوجد النسبة بين مساحتى سطحهما

اختبارات عامة

السؤال الرابع :



١ في الشكل المقابل: في $\triangle ABC$ = في $\triangle JHG$


أو $A=4$ سم ، $B=5$ سم ، $C=6$ سم ، $HG=3$ سم
أوجد طول كل من: JB ، BG

٢ $JG = BG = ()$

$AJ=2$ سم ، $BG=2$ سم ، أو $7,5$ سم
أوجد طول HG و

السؤال الخامس :

١ او متوسط في المثلث ABC ، نصفت $\triangle ABC$ بمنصف قطع AD في BC ، نصفت $\triangle ABC$ بمنصف
قطع AE في BC ، رسم ED ، أثبت أن $ED \parallel BC$



٢ في الشكل المقابل:


$AB \parallel ED$ ، $AH=8$ سم ، $GH=12$ سم ، $GD=6$ سم ،
 $BM=4$ سم ، $DM=6$ سم
أولاً: أوجد طول BG
ثانياً: أثبت أن: $DM \parallel GH$

(الهندسة)

الاختبار الرابع

السؤال الأول : أكمل ما يأتي


١ أي مضلعين متاظلين لهما نفس عدد الأضلاع يكونان



٢ في الشكل المقابل:

إذا كان المثلث $\triangle ABC \sim \triangle AED$
فإن في $\triangle ABC$ = في $\triangle AED$


٣ إذا تناطع المستقيمان الحاويان للوترين ED ، BC في نقطة N فإن: $NE = NC$ ، $ND = NB$



٤ في الشكل المقابل: إذا كان $AJ=3$ سم ، $JG=9$ سم فإن $AB=$

السؤال الثاني: أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١ أي من المضلعين الآتيين متسابقين؟




اختبارات عامة

- ١ المثلثان (١) ، (٢) ٢ المثلثان (١) ، (٣) ٣ المثلثان (٢) ، (٤)

٤ إذا كانت النسبة بين مساحتي سطхи مثلثين متباينين $16 : 25$ فإن النسبة بين طولين ضلعين متباينين فيما تساوى: ١ $4:16$ ٢ $25:16$ ٣ $5:4$ ٤ $16:16$


٥ في الشكل المقابل: جميع التعبيرات الرياضية التالية صحيحة ما عدا التعبير:



$$\begin{array}{ll} \text{أ} \quad \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} & \text{ب} \quad \frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC} \\ \text{ج} \quad \frac{AD}{AB} = \frac{DE}{AC} & \text{د} \quad \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{BC} \end{array}$$



٦ في الشكل المقابل: طول مع تساوى: ١ 3.6 سم ٢ 4 سم ٣ 4.2 سم




٧ في الشكل المقابل: $\triangle ABD \sim \triangle ACD$ أثبت أن الشكل بـ جـ رباعي دائري وإذا كان $AD = 3$ سم، $BD = 2$ سم، $DC = 2.5$ سم، أوجد طول جـ.

٨ $\triangle ABC$ شكل رباعي تقاطع قطراته في هـ. رسم هـ \parallel جـ و يقطع آبـ في و رسم هـ \parallel جـ و يقطع آدـ في مـ. أثبت أن $WM \parallel BD$.

السؤال الرابع:

٩ في الشكل المقابل: في $(\triangle ABC)$ $\angle B = 90^\circ$ ، $AC \perp BC$ ، $AB = 4.5$ سم، $BC = 6$ سم. أوجد طول كل من بـ، جـ، آدـ، آجـ.

١٠ $\triangle ABC$ شكل رباعي فيه $BG = 27$ سم، $AB = 12$ سم، $BG = 12$ سم، $AG = 18$ سم، أثبت أن $\triangle BAG \sim \triangle ACD$ و أوجد النسبة بين مساحتى سطحيهما.



١١ في الشكل المقابل: آبـ مماس للدائرة، جـ متصرف آدـ $AB = 26$ سم أوجد طول آجـ

١٢ $\triangle ABC$ مثلث فيه $AB = 8$ سم، $AC = 12$ سم، $BC = 15$ سم، AD ينصف $\angle A$ و يقطع بـ \parallel جـ في هـ، ثم رسم هـ \parallel بـ و يقطع آجـ في هـ، أوجد طول كل من بـ، جـ، هـ.

المواصفات الفنية:

٢١٢	رقم الكتاب:
٦٨ (٨٢ × ٥٧) سم	مقاس الكتاب:
٤ ألوان	طبع المتن:
٤ ألوان	طبع الغلاف:
٧٠ جم أبيض	ورق المتن:
١٨٠ جم كوشيه	ورق الغلاف:
١٧٢ صفحة	عدد الصفحات بالغلاف:

<http://elearning.moe.gov.eg>

الأشراف برننج هاوس