



# الكيمياء

12

الصف الثاني عشر  
الفصل الدراسي  
الأول





# الكيمياء

الصف الثاني عشر - كتاب الأنشطة والتجارب العملية

الفصل الدراسي الأول

12

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

تيسير أحمد الصبيحات

بلال فارس محمود

جيالة محمود عطية

منهاجي  
متعة التعليم الاهداف



الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسُرُّ المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

โทรศัพث: 06-5376262 / 237 | البريد الإلكتروني: 06-5376266 | العنوان: P.O.Box: 1930 Amman 1118

الفيسبوك: @nccdjour | البريد الإلكتروني: feedback@nccd.gov.jo | الموقع الإلكتروني: www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (3) 2022/5/12 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (25) 2022/5/29 م، تاريخ 2022/5/29 م بدءاً، من العام الدراسي 2022 / 2023 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2021.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan  
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

**ISBN: 978 - 9923 - 41 - 479 - 8**

المملكة الأردنية الهاشمية  
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:  
(2023/5/2594)

375.001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الكيمياء: الصف الثاني عشر: كتاب الأنشطة والتجارب العملية (الفصل الدراسي الأول)/ المركز الوطني لتطوير  
المناهج.- عمان: المركز، 2023  
(28) ص.

ر.إ.: 2023/5/2594

الوصفات: تطوير المناهج/ / المقررات الدراسية/ / مستويات التعليم/ / المناهج/  
يتحمّل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مُصَنَّفه، ولا يُعبّر هذا المُصَنَّف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise , without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data  
A catalogue record for this publication is available from the Library.

1443 هـ / 2022 م  
1444 هـ / 2023 م

الطبعة الأولى (التجريبية)  
أعيدت طباعته

# قائمة المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
الوحدة الأولى: الحُموضُ والقواعدُ وتطبيقاتُها	
4	تجربة استهلالية: خصائصِ الحِمضِ والقاعدة
6	مقارنةُ قوَّةِ الحُموض
8	معاييرُ حِمضِ قويٍ بقاعدةٍ قويَّةٍ
10	تَكُونُ الأَمْلاَحِ
13	أسئلة تفكير
الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية	
15	تجربة استهلالية: تفاعل بعض الفلزات مع حمض الهيدروكلوريك HCl
17	مقارنة جهود بعض الحلول الجلفانية
20	مقارنةُ قوَّةِ بعض العوامل المختزلة
23	التحليل الكهربائي لمحاليل بعض المركبات الأيونية
26	أسئلة تفكير

## الخلفية العلمية:

تدخل الحموض في تكوين كثير من المواد الغذائية، مثل الليمون والجريب فروت وغيرها، وقد تعرّفتُ عدداً من خصائص هذه الحموض؛ فهي ذات طعم لاذع، وتأثير في الكواشف، سواء الصناعية أو الطبيعية؛ فهي تغيّر لونَ ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى اللون الأحمر. وللقواعد خواص تميّزها عن غيرها من المواد، فهي ذات طعم مرّ، وملمس زلق، كما أنها تغيّر لونَ ورقة تباع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق. ويُستفادُ من هذه الخصائص في تمييز محلول الحمض عنِ محلول القاعدي.

## الهدف من التجربة: أتعرّفُ بعض خصائص الحموض والقواعد.

### المواد والأدوات:

محلول حمض الهيدروكلوريك HCl تركيزه 0.1 M، محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH تركيزه 0.1 M، أنابيب اختبار عدد 3، حامل أنابيب، أوراق الكاشف العام، مِخار مُدرَج، ميزان حرارة، كأس زجاجية، ماء مُقطَر.

### إرشادات السلامة:

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أرتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أحذر استنشاق حمض الهيدروكلوريك، ولمس محلول هيدروكسيد الصوديوم.

### خطوات العمل:

1. أقيس: أستخدم المِخار المُدرَج في قياس 3 mL من محلول حمض الهيدروكلوريك، ثم أضعها في أنابيب اختبار وأرقمها (1).



2. أقيس درجة حرارة محلول باستخدام ميزان الحرارة، وأسجلها.

3. ألاحظ: أغمس ورقة الكاشف العام في محلول، وألاحظ تغيير لونها، وأسجله.



4. أقيس: أستخدم المِهْبَرَ المُدَرَّجَ في قياس 3 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم، ثم أضعها في أنبوب اختبار آخر وأرقمه (2).

5. أكّرر الخطوتين (3,2) لمحلول هيدروكسيد الصوديوم، وأسجّل النتائج.

6. أجرّب: أسكب محتويات الأنبوب (1) في كأس زجاجية، وأضيف إليها تدريجيًّا محلول هيدروكسيد الصوديوم من الأنبوب (2)، ثم أكّرر الخطوتين (3,2) لمحتويات الكأس الزجاجية، وأسجّل النتائج.

### **التحليل والاستنتاج:**

1. أحدّد التغيير الذي يطرأ على لون ورقة الكاشف عند وضعها في محلول كلٌ من حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم.


2. أقدر الرَّقم الهيدروجيني (درجة الحموضة) لكلٍ من محلولين.

3. أفسّر اختلاف درجة حرارة محلول الناتج من خلط محلولين عن درجة حرارة كلٍ منهما.

4. أقدر الرَّقم الهيدروجيني للمحلول الناتج من خلط محلولين في الكأس الزجاجية.

الخلفية العلمية:

تنفاوت الحموض في قدرتها على التأين في الماء، أي قدرتها على إنتاج البروتون أو منحه، ويمكن مقارنة قوة الحموض بالاعتماد على توصيل محليلها للتيار الكهربائي؛ فبعضها يتآين كلياً ويكون محلولها موصلًا جيدًا للتيار الكهربائي، ويعبر عن تآينها في الماء، كما في المعادلة الآتية:



أما الحموض الضعيفة فتتأين جزئيًا، وتكون نسبة الأيونات الناتجة قليلة جدًا، ثم إن قدرة محليلها على توصيل التيار الكهربائي تكون ضعيفة، ويمكن التعديل عن تآينها في الماء، كما في المعادلة الآتية:



**الهدف من التجربة:** أقارن قوة الحمض القوي بالحمض الضعيف.

**المواد والأدوات:**

محلول حمض الهيدروكلوريك HCl؛ تركيزه 0.1 M، محلول حمض الإيثانويك CH<sub>3</sub>COOH تركيزه 0.1 M، كأس زجاجية سعة 50 mL عدد 2، أسلاك توصيل، جهاز أميتر، مصدر كهربائي، مخبر مدرج سعة 50 mL، جهاز مقياس الرقم الهيدروجيني أو أوراق الكاشف العام، شريط مغنسيوم، أقطاب جرافيت.

**إرشادات السلامة:**

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أرتد معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أحذر استنشاق حمض الهيدروكلوريك.

**خطوات العمل:**

1. أحضر الكأسين الزجاجيتين، وأكتب على كلّ منهما اسم أحد محلولين.
2. أقيس باستخدام المخبر المدرج 20 mL من محلول HCl، وأضعها في الكأس المخصصة لها.



3. أقيسُ باستخدام جهاز مقياس الرّقم الهيدروجيني أو ورق الكاشف العام الرّقم الهيدروجيني للمحلول، وأسجّل نتائجي.

4. أجرّب: أصلُّ أقطابَ الجرافيت بالمصدر الكهربائي وجهاز الأميتر، وأضعُها في محلول HCl، وأسجّل قراءة الأميتر.

5. الاحظ: أغمسُ شريط مغنيسيوم طوله 2 cm في محلول، وألاحظ سرعة تصاعد غاز الهيدروجين، وأسجّل ملاحظاتي.

6. أجرّب: أكّرُ الخطوات السابقة لمحلول حمض الإيثانويك  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ، وأسجّل ملاحظاتي.



### التحليل والاستنتاج:

1. أحدّدُ الرّقم الهيدروجيني لكُلِّ منَ محلولين.

2. أحدّدُ المحلول الأكثَر قدرًا على التوصيل الكهربائي.

3. أقارنُ سرعة تصاعد غاز الهيدروجين في كُلِّ منَ محلولين.

4. أحدّدُ الحِمض الأقوى والحمض الأضعف.

5. أستنتجُ العلاقة بين قوّة الحِمض وكُلِّ منَ الرّقم الهيدروجيني، والتوصيل الكهربائي، وسرعة تصاعد الغاز.

الخلفية العلمية:

تعرف المعايرة بأنها الإضافة التدريجية لمحلول قاعدة معلوم التركيز إلى محلول حمض مجهول التركيز أو العكس، وَتُستخدم لتحديد تركيز مجهول لأيٍّ من المحلولين، فعند إضافة محلول قاعدة إلى محلول حمضٍ تتعادل أيونات  $\text{H}_3\text{O}^+$  من الحمض مع أيونات  $\text{OH}^-$  من القاعدة في ما يُعرف بتفاعل التعادل، ولتحديد نهاية عملية المعايرة؛ يُستخدم كاشفٌ مناسب يتغير لونه عند تعادل الحمض مع القاعدة في ما يُسمى بنقطة التعادل، ويحدد انتهاء المعايرة، وعندها يكون عدد مولات أيونات الهيدروجين  $\text{H}^+$  من الحمض مكافئًا تماماً لعدد مولات أيونات الهيدروكسيد  $\text{OH}^-$  من القاعدة؛ أي أنَّ:

$$n_{(\text{acid})} = n_{(\text{base})}$$

$$M_a \times V_a = M_b \times V_b$$

وباستخدام هذه العلاقة يمكن حساب تركيز المجهول من الحمض أو القاعدة.

**الهدف من التجربة:** أحسب تركيز حمض مجهول بمعاييرته بمحلول قاعدة معلومة التركيز.

**المواد والأدوات:**


محلول حمض الهيدروكلوريك  $\text{HCl}$  مجهول التركيز، محلول هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$ ، تركيزه  $0.2 \text{ M}$ ، كاشف الفينولفاتلين، دورق مخروطي  $250 \text{ mL}$ ، سحاحة، مخار مدرج، قطارة، حامل فلوري، قمع زجاجي.

**إرشادات السلامة:**

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أرتدى معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أتعامل مع محلول الحمض ومحلول القاعدة بحذر.

**خطوات العمل:**

1. أُجّرب: أثبت السحاحة على الحامل، كما في الشكل.
2. أُجّرب: أملأ السحاحة باستخدام القمع بمحلول هيدروكسيد الصوديوم إلى مستوى الصفر.



3. أقيسْ باستخدام المخارب المُدَرَّجِ، mL 20 من محلول الْحِمْض HCl مجهول التركيز، وأضعُها في الدورق المخروطي.

4. أضيفْ باستخدام القطارة 3-4 قطرات من كاشف الفينولفثالين إلى محلول الْحِمْض.

5. أضعْ الدورق المخروطي المحتوي على محلول الْحِمْض أسفل السحّاحة، كما في الشكل.

6. ألاحظْ: أبدأ بـإضافة محلول القاعدة من السحّاحة تدريجيًّا وبيطء إلى محلول الْحِمْض، وأمزجْ محلول بـتحريك الدورق دائريًّا، وألاحظ تغيير لون محلول، وأسجّل ملاحظاتي.

7. أضبط المتغيرات. أتوقف عن إضافة محلول القاعدة عند النقطة التي يثبتُ عنها ظهورُ لونٍ زهري في محلول الْحِمْض، وأسجّل حجمَ محلول القاعدة المُضاف.



### التحليل والاستنتاج:

1. ماذا أسمى النقطة التي يحدثُ عنها تغيير لون محلول؟

2. أحسب عدد مولات القاعدة NaOH المُضاف.

3. أستنتج عدد مولات الْحِمْض المستخدمة.

4. أحسب تركيز الْحِمْض HCl.

5. أتوقع الرقم الهيدروجيني للمحلول الناتج من عملية المعايرة.

6. أصنف التفاعل الحادث بين الْحِمْض والقاعدة.

الخلفية العلمية:

الأملاح موادًّا أيونيةً تفكك عند إذابتها في الماء إلى أيونات سالبة وأخرى موجبة تتحرّك في محلول، ويمكن لبعض هذه الأيونات أن تتفاعل مع الماء منتجة أيونات الهيدرونيوم  $\text{H}_3\text{O}^+$  في محلول، أو أيونات الهيدروكسيد  $\text{OH}^-$  في ما يُعرف بعملية التمييـه، فعند تـميـه الأـيونات المـوجـبة مثل  $\text{NH}_4^+$  تـنتـج أيـونـات  $\text{H}_3\text{O}^+$  في المـحلـول؛ وبـذـلـك يـقـلـ الرـقمـ الهـيدـروـجيـنيـ للمـحلـولـ، ويـكونـ تـأـثـيرـ محلـولـ المـلحـ حـمـضـيـاـ، والـمعـادـلةـ الـآـتـيـةـ توـضـحـ ذـلـكـ:



أمـاـ عـنـدـ تـمـيـهـ الأـيـونـاتـ السـالـبـةـ، مـثـلـ  $\text{HCOO}^-$ ؛ فـتـنـتـجـ أيـونـاتـ  $\text{OH}^-$  فـيـ المـحلـولـ، وبـذـلـكـ يـزـدـادـ الرـقمـ الهـيدـروـجيـنيـ للمـحلـولـ، ويـكونـ تـأـثـيرـ محلـولـ المـلحـ قـاعـديـاـ، والـمعـادـلةـ الـآـتـيـةـ توـضـحـ ذـلـكـ:



وـبـهـذـاـ نـجـدـ أـنـ لـمـحـالـيلـ الـأـمـلـاحـ تـأـثـيرـ حـمـضـيـاـ أوـ قـاعـديـاـ، وـقـدـ لاـ يـحـدـثـ تـمـيـهـ لـأـيـيـ منـ الأـيـونـاتـ النـاتـجـةـ مـنـ تـفـكـكـ المـلحـ، ثـمـ يـكـونـ تـأـثـيرـ محلـولـ المـلحـ مـتـعـادـلاـ.

**الهدف من التجربة:** أستقصي التأثير الحمضي أو القاعدي لمحاليل الأملاح.

المواد والأدوات:



كمـيـاتـ منـاسـبـةـ منـ الـأـمـلـاحـ الـآـتـيـةـ: كـلـورـيدـ الصـودـيـومـ  $\text{NaCl}$ ، كـلـورـيدـ الـأـمـونـيـومـ  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ، كـرـبـونـاتـ الصـودـيـومـ  $\text{NaHCO}_3$ ، إـيـاثـانـوـاتـ الصـودـيـومـ  $\text{CH}_3\text{COONa}$ ، محلـولـ الكـاـشـفـ العـامـ، كـأسـ زـجاـجيـةـ 100 mL عـدـدـ (5)، قـطـعـ وـرـقـ لـاصـقـ، مـاءـ مـقـطـرـ، قـطـارـةـ، مـلـعـقـةـ تـحـريـكـ، مـيزـانـ حـسـاسـ، مـخـبـارـ مـدـرـاجـ.

إرشادات السلامة:



- أـتـبـعـ إـرـشـادـاتـ السـلـامـةـ الـعـامـةـ فـيـ المـختـبرـ.
- أـرـتـديـ معـطـفـ المـختـبـرـ وـالـنـظـارـاتـ الـواـقـيـةـ وـالـقـفـازـاتـ.
- أـتـعـاملـ مـعـ الـمـوـادـ الـكـيـمـيـائـيـةـ بـحـذرـ.



## خطوات العمل:

1. أكتب اسم كل ملح وصيغته الكيميائية على قطعة الورق اللاصق وألصقها على أحد الكؤوس، ثم أصق على الكأس الأخيرة ورقة كتب عليها ماء مقطّر.
2. أقيس: أضع باستخدام المخارب المدرج mL 20 من الماء المقطّر في كل كأس زجاجية.
3. ألاحظ: أضيف باستخدام القطرة قطرتين من محلول الكاشف العام إلى كل كأس زجاجية، وأحرّكها باستخدام ملعقة التحريك. ألاحظ لون محلول وأسجله في جدول البيانات.
4. أقيس g 3 من ملح كلوريد الأمونيوم  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ، وأضيفها إلى الكأس المخصصة لها، ثم أحرّك محلول، وأسجل اللون الذي يظهر فيه في جدول البيانات.
5. ألاحظ. أكرر الخطوة (4) مع بقية الأملاح في الكؤوس الأخرى، وألاحظ تغيير ألوان المحاليل، وأسجل ملاحظاتي في جدول البيانات.

- جدول البيانات:

$\text{CH}_3\text{COONa}$	$\text{NaHCO}_3$	$\text{NH}_4\text{Cl}$	$\text{NaCl}$	المحلول
				لون محلول بعد إضافة الكاشف
				pH المتوقع
				تأثير محلول (حمضي، قاعدي، متعادل)



## التحليلُ والاستنتاج:

1. أَصِفُّ ألوانَ محليلِ الأملاحِ في التجربةِ بعد إضافةِ الكاشفِ لِكُلِّ منها.
2. أُفْسِرُ تشابهَ لونِ محلولِ كلوريدِ الصوديومِ  $\text{NaCl}$ ، بعد إضافةِ الكاشفِ لِكُلِّ منها، ولونِ محلولِ الكاشفِ في الماءِ المُقطَّرِ.
3. أَصَنِّفُ محليلَ الأملاحِ في التجربةِ إلى حمضيةٍ أو قاعديَّةٍ أو متعادلةٍ.
4. أتوقعُ قيمةَ  $\text{pH}$  لِكُلِّ محلولٍ في التجربةِ بالاعتمادِ على الألوانِ المعياريةِ للكاشفِ العامِ في محليلاتِ المختبرِ.
5. أُفْسِرُ: أكتبُ معادلةً كيميائيةً أُفْسِرُ بها السلوكَ الحمضيَّ أو القاعديَّ لِكُلِّ محلولٍ.

# أسئلة تفكير

تركيز محلول M	$[OH^-]M$	القاعدة
0.1	$1 \times 10^{-5}$	A
0.01	$1 \times 10^{-3}$	B
1	$1 \times 10^{-5}$	C

١) يُبيّن الجدول المجاور ثلاثة محاليل لقواعد ضعيفة مختلفة التركيز، أدرسها، ثم أجيئ عن الأسئلة الآتية:

أ) أَرْتُبُ الْقَوَاعِدَ حَسْبَ قِيمِ ثَابِتٍ تَائِيْنَهَا K<sub>b</sub>.

ب) أحسب الرَّقم الهيدروجيني لمحلول القاعدة A.

ج) أَحَدُّ الملح الذي له أَقْلَى رَقْم هيدروجيني؛  $\text{AHCl}$  أم  $\text{BHCl}$ .

د) أحسب الرقم الهيدروجيني لمحلول مكون من القاعدة C والملح CHCl، تركيز كلٍّ منها M، 0.2

عند إضافة mol 0.01 من الحِمْض HCl إلى L 0.5 من المَحْلُول.

2) محلول منظم يتكون من القاعدة  $\text{CH}_3\text{NH}_2$ , تركيزها؛ 0.2 M، والملح  $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$ , تركيزه؛ 0.4 M.

علمًا أنَّ  $Mr_{(HI)} = 128 \text{ g/mol}$  ،  $\log 4.4 = 0.64$  ،  $K_b = 4.4 \times 10^{-4}$  (أهمَّ تغيير الحجم).

أحسب ما يأتي:

أ ) قيمة  $pH$  للمحلول.

ب) كتلة الحِمض  $\text{HI}$  اللازم إضافتها إلى  $800 \text{ mL}$  من المحلول لتصبح  $\text{pH} = 10$ .

3) محلول منظم يتكون من الحِمض  $\text{HNO}_2$  تركيزه  $0.3 \text{ M}$  والمُلح  $\text{KNO}_2$  تركيزه  $0.2 \text{ M}$  (أهمل تغيير  
الحجم). أحسب:

أ) قيمة pH للمحلول. علمًا أنّ  $K_a = 4.5 \times 10^{-4}$

ب) قيمة pH للمحلول السابق إذا أضيف 0.1 mol من الحمض HCl إلى لتر منه.

ج) عدد مولات  $\text{NaOH}$  اللازم إضافتها إلى  $1\text{ L}$  من المحلول ليصبح  $\text{pH} = 4$ .

4) جرى تحضير محلول منظم من الحِمض  $\text{H}_2\text{CO}_3$  والمُلح  $\text{NaHCO}_3$  بالتركيز نفسه، فكان

أُجِيبُ عن الأسئلة الآتية:  $[H_3O^+] = 4.3 \times 10^{-7} M$

أ) أحسب قيمة ثابت التأين  $K_a$  للحمض  $\text{H}_2\text{CO}_3$ .

ب) أكتب صيغة الأيون المشترك.

ج) أحسب النسبة  $\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]}$  لتكون قيمة pH للمحلول تساوي 7.45، وهي القيمة المناسبة ليؤدي

. الدُّمُ وظيفته في الجسم (علَماً أنَّ  $\log 3.55 = 0.55$ ) .

# أسئلة تفكير

5) أذيب 1.12 g من القاعدة KOH في كمية من الماء حتى أصبح حجم محلول L 1، فإذا لزم 14 mL من هذا محلول للتعادل مع 20 mL من محلول الحمض HCl؛ أحسب تركيز محلول HCl (الكتلة المولية للقاعدة KOH = 56 g/mol)

6) اعتماداً على الجدول المجاور الذي يبيّن قيم ثابت التأين ( $K_a$ ) لعدد من الحموض الضعيفة بالتركيز نفسه 0.25 M؛ أجب عن الأسئلة الآتية:

قيمة $K_a$	صيغة الحمض
$3.2 \times 10^{-8}$	HA
$7.5 \times 10^{-3}$	HB
$4.0 \times 10^{-10}$	HC
$6.3 \times 10^{-5}$	HD

1 - أي من محاليل هذه الحموض له أقل قيمة pH؟

2 - أَحَدُ الزوجين المترافقين من الحمض والقاعدة عند تأين حمض HD في الماء.

3 - أي من محاليل أملاح البوتاسيوم لهذه الحموض له أقل قيمة pH؟

4 - أتوقع الجهة التي يرجحها الاتزان في التفاعل الآتي:  $\text{HA}_{(aq)} + \text{D}^-_{(aq)} \rightleftharpoons \text{HD}_{(aq)} + \text{A}^-_{(aq)}$

5 - أحسب قيمة pH لمحلول الحمض HC.

7) حضر محلول منظم من القاعدة الضعيفة (B) التي تركيزها 0.3 M والملح (BHCl) بالتركيز نفسه، فإذا علمت أن  $K_b = 2 \times 10^{-4}$  ، أجب عن الأسئلة التالية:

1 - أحسب pH للمحلول المنظم الناتج.


2 - أحسب قيمة pH عند إضافة 0.1 mol HCl إلى لتر من محلول المنظم السابق. علمًا

أن  $\log 2 = 0.3$  ،  $\log 5 = 0.7$  (أهمل تغير الحجم).

# تجربة استهلاكية

## الخلفية العلمية:

تفاوت الفيلزات في نشاطها الكيميائي، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تفاعلاتها المختلفة، كالتفاعل مع الحموض، مثل حمض الهيدروكلوريك HCl. فمثلاً، يتفاعل الخارصين Zn مع حمض HCl وينطلق غاز الهيدروجين  $H_2$ ، حسب المعادلة:



يُلاحظ من المعادلة أنَّ فلز الخارصين حل محلَّ الهيدروجين؛ حيث تأكسدت ذرَّاته؛ أي فقدت إلكتروناتٍ واختزلت أيونات الهيدروجين  $H^+$ ، التي اكتسبت الإلكترونات لتنتج على شكل غاز  $H_2$ . وهناك بعض الفيلزات لا تتفاعل مع حمض HCl ولا تحل محلَّ الهيدروجين؛ أي أنها لا تتأكسد ولا تختزل أيونات  $H^+$ . ويمكن الاستدلال على نشاط الفلز من خلال سرعة تفاعله مع الحمض وسرعة انطلاق غاز الهيدروجين  $H_2$  من التفاعل.

**الهدف:** أقارن سرعة تفاعل بعض الفيلزات مع حمض الهيدروكلوريك HCl.

## المواد والأدوات:

شريط مغنيسيوم طوله 5 cm ، حبيبات الخارصين Zn، حبيبات الألمنيوم Al، سلك نحاس Cu، محلول حمض الهيدروكلوريك HCl تركيزه (1M)، أنابيب اختبار عدد (4)، حامل أنابيب الاختبار، مخبر مدرج، ورق صنفه.

## إرشادات السلامة:

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أرتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أتعامل مع الحمض بحذر.

## خطوات العمل:

1. أحضر 4 أنابيب اختبار نظيفة وجافة وأرقُّها من (4-1)، ثم أضعُها على حامل الأنابيب.
2. أقيس. أضع باستخدام المخبر المدرج 10 mL من حمض الهيدروكلوريك HCl في كلّ أنبوب.
3. ألاحظ. أنظفُ شريط المغنيسيوم جيداً باستخدام ورق الصنفه، ثم أضعُه في أنبوب الاختبار رقم (1) وأرجُّه بلطف. هل حدث تفاعل؟ ما الدليل على حدوثه؟ أسجل ملاحظاتي في جدول البيانات.



4. أُجرب. أُكرر الخطوات السابقة باستخدام حبيبات الخارصين وحببيات الألمنيوم وسلك النحاس. هل حدث تفاعل؟ هل تختلف الفلزات في نشاطها في التفاعل مع الحمض؟ أُسجل ملاحظاتي في جدول البيانات.

5. أنظم البيانات. أُسجل ملاحظاتي حول تفاعل الفلزات المستخدمة مع حمض HCl في الجدول الآتي:  
- جدول البيانات:

الفلز	حدوث تفاعل نعم، لا	تصاعد غاز $H_2$ نعم، لا	النشاط أنشط، أقل نشاطاً، لم يتفاعل
Mg			
Zn			
Al			
Cu			



### التحليل والاستنتاج:

1. أُحدّد الفلزات التي تفاعلت مع حمض الهيدروكلوريك HCl

2. أرتّب الفلزات حسب نشاطها في التفاعل مع الحمض.

3. أكتب معادلات كيميائية موزونة للفلزات التي تفاعلت مع الحمض.

4. أُحدّد التغيير الذي طرأ على شحنة كلّ فلز في التفاعلات السابقة. ما نوع التفاعل؟

# مقارنة جهد بعض الخلايا الجلفانية

الخلفية العلمية:

تتكون الخلية الجلفانية من نصفي خلية؛ نصف خلية تأكسد ونصف خلية اختزال، ويحدث في الخلية تفاعل تأكسد واختزال تلقائي منتج للطاقة الكهربائية؛ إذ تنتقل الإلكترونات في الدارة الخارجية من القطب الذي يحدث عنده التأكسد (المصعد Anode)؛ حيث تأكسد ذراته متحولة إلى أيونات في محلول فقل كتلته، إلى القطب الذي يحدث عنده الاختزال (المهبط Cathode)؛ حيث تخترل الأيونات الموجبة في محلول الملح وتترسب عليه فتزداد كتلته. وتحرّك الأيونات الموجبة من القنطرة الملحيّة باتجاه نصف خلية الاختزال، بينما تحرّك الأيونات السالبة باتجاه نصف خلية التأكسد بحيث تحافظ على التعادل الكهربائي في محلولين. أمّا فرق الجهد الذي يقيسُه الفولتميتر بين القطبين فهو جهد الخلية الذي يزداد بزيادة ميل كلّ من نصف تفاعل التأكسد ونصف تفاعل الاختزال للحدوث، أو بزيادة الفرق في جهد الاختزال بين القطبين.

الهدف: أقارن جهد الخلية ( $E_{cell}$ ) لعدة خلايا جلفانية باستخدام أزواج مختلفة من الأقطاب الفلزية.

## المواد والأدوات:

محلول حجم كل منها (100 mL) بتركيز (1M) من كل من المركبات الآتية: كبريتات الباراسيتامول  $ZnSO_4$ ، نترات الرصاص  $Pb(NO_3)_2$ ، نترات الألمنيوم  $Al(NO_3)_3$  و (200 mL) من محلول كبريتات النحاس  $CuSO_4$  تركيزه (1M)، صفيحة من كل من الباراسيتامول، النحاس، الرصاص، الألمنيوم، ورق صنفرة، فولتميتر، أسلاك توصيل، أنبوب على شكل حرف U، محلول مشبع من كلوريد البوتاسيوم  $KCl$ ، قطن، كؤوس زجاجية سعة 100 mL عدد (4)، ماء مقطّر.

## إرشادات السلامة:

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أرتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أتعامل مع المواد الكيميائية بحذر.



## خطوات العمل:

1. أقيس. أحضر كأسين زجاجيين، وأضع 50 mL من محلول كبريتات النحاس في الكأس الأول و 50 mL من محلول كبريتات الخارصين في الثاني.
2. أجرّب. أنظف صفيحتي النحاس والخارصين جيداً باستخدام ورق الصنفرة، وأغسلهما بالماء المقطّر، وأتركهما تجفّان.
3. أجرّب. أضع صفيحة النحاس في الكأس الزجاجي الأولي وصفيحة الخارصين في الكأس الثانية، ثمّ أوصل أسلاك التوصيل من طرف الصفيحة ومن الطرف الآخر بالفولتميتر لكلا الصفيحيتين، وألاحظ. هل تحرّك مؤشر الفولتميتر؟
4. أجرّب. أملأ الأنوبَ الذي على شكل حرف U تماماً بمحلول كلوريد البوتاسيوم المشبع، وأتأكدُ من عدم وجود فقاعات هواء فيه، ثمّ أغلق طرفيه بقليل من القطن.
5. لاحظ. أقلِب الأنوبَ بحيث يصل بين الكأسين (نصف خلية النحاس ونصف خلية الخارصين)، وألاحظ تحرّك مؤشر الفولتميتر (إذا تحرّك المؤشر بالاتجاه السالب أعكس الأسلاك الموصلة به)، وأسجل قراءته في الجدول.
6. أجرّب. أكرر الخطوات السابقة باستخدام انصاف الخلايا (نحاس - رصاص)، (نحاس - ألمونيوم)، (رصاص - ألمونيوم)، وأحرض على غمس كل صفيحة في محلول مركبها، وأجهز القنطرة الملحيّة من جديد بعد غسل الأنوب وتجفيفه.



7. أُنْظِّمُ البيانات. أَسْجِّلْ قِيمَ جهود الخلايا في الجدول الآتي:

- جدول البيانات:

الخلية	جهد الخلية المقاس	جهد الخلية المعياري (V)
نحاس - خارصين		1.1
نحاس - ألمنيوم		2.0
نحاس - رصاص		0.47
رصاص - ألمنيوم		1.53



التحليل والاستنتاج:

1. أَحَدِّدُ المصعد والمهبط في كُلّ خلية جلفانية.

2. أَكْتُبُ التفاعل الكلي في كُلّ خلية جلفانية.

3. أُقارِنُ بين جهود الخلايا الجلفانية الذي جرى قياسها، وآفَسِرُ الاختلاف فيها.

4. أَتَوْقُّعُ ترتيب الفلزات وفق تزايد جهود اخترالها اعتماداً على قِيمَ جهود الخلايا المقيسة.

## مقارنة قوّة بعض العوامل المختزلة

الخلفيّة العلميّة:

تحدث تفاعلات التأكسد والاختزال نتيجة انتقال الإلكترونات من المادّة التي تتأكسد (العامل المختزل) إلى المادّة التي تُختزل (العامل المؤكسد)، ويعتمد حدوث التفاعل على جهود الاختزال المعياريّة لنصف تفاعل التأكسد ونصف تفاعل الاختزال. ولما كان كل نصف تفاعل يتضمّن عاملًا مؤكسداً وعاملًا مختزلاً، فكلّما زاد جهد الاختزال المعياري للقطب قلّ ميل العامل المختزل للتآكسد وقلّت قوّة العامل المختزل، وكذلك زاد ميل العامل المؤكسد للاختزال وزادت قوته. ويكون التفاعل تلقائياً عندما يكون جهد الاختزال المعياري للعامل المؤكسد في التفاعل أعلى من جهد الاختزال المعياري للعامل المختزل فيه، وعندما يكون جهد الخلية المعياري للتفاعل موجباً.

الهدفُ: أقارن قوّة بعض العوامل المختزلة.

المواد والأدوات:

شريط مغنيسيوم، حبيبات نيكل، حبيبات رصاص، مسمار حديد عدد 4،  $100\text{ mL}$  من محليل كلٌّ من نترات المغنيسيوم  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ ، نترات النيكل  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ ، نترات الرصاص  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ، نترات الحديد II  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ ، كل منه بتركيز  $0.1\text{ M}$ ، أنابيب اختبار عدد (9)، مخار مُدرَّج عدد 4، ورق صنفرة، قلم تخطيط، ورق لاصق.

إرشادات السلامة:

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أرتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أتعامل مع المواد الكيميائية بحذر.



## خطوات العمل:

1. أُجَرِّب. أقيس 12 cm من شريط المغنيسيوم، وأنظفه جيداً باستخدام ورق الصنفرة، ثم أقسمه إلى 3 أجزاء متساوية؛ وأحضر 3 حبيبات نيكل و3 حبيبات رصاص و3 مسامير.
2. أُجَرِّب. أحضر 3 أنابيب اختبار نظيفة، وأضعها في حامل الأنابيب، وأرقمها من 1-3.
3. أقيس. أستخدم المِنْبَار المُدَرَّج، وأضع 10 mL من محلول نترات المغنيسيوم في كلّ أنبوب اختبار.
4. ألاحظ. أضع في كلّ أنبوب قطعة واحدة من أحد الفلزات الأربع، وأستثنى الفلز الذي يوجد محلوله في الأنابيب الثلاثة، ثم أرج كلّ أنبوب بطف وآراقب الأنابيب كُلُّها. هل حدث تفاعل؟ أسجل ملاحظاتي في جدول البيانات.
5. أُجَرِّب. أكرر الخطوات 2، 3، 4 السابقة باستخدام محلول نترات النيكل، ثم محلول نترات الرصاص، ثم محلول نترات الحديد II، وأسجل ملاحظاتي في جدول البيانات.
6. أنظم البيانات. أسجل البيانات في الجدول الآتي:

- جدول البيانات:

محلول								العنصر	التفاعل مع المحاليل		
Fe(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>		Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>		Ni(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>		Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>					
الدليل	حدوث تفاعل	الدليل	حدوث تفاعل	الدليل	حدوث تفاعل	الدليل	حدوث تفاعل				
								Mg			
								Ni			
								Pb			
								Fe			



## التحليلُ والاستنتاج:

1. أكتب معادلة كيميائية موزونة تمثل التفاعل الحادث في كل أنبوب.

2. أرتب الفلزات حسب قوتها كعوامل مختزلة.

3. أفسّر ترسب النيكل عند تفاعل المغنيسيوم مع نترات النيكل  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ .

4. أفسّر. لا يتفاعل الرصاص مع محلول نترات الحديد II  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ .

## التحليل الكهربائي لمحاليل بعض المركبات الأيونية

الخلفية العلمية:

تحدث عملية التحليل الكهربائي عند إمداد تيار كهربائي في محلول أو مصهور مادةً أيونية، ويؤدي ذلك إلى حدوث تفاعل تأكسد واحتزال.

تتكون خلية التحليل الكهربائي من قطبين من البلاتين أو الجرافيت مغمومسين في محلول مادةً أيونية، ويُصلان بأسلاك توصيل تتصل بالبطارية، وعند مرور التيار الكهربائي في محلول تحرّك الأيونات الموجبة باتجاه القطب السالب (المهبط)، إذ يُحتمل أن تختزل هذه الأيونات أو أن تختزل جزيئات الماء، أمّا الأيونات السالبة فتحرّك باتجاه القطب الموجب (المصعد)، إذ يُحتمل أن تتأكسد، أو أن تتأكسد جزيئات الماء. ويعتمد التفاعل الذي يحدث بشكل عام على جهود الاحتزال المعيارية لكلٍّ منهما؛ حيث تختزل المادة التي لها أعلى جهد احتزال عند المهبط، وتتأكسد المادة التي لها أقل جهد احتزال (أعلى جهد تأكسد) عند المصعد.

الهدف: أستقصي نواتج التحليل الكهربائي لمحلول يوديد البوتاسيوم ومحلول كبريتات النحاس.



أنبوبان زجاجيان على شكل حرف U، أقطاب جرافيت عددين (4)، كاشف الفينولفاتلين، أسلاك توصيل، بطارية (V) عددين (3)، حامل وماسك فلزّي، 100 mL من محلول يوديد البوتاسيوم KI بتركيز 0.5 M، 100 mL من محلول كبريتات النحاس  $\text{CuSO}_4$  بتركيز 0.5 M.



إرشادات السلامة:

- أتبع إرشادات السلامة العامة في المختبر.
- أرتدي معطف المختبر والنظارات الواقية والقفازات.
- أتعامل مع المواد الكيميائية بحذر.



## خطوات العمل:



1. أُجَرِّبُ. أَثْبَتْ أَنْبُوبًا زجاجيًّا على شكل حرف U على الحامل الفِلِزِي باستخدام الماسك، كما في الشكل.
2. أُجَرِّبُ. أَمْلأُ الأَنْبُوبَ الزجاجي بمحلول يوديد البوتاسيوم، بحيث يبقى ما يقارب 1 cm فارغاً من كُل طرف، ثُمَّ أَضِيفُ إِلَيْهِ 3 نقاط من كاشف الفينولفثالين.
3. أُطَبِّقُ. أَصِلُّ قطبي الجرافيت بأسلاك توصيل، ثُمَّ أَضْعُهَا في الأنابيب الزجاجي بحيث يكون كُلُّ منها في أحد طرفي الأنابيب، كما في الشكل.
4. أَلَاحِظُ. أَصِلُّ أسلاك التوصيل بقطبي البطارئ وأتركُها مدة 15 min، وَالاحْظُ التغييرات التي تحدث في المحلول، ثم أفصِلُ التيار الكهربائي وأسجّل ملاحظاتي في جدول البيانات.
5. أُجَرِّبُ. أُكَرِّرُ الخطوات من 1-4 باستخدام محلول كبريتات النحاس، وأسجّل ملاحظاتي في جدول البيانات.
6. أُنْظِمُ البيانات. أَسجّل بياناتي في الجدول الآتي:

- جدول البيانات:

المهبط	المِصْدَر		التحْيُرُ ومكان حدوثه	المحلول
تصاعد غاز	تغير اللون	تصاعد غاز		
تصاعد غاز	تغير اللون	تصاعد غاز	غير ملحوظ	KI <sub>(aq)</sub>
			غير ملحوظ	CuSO <sub>4(aq)</sub>



## التحليلُ والاستنتاج:

1. أَصِفُ التغييراتِ التي حدثت عند تحليل محلول كُلٌّ من يوديد البوتاسيوم وكبريتات النحاس كهربائياً عند كُلٍّ من المِصعد والمِهبط.

2. ما نواتج تحليل كُلٌّ من محلول يوديد البوتاسيوم وكبريتات النحاس كهربائياً؟



3. أكتُب معادلةً كيميائية تمثل التفاعل الذي حدث عند المِصعد لـكُلٌّ محلول.

4. أكتُب معادلةً كيميائية تمثل التفاعل الذي حدث عند المِهبط لـكُلٌّ محلول.

5. أستنتج نواتج التحليل الكهربائي لمحلول  $\text{CuI}_2$ .

# أسئلة تفكير

1) مُستعينًا بأنصاف تفاعلات الاختزال وجهودها المعيارية الآتية:



أجِيبُ عنِ الأسئلة الآتية:

أ) أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الكُلّي المتوقع بينهما.

ب) أحَدِّدُ العامل المختزل.

ج) أحَدِّدُ العامل المؤكسد.

د) أحَدِّدُ التغير الذي يحدث في تركيز أيونات كل من  $\text{Mn}^{2+}$  و  $\text{Cr}^{3+}$ .

هـ) أحسبُ جهدَ الخلية المعياري  $E_{\text{cell}}^\circ$  للتفاعل.

2) أوازنُ معادلات التفاعل الآتية بطريقة نصف التفاعل، وأُبَيِّنُ العامل المؤكسد والعامل المختزل:



3) المعلومات الآتية خاصة بالعناصر ذات الرموز الافتراضية الآتية (A, B, C, D)، وتكون جميعها أيوناتٍ

ثنائيةً موجبة في حالاتها:

أ ) لا يمكن تحرير محلول  $A(NO_3)_2$  بملعقة من C.

ب) جهد الخلية المعياري للخلية الجلفانية المكونة من (C و B) أقلُّ من جهد الخلية المعياري للخلية

الجلفانية المكونة من (D و B)، وقد لوحظَ في الخلتين نقصٌ في كتلة القطب B.

ج ) لوحظَ عند تحليل محلول كُلٌّ من  $ABr_2$  و  $DBr_2$  كهربائياً تصاعدُ غاز  $H_2$  عند المهبط في محلول الأول، وترسبُ D عند المهبط في محلول الثاني.

أدرس المعلومات أعلاه جيداً، ثم أجيِّب عن الأسئلة الآتية:

1 - أرتُّب العناصر (A, B, C, D) حسب قوتها كعوامل مختزلة.

2 - أحددُ أقوى عامل مؤكسد.

3 - أتنبأ: هل يمكن حفظُ محلول  $B(NO_3)_2$  في وعاء مصنوع من الفلز A؟ أفسرُ إجابتي.

4 - أحددُ الفلزين اللذين يكونان خلية جلفانية لها أعلى جهد خلية معياري.

4) مرّ غاز الكلور  $Cl_2$  بضغط يساوي 1atm في محلول يحتوي على أيونات الفلوريد  $F^-$  وأيونات


البروميد  $Br^-$ ، تركيز كُلٌّ منهما؛ 1M، وعند درجة حرارة  $25^\circ C$ . مُستعيناً بأنصاف تفاعلات الاختزال

وجهودها المعيارية الآتية:



أكتب المعادلة الكُلية الموزونة لتفاعل المتوقع. أبُرُّ إجابتي.

5) أدرسُ الشكل المجاور، الذي يمثلُ الخلية الجلفانية المُمثَّلة بالرَّمز الآتي في الظروف المعياريَّة، ثمَّ أجيِّبُ عن الأسئلة الآتية:



- أ ) ما ترَكِيزُ أيونات  $\text{Zn}^{2+}$  المستخدَمة في نصف خلية الْخَارِصِين المعياريَّة؟
- ب ) أَتَبَّأُ: هل يمْكُنُ استخدَامُ محلول مشبَّع من كبريتات النحاس  $\text{CuSO}_4$  في القنطرة الملحِّيَّة المستخدَمة في الخلية الجلفانيَّة؟ أُفْسُرُ إجابتِي . جهد الاختزال المعياري للنحاس ( $E^\circ = 0.34 \text{ V}$ ) .

نصف تفاعل الاختزال	$E^\circ \text{ V}$
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}$	-1.18
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0.44
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	-0.83
$\text{l}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{l}^-$	0.54
$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$	0.40
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	1.23
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$	-2.71

6) أدرسُ الجدول المجاور، حيث يتضمَّنُ بعض أنصاف تفاعلات الاختزال وجهودها المعياريَّة، ثمَّ أجيِّبُ عنَ الأسئلة الآتية:

- أ ) أَتَبَّأُ: هل يمْكُنُ تحضيرُ المنغنيز Mn بالتحليل الكهربائي لمحلول  $\text{MnI}_2$ ؟ أُفْسُرُ إجابتِي .
- ب ) أكتبُ معادلةً كيميائِيَّةً موزونة تمثلُ نصف تفاعل الاختزال في خلية التحليل الكهربائي لمحلول  $\text{FeCl}_2$ .

ج ) أكتبُ معادلةً كيميائِيَّةً كُلِّيَّةً موزونة تمثلُ نواتج التحليل الكهربائي لمحلول  $\text{NaOH}$ .

- د ) أتوَّقُ: هل يحدُثُ تفاعلُ التأكسد والاختزال في خلية التحليل الكهربائي لمصهور  $\text{MnI}_2$ ، إذا زُوِّدَت بجهد مقدارُه  $1.5 \text{ V}$ ؟ أُبَرُّ إجابتِي .

