


الطلبة النظميون
٢٠٢١/١٦



إدارة الامتحانات والاختبارات
قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ / التكميلي


مدة الامتحان: $\frac{٣٠}{٢}$ س
اليوم والتاريخ: السبت ٢٠٢١/١/١٦
رقم الجلوس:

(وثيقة معمية/محلوبة)
رقم المبحث: ٢٣٥
رقم النموذج: ١

المبحث : الرياضيات
الفرع: الأدبي والشرعي
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الصوتي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٧).

* * معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران $Q(s)$ ، أجب عن الفقرات (١)، (٢)، (٣) الآتية:



(١) ما قيمة $Q(1-s)$ ؟

أ) ١
ب) ٢

ج) ٣
د) غير موجودة

(٢) ما مجموعة قيم الثابت m ، حيث $Q(s-m) = 0$ ؟

أ) $\{3, 2\}$
ب) $\{3, 2, 1\}$
ج) $\{3, 2, -1\}$
د) $\{-2, -3\}$

(٣) ما قيمة $Q(s+2) - s^3$ ؟

أ) ٢
ب) ٣
ج) ٤
د) غير موجودة


، وكانت $Q(s)$ موجودة، فما قيمة الثابت L ؟

أ) إذا كان $Q(s) = \begin{cases} 2s^2 & , s \leq L \\ 16 & , s > L \end{cases}$

أ) ٣
ب) ٢
ج) ١٦
د) ٨

(٥) إذا كانت $Q(s) = 2h(s) + h(s)h(s)$ ، فإن $Q(s)$ تساوي:

أ) ٣٠
ب) ٢٠
ج) ٦
د) -٦



$$\frac{1}{s-2} + \frac{1}{s+2}$$

٦) ما قيمة $h(s)$

$$A) -\frac{3}{16} \quad B) \frac{3}{16}$$

٧) إذا كانت $h(s) = \frac{q(s)}{s^2}$ ، فما قيمة $h(s)$ ؟

$$A) 1 \quad B) -3 \quad C) 3 \quad D) \text{غير موجودة}$$

$$A) \frac{s^2 - 3s}{s^3 - 9s} \quad \text{تساوي:}$$

$$A) 3 \quad B) -3 \quad C) 1 \quad D) \text{غير موجودة}$$

$$A) 96 \quad B) 48 \quad C) \frac{q''(s) - q(32)}{s-2} \quad D) \text{غير موجودة}$$

$$A) 96 \quad B) 48 \quad C) \text{غير موجودة} \quad D) \text{صفر}$$

$$A) 10 \quad B) 12 \quad C) 7 \quad D) \left. \begin{array}{l} s^2 + b \\ s^2 - 4b - 6 \end{array} \right\} \text{إذا كان } q(s) =$$

وكان الاقتران $q(s)$ متصلًا عند $s=1$ ، فإن قيمة الثابتين A ، B على الترتيب هي:

$$A) 5, 3 \quad B) 3, 5 \quad C) 5, -3 \quad D) 3, -5$$

$$A) 11 \quad B) \frac{q(s)}{s^3} = \frac{2}{s-1} \quad \text{إذا كان الاقتران } q \text{ متصلًا عند } s=1 \text{ ، وكانت } h(s) =$$

$$A) 2 \quad B) -6 \quad C) 2 \quad D) 6$$

$$A) 12 \quad B) \frac{1}{(s-2)^4} + \frac{4}{s} \quad \text{إذا كان } q(s) =$$

$$A) 2, 0 \quad B) \{-2, 0\} \quad C) \{0, 2\} \quad D) \{-8, 0\}$$

$$A) 13 \quad B) \text{معدل تغير الاقتران } h \text{ في الفترة } [-2, 2] \text{ يساوي } (-12), \text{ وكان } h(s) = 3q(s),$$

فما معدل تغير الاقتران h في الفترة $[-2, 2]؟$

$$A) 36 \quad B) -36 \quad C) 4 \quad D) -4$$



١٤) يتحرك جسم وفقاً للعلاقة $f(n) = n^2 + 4n$ ، حيث (n) الزمن بالثوانی، (f) المسافة المقطوعة بالأمتار، ما السرعة المتوسطة للجسم في الفترة الزمنية $[1, 5]$ ثانية؟

- (أ) ١٠ م/ث ب) ١٢ م/ث ج) ٤٠ م/ث د) ٢٥ م/ث

١٥) إذا كان $q(s)$ اقتراناً كثير الحدود ، فإن $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{q(2+h) - q(2)}{h}$ تساوي:

- (أ) $q'(0)$ ب) $q'(2)$ ج) $q(0)$ د) $q(2)$

١٦) إذا كان $q(s) = s^3 + 5s$ ، فما قيمة $\lim_{s \rightarrow 2} \frac{q(u) - q(s)}{u - s}$ ؟

- (أ) $s^3 + 5s$ ب) $u^3 + 5u$ ج) $3u^2 + 5$ د) $3s^2 + 5$

١٧) إذا كان $s = q(s)$ ، وكان مقدار التغير في قيمة الاقتران q عندما تتغير s من s_0 إلى $s_0 + h$ هو $\Delta s = 4s + h + 4$ ، فإن $q'(s)$ تساوي:

- (أ) ٤ ب) -٤ ج) ٤س د) -٤س

١٨) إذا كان $q(s) = s^2 \times h(s)$ ، وكان $h(1) = 2 - \frac{s}{2}$ ، فإن $q'(1)$ تساوي :

- (أ) ٧ ب) -١ ج) ١ د) ٧

١٩) إذا كان $q(s) = \frac{s^3 - 2}{s^2}$ ، فإن $q'(1)$ تساوي:

- (أ) $\frac{2}{7}$ ب) $-\frac{3}{7}$ ج) $-\frac{3}{7}$ د) $-\frac{1}{7}$

٢٠) إذا كان $q(s) = s^3 + 6s^2 - 2ms - 4$ ، وكانت $q(0) = 0$ ، فما قيمة الثابت m ؟

- (أ) ٢ ب) -٢ ج) ٤ د) -٤

٢١) إذا كان $q(s) = \frac{s^2}{s+3}$ ، $s \neq -3$ ، فإن $q'(-4)$ تساوي:

- (أ) ٨ ب) ٦ ج) -٦ د) ٦

٢٢) إذا كان $q(s) = \sqrt{2s-5}$ ، $s > \frac{5}{2}$ ، فإن قيمة $q'(-2)$ تساوي:

- (أ) $\frac{1}{3}$ ب) $-\frac{5}{2}$ ج) $-\frac{5}{2}$ د) $-\frac{1}{3}$

- أ) $2s^2$
ب) $8s^3$
ج) $12s^2$
د) $6s^3$

(٢٤) إذا كان $q(s) = (1 + s^2)^{-2}$ ، فما قيمة $q(-1)$ ؟

- أ) $-\frac{1}{2}$
ب) $-\frac{1}{2}$
ج) -2
د) 2

(٢٥) إذا كان $q(s) = \ln(3s - 1)$ ، فإن $q'(s)$ تساوي:

- أ) $3s^{-1}$
ب) $-3s^{-1}$
ج) $3s^{-1}$
د) $-3s^{-1}$

(٢٦) إذا كان $s = q(x)$ اقترانًا متصلًا، حيث $q(2) = 3$ ، $q'(2) = 0$ = صفر، فإن معادلة المماس لمنحنى

الاقتران q عند $s=2$ هي:

- أ) $s = 3$
ب) $s = -3$
ج) $s = 1$
د) $s = -1$

(٢٧) يتحرك جسم وفق العلاقة: $f(n) = n^4 - n^3$ ، حيث n الزمن بالثواني، ف المسافة المقطوعة بالأمتار،

ما تسارع الجسم في اللحظة التي تكون فيها سرعته $(10 \text{ م}/\text{s})$ ؟

- أ) $9 \text{ م}/\text{s}^2$
ب) $2 \text{ م}/\text{s}^2$
ج) $5 \text{ م}/\text{s}^2$
د) $6 \text{ م}/\text{s}^2$

(٢٨) يتحرك جسم وفق العلاقة $f(n) = (2n - 1)^3$ ، حيث n الزمن بالثواني، ف المسافة المقطوعة بالأمتار،

ما سرعة الجسم بعد مرور ثانيةين من بدء الحركة؟

- أ) $27 \text{ م}/\text{s}$
ب) $9 \text{ م}/\text{s}$
ج) $54 \text{ م}/\text{s}$
د) $72 \text{ م}/\text{s}$

(٢٩) إذا كان $q(s) = s^3 - 4s^2 - 3$ ، فإن منحنى الاقتران q يكون متناقصاً في الفترة:

- أ) $(-\infty, \infty)$
ب) $(-\infty, 2]$
ج) $[2, \infty)$
د) $(-\infty, -2)$

(٣٠) أي الاقترانات الآتية هو اقتران متزايد على جميع قيم s ؟

- أ) $q(s) = 2s^3 + 4$
ب) $h(s) = s^4 + 1$
ج) $l(s) = 3s^2 + 2$
د) $u(s) = 6s - 2$


(٣١) إذا كان للاقتران $q(s) = m s^3 - 4s^2 + 3$ نقطة حرجة عند $s = 2$ ، فما قيمة الثابت m ؟

- أ) -4
ب) -1
ج) 1
د) 3

(٣٢) إذا كان $k(s) = 70 + 3s^2$ دينار، اقتران التكلفة الكلية لإنتاج s قطعة من سلعة ما، فإن التكلفة الحدية

بالدينار لإنتاج (30) قطعة من السلعة نفسها تساوي:

- أ) 90
ب) 70
ج) 210
د) 180



(٣٣) إذا كان الإيراد الكلي $D(s)$ الناتج عن بيع س قطعة من منتج معين يساوي ثلاثة أمثال التكلفة الكلية $k(s)$

لإنتاج هذه القطع، فما الربح الحدي الناتج عن بيع س قطعة من ذلك المنتج؟

- أ) $2D(s)$ ب) $2k(s)$ ج) $3D(s)$ د) $3k(s)$

(٣٤) إذا كان Q اقترانًا متصلًا ، وكان $Q(s) = 4s^2 - 3$ ، فما قيمة $Q(-2)$ ؟

- أ) ٨ ب) -٨ ج) -١٦ د) ١٦

(٣٥) إذا كان Q اقترانًا قابلاً للاشتغال، وكان $Q(s) = 2s + 3$ ، $Q(2) = 5$ ، فما قيمة $Q(-1)$ ؟

- أ) -٣ ب) ٣ ج) ٧ د) ٧

(٣٦) قيمة $\int s \, ds$ تساوي:

- أ) $\frac{3}{2}$ ب) ١ ج) $\frac{2}{3}$ د) صفر

(٣٧) إذا كان $Q(s) = 9$ ، فإن $\int (3s^2 + Q(s)) \, ds$ يساوي:

- أ) ٨ ب) ١٨ ج) ١٢ د) ١٧

(٣٨) إذا كان $Q(s) = 7$ ، $Q(8) = 4$ ، فإن $\int Q(s) \, ds$ يساوي:

- أ) ٥ ب) ٥ ج) ١٥ د) -١٥

(٣٩) قيمة $\int (s^3 + \int s \, ds - 3) \, ds$ تساوي:

- أ) ١٥ ب) ٤ ج) صفر د) -١٢

(٤٠) $\int (2s^3 + 3) \, ds$ يساوي:

- أ) $-\frac{1}{2} \int (2s^3 + 3) \, ds + C$ ب) $\frac{1}{2} \int (2s^3 + 3) \, ds + C$

- ج) $2 \int (2s^3 + 3) \, ds + C$ د) $-2 \int (2s^3 + 3) \, ds + C$

9-(J)

۲۳

٩

۷

$$\text{ما قيمة } \frac{س^{12}}{س^3 - 1} \text{ بـ } \frac{3}{4} \text{ ؟}$$

۲۷ (۵)

٢٧ - (ج)

٩

9-(f)

٤٣) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران $s = q(s)$ عند النقطة $(s, q(s))$ يساوي $\frac{8}{s-3}$ ،
وكان منحنى الاقتران q يمر بالنقطة $(1, 0)$ ، فإن قاعدة الاقتران q هي:

$$b) q(s) = s^2 + 1$$

$$\text{أ) } \mathbf{Q}(s) = s^2 - 1$$

$$d) Q(s) = 4s^2 - 1$$

$$ج) \quad \dot{Q}(s) = 4s + 1$$

٤٤) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران $Q(s)$ عند النقطة $(s, Q(s))$ يساوي $\frac{4s^2 - s}{s}$ ، $s \neq 0$ ،

وكان منحناه يمر بالنقطة (١ ، ٤) ، فما قيمة ق (٢) ؟

7 (5)

۷

٩

1. (f)

٤٥) يتحرك جسم على خط مستقيم بتسارع ثابت مقداره: $T(n) = 7m/s^2$ ، إذا كانت السرعة الابتدائية للجسم $U(n) = 8m/s$ ، فإن سرعة الجسم بالأمتار بعد n ثانية من بدء الحركة تعطى بالعلاقة:

- أ) $U(n) = 8n + 7$
- ب) $U(n) = 7n - 8$
- ج) $U(n) = 7n + 8$
- د) $U(n) = 8n - 7$

٤٦) يتحرك جسم على خط مستقيم بحيث تُعطى سرعته بعد مرور (ن) ثانية من بدء الحركة بالعلاقة $x(n) = (2n + 3)m$ /ث ، إذا كان موقعه الابتدائي $x(0) = 4m$ ، فإن موقع الجسم بعد مرور ثانيةين من انطلاقه يساوي:

د) ۱۱ م

ج ۵

۷

۱۴ (۱)

٤٧) يتحرك جسم على خط مستقيم بحيث تُعطى سرعته بعد مرور (ن) ثانية من بدء الحركة بالعلاقة $\text{ع}(\text{n}) = \text{جتا}(3\text{n}-2)$ م/ث ، فان موقع الجسم بعد مرور (ن) ثانية من انطلاقه يعطى بالعلاقة:

$$\text{ب) } f(n) = -\frac{1}{n} + (2n - 3)$$


$$f(n) = \frac{1}{n} (3 - 2^n)$$

$$d) f(n) = \frac{1}{3} (2n - 3)$$

$$\text{ج) } f(n) = -3n^2 + 2$$

** معمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران Q المعرف على الفترة $[A, B]$ ، أجب عن الفقرتين (٤٨)، (٤٩)

الآتيين:



(٤٨) إذا علمت أن مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين

منحنى الاقتران Q ومحور السينات تساوي (١٥) وحدة مربعة،

وكان $\int_{A}^{B} Q(s) ds = -8$ ، فما قيمة $\int_{A}^{B} |Q(s)| ds$ ؟

د) ٢٣

ج) ٨-

ب) ٧-

أ) ٧

(٤٩) ما قيمة المساحة M ؟

د) ١٥

ج) ٨

ب) ١

أ) ٧

(٥٠) ما مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنى الاقتران $Q(s) = 2s + 6$ ومحور السينات والمستقيمين

$s = 1$ ، $s = 3$ بالوحدات المربعة؟

د) ٣٤

ج) ١٧

ب) ٢٧

أ) ٢٠

«انتهت الأسئلة»