

## مهارات التفكير العليا

### المعادلات التفاضلية

تحذ: أحل كلاً من المعادلات التفاضلية الآتية:

$$(dy/dx = xy^2 - xy - 1y^2 + y) \quad (33)$$

$$\begin{aligned} dy/dx = xy^2 - 1y^2 + y - xy \\ dy/dx = 1y^2(x-1) - y(x-1) = (x-1)(1y^2 - y) \Rightarrow dy(1y^2 - y) = (x-1)dx \\ \int dy(1y^2 - y) = \int (x-1)dx \\ \int y^2 - y = \int (x-1)dx \\ \int y^2 - y = \int (x-1)dx \\ \int y^2 - y = \int (x-1)dx - 13 \\ \int y^2 - y = \int (x-1)dx - 13 \\ |1 - y^3| = 12x^2 - x + C \\ 21 - y^3 dy = \int (x-1)dx - 13 \ln \end{aligned}$$

$$(dy/dx = x^2y - 1 - 2x^3y - 2) \quad (34)$$

$$\begin{aligned} dy/dx = x(12y - 1 - 23y - 2) = x(3y - 2 - 4y + 26y^2 - 7y + 2) = x(-y^6y^2 - 7y + 2) \\ \Rightarrow 6y^2 - 7y + 2 - y dy = x dx \\ \int 6y^2 - 7y + 2 - y dy = \int x dx \\ \int (-6y + 7 - 2y) dy = \int x dx \\ |y| = 12x^2 + Cx dx - 3y^2 + 7y - 2 \ln \end{aligned}$$

$$(y (35x \tan^2 y + \tan^2 x + \tan^2 dy/dx = 1 + \tan^2$$

$$\begin{aligned} x) = \sec^2 y (1 + \tan^2 x + \tan^2 y) = \sec^2 x \tan^2 y + \tan^2 x + \tan^2 dy/dx = 1 + \tan^2 \\ x dx \int dy \sec^2 y = \sec^2 x \int dy \sec^2 x \sec^2 y = \sec^2 x (1 + \tan^2 x) = \sec^2 y \sec^2 x + \tan^2 \\ x dx \int 12(y + 2y) dy = \int \sec^2 x dx \int 12(1 + \cos y) dy = \int \sec^2 x dx \int \cos^2 y = \int \sec^2 x \cos^2 y \\ x + C) = \tan^2 \sin \end{aligned}$$

تبرير: يمكن نمذجة معدل تحلل مادة مشعة بالمعادلة التفاضلية:  $dx/dt = -\lambda x$ ، حيث  $x$  الكتلة المتبقية من المادة المشعة بالمليغرام بعد  $t$  يوماً، و  $\lambda > 0$ :

(36) أثبت أنه يمكن كتابة الحل العام للمعادلة التفاضلية في صورة:  $x = ae^{-\lambda t}$ ، حيث  $a$  ثابت، مبرراً إجابتك.

$$|x| = -\lambda t + C \quad dx/dt = -\lambda x \quad \int dx/x = \int -\lambda dt \ln$$

لكن الكمية  $x$  لا تكون سالبة، فتحذف رمز القيمة المطلقة.

$$e^C \Rightarrow x = ae^{-\lambda t} \quad x = -\lambda t + C \quad x = e^{-\lambda t} + C = e^{-\lambda t} \times e^{\ln C} \Rightarrow$$

(37) إذا كان عمر النصف للمادة المشعة هو الوقت اللازم لتحلل نصف هذه المادة،

و  $a$  كتلة المادة الابتدائية، فأثبت أنّ عمر النصف للمادة المشعة هو  $2\lambda \ln 2$ ، مبرراً إجابتي.

الكمية الابتدائية:  $x(0)=a$

المطلوب: حساب الزمن الذي يكون عنده  $x=12a$ ، نعوض:

$$2\lambda \ln 2 \Rightarrow t = \ln 12a = a e^{-\lambda t} \Rightarrow 12 = e^{-\lambda t} \Rightarrow 2 = e^{\lambda t} \Rightarrow \lambda t = \ln 2$$

تبرير: تمثل المعادلة التفاضلية:  $dy/dx = -2x^3y$  ميل المماس لمنحنى علاقة ما:

(38) أجد قيمة  $n$  التي تجعل العلاقة:  $x^2 + ny^2 = a$  حلاً للمعادلة التفاضلية المعطاة، حيث  $a$  ثابت اختياري، مبرراً إجابتي.

$$dy/dx = -2x^3y$$

لكي تكون العلاقة  $x^2 + ny^2 = a$  حلاً للمعادلة التفاضلية المعطاة، يجب أن تحققها.

نشتق طرفي العلاقة بالنسبة للمتغير  $x$

$$2x + 2ny dy/dx = 0 \Rightarrow dy/dx = -x/ny$$

نعوض المشتقة في المعادلة التفاضلية:

$$x/ny = -2x^3y \Rightarrow 2nxy = 3xy^2 \Rightarrow n = 3xy^2/xy = 3/2$$

(39) أجد إحداثيي نقاط تقاطع منحنى العلاقة مع المحور  $x$  إذا علمت أن منحنىها يمر بالنقطة  $(5,4)$ ، مبرراً إجابتي.

النقطة  $(5,4)$  تحقق المعادلة:

$$a \Rightarrow a = 49 \Rightarrow x^2 + 32y^2 = 49 = (16)25 + 32 \Rightarrow$$

لإيجاد الإحداثي  $x$  لنقاط التقاطع منحنى العلاقة مع المحور  $x$  نضع  $y=0$  في معادلتها

$$x^2 = 0 + 49 = 49 \Rightarrow x = \pm 7 \Rightarrow$$

إحداثيات نقطتي تقاطع العلاقة  $x^2 + 32y^2 = 49$  مع المحور  $x$  هما  $(7,0)$ ،  $(-7,0)$