

## المولالية (التركيز المولالي)

### Molality

تُحسب مولارية محلول بقسمة عدد مولات المذاب على حجم المحلول، إلا أن مولارية المحلول تعتمد على درجة الحرارة؛ إذ إنَّ زيادة درجة حرارة المحلول تقلل من تركيزه، وبما أن كتل المواد لا تتأثر بتغير درجة الحرارة، فقد ابتكر الكيميائيون طريقة لحساب تركيز المحلول بدلالة كتلة المذيب، وهو التركيز المولالي أو المولالية.

**المولالية:** نسبة عدد مولات المذاب في 1K من المذيب.

ويُعبر عن المولالية بالعلاقة الرياضية:

$$\frac{\text{عدد مولات المذاب (mol)}}{\text{كتلة المذيب (kg)}} = m \text{ (التركيز المولالي)}$$

$$m = \frac{n \text{ of solute}}{\text{solvent mass}}$$

mol/Kg وتقاس المولالية بوحدة ( ) أو (molal) وتلفظ مولال.

**مثال (1):**

mol أحسب مولالية محلول تكون بإذابة 6 من سكر الجلوكوز في 8 Kg من الماء المقطر.

تحليل السؤال (المعطيات)

mol عدد مولات المذاب (الجلوكوز) = 6

8 Kg كتلة المذيب (الماء) = 8

**الحل:**

$$m = \frac{n \text{ of solutes}}{\text{solvent mass}}$$

$$m = \frac{6 \text{ mol}}{8 \text{ kg}} = 0.75 \text{ m}$$

أتحقق صفحة (80):

g أحسب مولالية المحلول الذي يحتوي على 8.4 فلوريد الصوديوم NaF مذابة في 400 g من الماء المقطر. علماً أن الكتلة المولية (NaF)  $Mr = 42 \text{ g/mol}$

تحليل السؤال (المعطيات)

g كتلة المذاب (فلوريد الصوديوم) = 8.4

g كتلة المذيب (الماء) = 400

الحل:

n أحسب أولاً عدد مولات المذاب ():

$$n = \frac{m}{Mr} = \frac{8.4}{42} = 0.2 \text{ mol}$$

أحسب مولالية المحلول:

$$m = \frac{n}{\text{solvent mass}}$$

$$m = \frac{0.2 \text{ mol}}{0.4 \text{ kg}} = 0.5 \text{ m}$$