

## تعيين رتبة التفاعل لتفاعل يشتمل على أكثر من مادة متفاعلة

سؤال 1 :

يتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين مع حمض الهيدروكلوريك HCl ، وفق معادلة التفاعل الآتية:



أجريت ثلاث تجارب بتراكيز مختلفة عند درجة حرارة ثابتة؛ وجرى حساب سرعة التفاعل الابتدائية لكل تجربة، وسجلت النتائج؛ فكانت كما تظهر في الجدول الآتي:

1- أكتب قانون سرعة التفاعل العام.

قانون سرعة التفاعل العام:

$$R = k [\text{NO}_2]^x [\text{HCl}]^y$$

2- أستنتج رتبة المادة المتفاعلة  $\text{NO}_2$ .

لتحديد رتبة التفاعل بالنسبة للمادة ؛ أقرن بين تركيز  $\text{NO}_2$  وسرعة التفاعل في التجريبتين (1) و (2) عند ثبات تركيز HCl ، حيث ألاحظ أن تركيز  $\text{NO}_2$  تضاعف مرتين:

$$0.60.3 = 2$$

وفي المقابل تضاعفت السرعة مرتين:

$$2.8 \times 10^{-3} = 2 \times 1.4 \times 10^{-3}$$

$\text{NO}_2$  وعليه فإن رتبة المادة المتفاعلة هي الرتبة الأولى (1).

أو يمكن أن نقسم التجربة رقم (2) على التجربة رقم (1):

$$R_2/R_1 = k [\text{NO}_2]^x [\text{HCl}]^y / k [\text{NO}_2]^x [\text{HCl}]^y$$

k وباختصار قيمة ثابت السرعة وتركيز HCl لأنهما ثابتان تصبح العلاقة:

$$R2R1 = [\text{NO}_2]^x [\text{NO}_2]^x$$

$$2.8 \times 10^{-3} \times 1.4 \times 10^{-3} = [0.6]^x [0.3]^x$$

$$2 = (2)^x \Rightarrow x = 1$$

3- أستنتج رتبة المادة المتفاعلة HCl .

HCl لتحديد رتبة التفاعل بالنسبة للمادة ؛ أقرن بين تركيز HCl وسرعة التفاعل في التجريبتين (1) و (3) عند ثبات تركيز NO<sub>2</sub> ، حيث ألاحظ أن تركيز HCl تضاعف مرتين:

$$0.6 \times 0.3 = 2$$

وفي المقابل تضاعفت السرعة مرتين:

$$2.8 \times 10^{-3} \times 1.4 \times 10^{-3} = 2$$

HCl وعليه فإن رتبة المادة المتفاعلة هي الرتبة الأولى (1).

أو يمكن أن نقسم التجربة رقم (3) على التجربة رقم (1):

$$R3R1 = k [\text{NO}_2]^x [\text{HCl}]^y k [\text{NO}_2]^x [\text{HCl}]^y$$

$$R3R1 = [\text{HCl}]^y [\text{HCl}]^y$$

$$2.8 \times 10^{-3} \times 1.4 \times 10^{-3} = [0.6]^y [0.3]^y$$

$$2 = (2)^y \Rightarrow y = 1$$

4- أستنتج قانون السرعة لهذا التفاعل.

قانون السرعة لهذا التفاعل:

$$R = k [\text{NO}_2]^1 [\text{HCl}]^1$$

5- أحسب قيمة ثابت سرعة التفاعل k ، وأحدد وحدته.

k لحساب قيمة ثابت السرعة نعوض قيم التركيز والسرعة في إحدى التجارب الواردة في الجدول، فمثلاً يمكن تعويض القيم الواردة في الجدول والخاصة بالتجربة

رقم (1):

$$R = k [\text{NO}_2]^1 [\text{HCl}]^1$$

$$1.4 \times 10^{-3} = k [0.3]^1 [0.3]^1$$

$$k = 1.55 \times 10^{-2} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

6- أحسب سرعة التفاعل عندما يكون  $[\text{NO}_2] = [\text{HCl}] = 0.1 \text{ M}$


$$R = k [\text{NO}_2]^1 [\text{HCl}]^1$$

$$R = 1.55 \times 10^{-2} [0.1]^1 [0.1]^1$$

$$R = 1.55 \times 10^{-4}$$

سؤال 2 :

NO يتفاعل غاز أحادي أكسيد النيتروجين مع غاز الأوكسجين  $\text{O}_2$  ، مكوناً غاز ثاني أكسيد النيتروجين  $\text{NO}_2$  ، وفق معادلة التفاعل الآتية:



NO وقياس سرعة التفاعل الابتدائية عند تراكيز ابتدائية مختلفة من  $\text{O}_2$  و  $\text{NO}$  ؛ سجلت النتائج كما يظهر في الجدول الآتي:

رقم التجربة	[NO] M	[O <sub>2</sub> ] M	السرعة الابتدائية (M.s <sup>-1</sup> )
1	1 x 10 <sup>-1</sup>	2 x 10 <sup>-1</sup>	7 x 10 <sup>-2</sup>
2	2 x 10 <sup>-1</sup>	2 x 10 <sup>-1</sup>	2.8 x 10 <sup>-1</sup>
3	1 x 10 <sup>-1</sup>	4 x 10 <sup>-1</sup>	1.4 x 10 <sup>-1</sup>

أستعين بنتائج هذه التجارب في تحديد رتبة التفاعل بالنسبة لكل من أحادي أكسيد النيتروجين والأوكسجين.

الحل:

للتحديد رتبة التفاعل بالنسبة للمادة ؛ أقرن بين تركيز NO وسرعة التفاعل في التجريبتين (1) و (2) عند ثبات تركيز O<sub>2</sub> ، حيث ألاحظ أن تركيز NO تضاعف مرتين:

$$2 \times 10^{-11} \times 10^{-1} = 2$$

وفي المقابل تضاعفت السرعة (4) مرات:

$$2.8 \times 10^{-17} \times 10^{-2} = 4$$

NO وعليه فإن رتبة المادة المتفاعلة هي الرتبة الثانية (2).

أو يمكن أن نقسم التجربة رقم (2) على التجربة رقم (1):

$$k [\text{NO}]^x [\text{O}_2]^y k [\text{NO}]^x [\text{O}_2]^y = R_2 R_1$$

k وباختصار قيمة ثابت السرعة وتركيز O<sub>2</sub> لأنهما ثابتان تصبح العلاقة:

$$R_2 R_1 = [\text{NO}]^x [\text{NO}]^x$$

$$2.8 \times 10^{-17} \times 10^{-2} = [0.2]^x [0.1]^x$$

$$4 = (2)^x \Rightarrow x = 2$$

O<sub>2</sub> لتحديد رتبة التفاعل بالنسبة للمادة ؛ أقرن بين تركيز O<sub>2</sub> وسرعة التفاعل في التجريبتين (1) و (3) عند ثبات تركيز NO ، حيث ألاحظ أن تركيز O<sub>2</sub> تضاعف مرتين:

$$4 \times 10^{-12} \times 10^{-1} = 2$$

وفي المقابل تضاعفت السرعة مرتين:

$$1.4 \times 10^{-17} \times 10^{-2} = 2$$

O<sub>2</sub> وعليه فإن رتبة المادة المتفاعلة هي الرتبة الأولى (1).

أو يمكن أن نقسم التجربة رقم (3) على التجربة رقم (1):

$$k [\text{NO}]^x [\text{O}_2]^y k [\text{NO}]^x [\text{O}_2]^y = R_3 R_1$$

k وباختصار قيمة ثابت السرعة وتركيز NO لأنها ثابتان تصبح العلاقة:

$$R_3 R_1 = [\text{O}_2]^y [\text{O}_2]^y$$

$$2.8 \times 10^{-11} = 11.4 \times 10^{-1} = [0.6]^y [0.3]^y$$

$$2 = (2)^y \Rightarrow y = 2$$