

## أدرب وأحل المسائل

### تكامل اقترانات خاصة

أجد كلاً من التكاملات الآتية:

$$\int (12ex+3x)dx \quad (1)$$

$$\int (12ex+3x)dx=12ex+32x^2+C$$

$$\int (x^2+2x+1x^2)dx \quad (2)$$

$$\int |x|x^2+2x+1x^2dx=\int (x^2x^2+2xx^2+1x^2)dx=\int (1+2x+x-2)dx=x+2\ln|x-1|+C$$

$$\int (ex+1)^2dx \quad (3)$$

$$\int (ex+1)^2dx=\int (e^2x+2ex+1)dx=12e^2x+2ex+x+C$$

$$\int (1x(x+2))dx \quad (4)$$

$$\int |x|+C(4x^3+5x)dx=\int (4x-3+5x)dx=-2x-2+5\ln|x|+C$$

$$\int (4x^3+5x)dx \quad (5)$$

$$\int |x|+C(4x^3+5x)dx=\int (4x-3+5x)dx=-2x-2+5\ln|x|+C$$

$$\int (x+3e^{6x}-7x)dx \quad (6)$$

$$\int |x|+C(x+3e^{6x}-7x)dx=\int (x^2+3e^{6x}-7x)dx=23x^3+12e^{6x}-7\ln|x|+C$$

$$\int (3x+1-5e^{-2x})dx \quad (7)$$

$$\int |x+1|+5(2e^{-2x}+C(3x+1-5e^{-2x}))dx=3\ln|x+1|+C$$

$$\int (12x-3)dx \quad (8)$$

$$\int (12x-3)dx=\int (2x-3)-12dx=(2x-3)^2+12+C$$

$$\int ((2x-3)+e^{6x}-4)dx \quad (9)$$

$$\int (2x-3)e^{6x-4} + C(2x-3) + e^{6x-4} dx = -12 \cos(\sin) \int$$

$$\int ((6x+1)dx (104 \cos f$$

$$\int (6x+1) + C(6x+1) dx = 23 \sin 4 \cos f$$

$$\int (x^4 dx (11x+3 \cos \sin f$$

$$\int x) dx = -14 \cos x + 34 \cos x^4 dx = \int (14 \sin x^4 + 3 \cos x^4 dx = \int (\sin x + 3 \cos \sin f$$

$$x + Cx + 34 \sin$$

$$\int (e^{6x} + (1-2x)^6) dx (12) \int$$

$$\int e^{6x-4} + (1-2x)^6 dx = 16e^{6x-4} - 114(1-2x)^7 + C) \int$$

$$\int (xx^2+1 dx (13) \int$$

$$\int |x^2+1| + Cx^2+1 dx = \int 12(2x)x^2+1 dx = 12 \int 2xx^2+1 dx = 12 \ln \int$$

$$\int (x^2x^3-3 dx (14) \int$$

$$\int |x^3-3| + Cx^2x^3-3 dx = \int 13(3x^2)x^3-3 dx = 13 \int 3x^2x^3-3 dx = 13 \ln \int$$

$$\int (x^2-x^2x^3-3x^2+12 dx (15) \int$$

$$\int x^2-x^2x^3-3x^2+12 dx = \int 16(6x^2-6x)x^2x^3-3x^2+12 dx = 16 \int 6x^2-6x^2x^3$$

$$|2x^3-3x^2+12| + C3-3x^2+12 dx = 16 \ln$$

$$\int (e^x+7e^x dx (16) \int$$

$$\int e^x+7e^x dx = \int (e^x e^x+7e^x) dx = \int (1+7e^{-x}) dx = x-7e^{-x}+C \int$$

$$\int (15-14x dx (17) \int$$

$$\int |5-14x| + C15-14x dx = \int -4(-14)5-14x dx = -4 \ln \int$$

$$\int ((5-3x)) dx (18) 4x^3+2+3 \sin) \int$$

$$\int (5-3x) + C(5-3x)) dx = x^4+2x+\cos 4x^3+2+3 \sin) \int$$

$$\int (e^{2x}e^{2x}+3)dx \quad (19)$$

$$\int |e^{2x}+3| + Ce^{2x}e^{2x}+3dx = \int 12(2e^{2x})e^{2x}+3dx = 12 \ln |e^{2x}+3| + C$$

$$\int (1-4x)^2 dx \quad (20)$$

$$\int (1-4x)^2 dx = \int 3(1-4x)^{-2} dx = \frac{3}{4} (1-4x)^{-1} + C = \frac{3}{4} (1-4x) + C$$

$$\int (x e^{xx} dx) \quad (21)$$

$$\int |x| + e^x + C x e^{xx} dx = \int (1x + x e^{xx}) dx = \int (1x + e^x) dx = \ln |x| + e^x + C$$

أجد قيمة كل من التكاملات الآتية:

$$\int (2x+3e^x-4x) dx \quad (22)$$

$$\int |2x+3e^x-4x| dx = \int ((2x)^2 + 3e^{2x} - 4 \ln |2x+3e^x-4x|) dx = (x^2 + 3e^x - 4 \ln |2x+3e^x-4x|) + C$$

$$\int (0.5x^2+10) dx \quad (23)$$

$$\int |x^2+10| 0.5x^2+10 dx = \int 0.5(2x)x^2+10 dx = 12 \int 0.5(2x)x^2+10 dx = 12 \ln |x^2+10| + C$$

$$\int (2x-6)^4 dx \quad (24)$$

$$\int (2x-6)^4 dx = \frac{1}{5} (2x-6)^5 + C = \frac{1}{5} (2(4)-6)^5 - \frac{1}{5} (2(3)-6)^5 = \frac{32}{5} (10)^5 + C$$

(25) يتحرك جسيم في مسار مستقيم، وتُعطى سرعته المتجهة بالاقتران:  $v(t) = e^{-2t}$ ، حيث  $t$  الزمن بالثواني، و  $v$  سرعته المتجهة بالمتري لكل ثانية. إذا كان الموقع الابتدائي للجسيم  $m$ ، فأجد موقع الجسيم بعد 4 ثانية من بدء الحركة.

$$v(t) = e^{-2t} \Rightarrow s(t) = \int e^{-2t} dt = -\frac{1}{2} e^{-2t} + C$$

بما أن الموقع الابتدائي للجسيم  $m$  إذن  $s(0) = 2$

$$s(0) = -\frac{1}{2} e^0 + C = -\frac{1}{2} + C = 2 \Rightarrow C = \frac{5}{2} \Rightarrow s(t) = -\frac{1}{2} e^{-2t} + \frac{5}{2}$$

في كل مما يأتي المشتقة الأولى للاقتران  $f(x)$ ، ونقطة يمر بها منحنى  $y=f(x)$  أستعمل المعلومات المعطاة لإيجاد قاعدة الاقتران  $f(x)$ :

$$(f'(x)=5e^x; (0,12) \text{ (26)})$$

$$f(x)=\int 5e^x dx=5e^x+C$$

لإثبات ثابت التكامل، نعوض النقطة (0,12):

$$f(x)=5e^x+C \Rightarrow f(0)=5e^0+C \Rightarrow 12=5+C \Rightarrow C=-92 \Rightarrow f(x)=5e^x-92$$

$$(f'(x)=2x-1x^2; (1,-1) \text{ (27)})$$

$$|x|+1x+C \Rightarrow |x|+x-1+C=2 \ln f(x)=\int (2x-1x^2) dx=\int (2x-x-2) dx=2 \ln$$

لإثبات ثابت التكامل، نعوض النقطة (1,-1):

$$|x|+1x-2 \ln |x|+1+C \Rightarrow -1=1+C \Rightarrow C=-2 \Rightarrow f(x)=2 \ln |x|+1x+C \Rightarrow f(1)=2 \ln f(x)=2 \ln$$

$$(f'(x)=e^{-x}+x^2; (0,4) \text{ (28)})$$

$$f(x)=\int (e^{-x}+x^2) dx=-e^{-x}+13x^3+C$$

لإثبات ثابت التكامل، نعوض النقطة (0,4):

$$f(x)=-e^{-x}+13x^3+C \Rightarrow f(0)=-e^0+13(0)^3+C=4=-1+C \Rightarrow C=5 \Rightarrow f(x)=-e^{-x}+13x^3+5$$

(29) إذا كان ميل المماس لمنحنى العلاقة  $y$  هو:  $\frac{dy}{dx}=2x+3x+e$ ، فأجد قاعدة العلاقة  $y$ ، علماً بأن منحنىها يمرّ بالنقطة  $(e, e^2)$ .

$$|x+e|+Cy=\int (2x+3x+e) dx=x^2+3 \ln$$

لإثبات ثابت التكامل، نعوض النقطة  $(e, e^2)$ :

$$2e|x+e|-3 \ln 2e f(x)=x^2+3 \ln 2e+C \Rightarrow C=-3 \ln |e+e|+C \Rightarrow e^2=e^2+3 \ln |x+e|+C \Rightarrow f(e)=e^2+3 \ln f(x)=x^2+3 \ln$$



بيئة: في دراسة تناولت أسماكاً في بحيرة، تبين أن عدد الأسماك  $P(t)$  يتغير بـمعـدل:  $P'(t) = -0.51e^{-0.03t}$  حيث  $t$  الزمن بالسنوات بعد بدء الدراسة:

(30) أجد قاعدة الاقتران  $P(t)$  عند أي زمن  $t$ ، علماً بأن عدد الأسماك عند بدء الدراسة هو 1000 سمكة.

$$P(t) = \int -0.51e^{-0.03t} dt = -0.51 \cdot 0.03e^{-0.03t} + C = -17e^{-0.03t} + C$$

بما أن عدد الأسماك عند بدء الدراسة هو 1000 سمكة، إذن  $P(0) = 1000$  ومنه:

$$P(0) = -17e^{-0.03(0)} + C = 1000 \Rightarrow -17 + C = 1000 \Rightarrow C = 1017$$

(31) أجد عدد الأسماك بعد 10 سنوات من بدء الدراسة.

$$P(10) = -17e^{-0.03(10)} + 1017 \approx 1004$$

عدد الأسماك بعد 10 سنوات من بدء الدراسة هو 1004 سمكة تقريباً.

طب: يلتئم جرح جلدي بمعدل يمكن نمذجته بالاقتران:  $A'(t) = -0.9e^{-0.1t}$ ، حيث  $t$  عدد الأيام بعد الإصابة بالجرح،  $A(t)$  مساحة سطح الجرح بالسنتيمتر المربع:

(32) أجد قاعدة الاقتران  $A(t)$ ، عند أي زمن  $t$ ، علماً بأن مساحة سطح الجرح عند الإصابة هي 9 cm<sup>2</sup>.

$$A(t) = \int -0.9e^{-0.1t} dt = 0.9 \cdot 10e^{-0.1t} + C = 9e^{-0.1t} + C$$

بما أن مساحة سطح الجرح عند الإصابة هي 9 cm<sup>2</sup>، إذن  $A(0) = 9$  ومنه:

$$A(0) = 9e^{-0.1(0)} + C = 9 + C = 9 \Rightarrow C = 0$$

(33) أجد مساحة سطح الجرح بعد 5 أيام من الإصابة.

$$A(5) = 9e^{-0.1(5)} \approx 5.5 \text{ cm}^2$$

مساحة سطح الجرح بعد 5 أيام من الإصابة هي 5.5 cm<sup>2</sup> تقريباً.