




ويصبح غير متوافق مع شكل المادة المتفاعلة فيقل نشاط الإنزيم تدريجياً حتى يفقد قدرته على العمل.

3- أدرس الرسم البياني المجاور الذي يوضح أثر الرقم الهيدروجيني للوسط في سرعة تفاعل يحفزه إنزيم معين، ثم أجب عن السؤالين الآتيين:



أ- أحدد الرقم الهيدروجيني الأمثل لعمل هذا الإنزيم.

7

ب- أستنتج: كيف أعرف أنّ هذا الإنزيم ليس إنزيم البسبين، مبرراً إجابتي؟

لأن الرقم الهيدروجيني الأمثل لعمل إنزيم البسبين يتراوح بين (2 - 1.5 pH) بينما في الشكل هو (7).

4- أدرس الرسم البياني المجاور الذي يوضح تأثير تركيز الإنزيم في سرعة تفاعل محفز بالإنزيم، ثم أصف العلاقة بين تركيز الإنزيم وسرعة التفاعل.



كلما زاد تركيز الإنزيم زادت سرعة التفاعل الكيميائي؛ فعندما يزداد تركيز الإنزيم ليصبح مثلي التركيز الأصلي (X) فإن سرعة التفاعل تزداد لتصبح ضعف سرعة التفاعل (المحفز بالإنزيم الذي تركيزه X)، كما يتضح من الرسم البياني.

5- أدرس الشكل المجاور الذي يمثل جزيء حفظ الطاقة في خلايا الكائن الحي، ثم أجب عن السؤالين الآتيين:



أ- ما اسم كلٍّ من الجزيء المشار إليه بالرمز (ج)، والجزيء المشار إليه بالرمز (د)؟ (ع)

ADP : (د) ، ATP : (ج)

ب- أوضح ما يحدث في كل من العمليتين المشار إليهما بالرمز (س)، والرمز (د)،

ثم أذكر أسماء الإنزيمات المشاركة في كل منهما.

العملية (س): تحطيم رابطة بين مجموعتي الفوسفات الثالثة والثانية بفعل إنزيم ATPase ، وتحرر الطاقة المخزنة فيها، فينتج جزيء أدينوسين ثنائي الفوسفات ADP ، ومجموعات فوسفات حرّة.

العملية (ص): إضافة مجموعة فوسفات إلى جزيء أدينوسين ثنائي الفوسفات بفعل إنتاج ATP ، في عملية تسمى الفسفرة، وبذلك تخزن الطاقة الكيميائية في الرابطة بين مجموعتي الفوسفات وينتج جزيء ATP .